This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`


ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
HOMOEOPATHIC
LIBRARY

This volume is loaned by the author for the St.Louis Exposition.

Signed by the author 4/25/24

515
L67ste-
2

LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS.

BIBLIOTECA DE "LA HOMEOPATIA."

LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS

POR SCHÜSSLER.

COMPRENDIENDO LA TEORÍA, APLICACIÓN TERAPÉUTICA, MATERIA MÉDICA Y UN COMPLETO REPERTORIO DE ESTOS REMEDIOS CONSIDERADOS HOMEOPÁTICA Y BIOQUÍMICAMENTE,

POR WILLIAM BOERICKE M. D.

PROFESOR DE MATERIA MEDICA Y TERAPEUTICA
DEL HOSPITAL COLEGIO HAHNEMANN DE SAN FRANCISCO, MIEMBRO DE LA SOCIEDAD MEDICO-HOMEOPATICA DEL ESTADO DE CALIFORNIA,
ID. DEL INSTITUTO HOMEOPATICO AMERICANO, ETC., ETC., Y

POR WILLIS A. DEWEY, M. D.

Profesor de Materia Medica en la Universidad
del Colegio Medico-Homeopático de Michigan, Miembro Correspondiente de la Sociedad
Medico-Homeopatica Britanica
y de la Sociedad Francesa de Homeopatia, Miembro del Instituto
Homeopatico Americano, etc., etc.

Traducido de la cuarta edición americana, corregida y aumentada

POR EL DR. MANUEL CORDOVA Y ARISTI,

M. DEL INSTITUTO HOMEOPATICO MEXICANO, ID. DE LA SOCIEDAD MEDICO-HOMEOPATICA, SOCIO ACTIVO FUNDADOR DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN, ETC.

MÉXICO
EDUARDO DUBLAN, IMPRESOR
CALLEJÓN DE CINCUENTA Y SIETE NUM. 7

1902

DERECHOS DE TRADUCCIÓN RESERVADOS.

A la memoria de mis padres.

A mis hijos.

A vosotros á quienes desde niños he asistido siempre por el método salvador del inmortal Hahnemann, y al que en más de una ocasión habéis debido la vida y la salud, os dedico este imperfecto trabajo como paternal legado.

A mi estimado amigo y compañero

el Sr. Dr. Juan N. Arriaga,

fundador y propagador del órgano de "La Homeopatía" en Méjico.

El Traductor.

237177

PREFACIO DE LA CUARTA EDICION.

El aumento constante de los pedidos de esta obra ha agotado tres grandes ediciones y necesitado la preparación de una cuarta edición. Lo que en un principio se intentó como una simple guía sugestiva para el uso de un conjunto de valiosos remedios, se ha desarrollado por la demanda de la profesión, en un volumen que comprende todos nuestros presentes conocimientos terapéuticos de los propiamente llamados Doce Remedios de los Tejidos.

La complicación ampliamente hecha de todos los principios provechosos tiene como suplemento, la experiencia personal de los autores y el conocimiento de estos remedios. Todos los datos publicados han sido hasta el fin perfectamente escudriñados y examinados con el mayor criterio.

Teniendo esto presente, creemos que en esta cuar- edición se encontrará un guía seguro para el uso los Remedios de los Tejidos en las enfermeda- s, no sólo en cuanto á lo posible, según la teoría tintiva de Schüssler, como corregido y modifica- por él hasta la época de su muerte, sino confor-

me especialmente al más delicado y caracterizado método de Hahnemann. Siete ediciones alemanas de Schüssler «*Abgekürzte Therapie*» han sido publicadas desde que se dió á luz la última edición de esta obra; el desarrollo terapéutico de estos remedios ha hecho progresos maravillosos, y nuestros periódicos literarios durante los pocos años transcurridos han contenido multitud de relatos de curas obtenidas por ellos.

Todo esto ha sido incorporado, y esta obra, en su presente forma completa y revisada, es la única presentación adecuada de las posibilidades terapéuticas de los Remedios de los Tejidos en nuestra escuela.

Confiamos en que la misma consideración otorgada á las ediciones anteriores se extenderá á ésta gracias á la indulgencia de los que ejercen nuestra profesión.

WILLIAM BOERICKE, M. D.
San Francisco, Cal.

WILLIS A. DEWEY, M. D.
Ann. Arbor, Mich.

Enero 1°, 1899.

BIBLIOTECA DE "LA HOMEOPATIA."

LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS

POR SCHÜSSLER.

COMPRENDIENDO LA TEORÍA, APLICACIÓN TERAPÉUTICA, MATERIA MÉDICA Y UN COMPLETO REPERTORIO DE ESTOS REMEDIOS CONSIDERADOS HOMEOPÁTICA Y BIOQUÍMICAMENTE,

POR WILLIAM BOERICKE M. D.

EX-PROFESOR DE MATERIA MÉDICA Y TERAPÉUTICA
DEL HOSPITAL COLEGIO HAHNEMANN DE SAN FRANCISCO, EDITOR DEL "CALIFORNIA HOMŒOPATH,"
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD MÉDICO-HOMEOPÁTICA DEL ESTADO DE CALIFORNIA,
ID. DEL INSTITUTO HOMEOPÁTICO AMERICANO, ETC., ETC., Y

POR WILLIS A. DEWEY, D. M.

Profesor de Materia Médica en el Hospital Colegio Hahnemann de San Francisco,
ex-cirujano interno
del Hospital Homeopático de Ward's Island, miembro del Instituto Homeopático Americano,
id. de la Sociedad Médico-homeopática del Estado de California,
editor del "California Homœopath." etc.

TRADUCIDO DE LA TERCERA EDICION AMERICANA

POR EL DR. MANUEL CORDOVA Y ARISTI,

M. DEL INSTITUTO HOMEOPATICO MEXICANO, ID. DE LA SOCIEDAD MEDICO-HOMEOPATICA, SOCIO ACTIVO Y FUNDADOR DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN, ETC.

MÉXICO

IMPRENTA DE EDUARDO DUBLAN.

CALLEJÓN DE CINCUENTA Y SIETE NUM. 7.

1899

DERECHOS DE TRADUCCIÓN RESERVADOS.

PREFACIO.

El presente tratado sobre los doce remedios de los tejidos, contiene todo lo que el mismo Schüssler ha escrito sobre ellos y abarca también todas las experiencias de su uso publicadas después por la escuela homeópata; además, mucha materia original de algunos de nuestros prácticos homeópatas, que se publica por la primera vez. Nuestra mira ha sido dar una obra completa sobre el asunto, porque reconocemos el gran valor é importancia de los remedios de los tejidos; este ha sido necesariamente un trabajo de compilación y arreglo; hemos aprovechado todos los manantiales que nos proporciona nuestra literatura y las experimentaciones de las Sociedades homeopáticas; y aunque esta obra sea imperfecta y fragmentaria, sabemos que es tan completa como las actuales circunstancias lo permiten.

Creemos que la única esperanza futura para el desarrollo de estos magníficos remedios, descansa en el estudio de ellos, principalmente de conformidad con el método homeopático; que todos ellos de-

ben de ser probados tan cuidadosamente como lo ha sido *Natrum Mur.* y *Silicea*, y que solamente los resultados de tales pruebas suministrarán las indicaciones para sus usos terapéuticos. Solamente con experimentaciones hechas cuidadosamente, se asegurará la vida de estos remedios, librándolos del olvido en que han caído tantos otros recientemente introducidos.

La experimentación completa, hecha ordenadamente sobre el hombre sano, es el único y verdadero método para el desarrollo de nuestra materia médica; pero esto, por razón de su excelencia, es cosa de lento desarrollo, y la tentación de buscar otros métodos más cortos, siempre más ó menos dudosos, no puede resistirse cuando algunas veces dan resultados admirables. Lo más importante de tales desviaciones del método estrictamente clásico de probarlas sobre el hombre sano, es la aceptación de los síntomas clínicos; aprovechando éstos con prudencia, son un manantial de valor inapreciable, como bien lo demuestra la experiencia clínica. ¿Por qué no pueden obtenerse los mismos resultados, siguiendo atentamente y por lo pronto las teorías de Schüssler, sobre la esfera de acción de sus remedios y las indicaciones basadas sobre ellas? Estas indicaciones son ciertamente audaces y muchas veces dan resultados brillantes en su empleo en el tratamiento de las enfermedades.

En este caso, en ausencia de experimentaciones formales de ellos, podemos aprovecharnos de este

manantial y enriquecer nuestra materia médica con algunos remedios que se pueden comparar favorablemente con algunos policrestos.

Cualquiera oposición que pueda haber en nuestras filas al método de Schüssler, por razón de no ser el método practicado por la homeopatía, creemos que desaparecerá pronto si todos los críticos se ponen de acuerdo para probar y confirmar los importantes remedios introducidos por primera vez en la práctica homeopática americana por nuestro Hering, á quien no se puede acusar de haber patrocinado y ayudado á cualquier sistema, absolutamente extraño y perjudicial á nuestra escuela.

No simpatizamos con las ideas de Schüssler y algunos otros, quienes consideran á los remedios de los tejidos como suficientes para curar cuantas enfermedades existen—solamente la experimentación puede comprobar ese dicho.—Por lo pronto pensamos con el Dr. J. C. Morgan, que Schüssler ha hecho mal haciendo á un lado el complemento grande y necesario á su materia médica, de todos los medicamentos orgánicos como *Bell.*, *Hyos.*, *Acon.*, etc., los cuales hacen que tengan más valor los remedios de los tejidos obrando en combinación como obrarían las hojas opuestas de las tijeras; sin éstos quedarán incompletos en su acción curativa muchas veces y pueden ser inevitablemente censurados. Por tal motivo hemos incluido en la materia médica las relaciones homeopáticas entre estos medicamentos y otras medicinas ya estudiadas, que aunque por el

momento son simplemente sugestivas, esperamos que en lo futuro su estudio sea notablemente amplificado.

A todas las personas á quienes por sus observaciones, estudios y datos clínicos nos han proporcionado su ayuda para el arreglo de la presente obra, les expresamos nuestra gratitud y deuda; entre éstas haremos mención especial del Sr. Dr. Samuel Liliental, quien con toda benevolencia puso á nuestra disposición su biblioteca; á los profesores J. C. Morgan, S. Powell Burdick, C. B. Currier, Henry C. Honghton, Wm. E. Leonard y Drs. Horace F. Ivins, C. E. Fisher, A. P. Davis, S. E. Nicholson, G. H. Martin y á los demás de quienes hacemos mención en la obra.

WILLIAM BOERICKE, M. D.

W. A. DEWEY, M. D.

San Francisco, Enero 2 de 1888.

PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICIÓN.

La presente edición ha sido enteramente revisada y aumentada considerablemente con todos los datos nuevos que se relacionan con los remedios de los tejidos, que en los dos años transcurridos se han acumulado. El libro actual representa todo lo que existe para el tratamiento de las enfermedades por los doce remedios de los tejidos. Para no aumentar considerablemente el tamaño de la obra, no hacemos mención de muchos casos clínicos que aparecieron en la primera edición, con el objeto de dejar lugar á nuevo material y nuevos datos clínicos de los mejores autores. La parte que trata de la materia médica es tan completa como lo permiten los estudios verificados recientemente, habiendo sido ayudados para esto especialmente por el Dr. H. C. Allen, editor del «*Medical Advance.*» Nos han prestado su contingente los Síntomas Característicos de Hering y la magnífica obra del profesor T. F. Allen sobre el tratado de Materia Médica, obras que contienen mucho interesante y relativo á estos remedios. Los re-

medios llamados de los tejidos tienen sumo valor para usarse solamente por las indicaciones patológicas de Schüssler: todos, sin embargo, necesitan ser experimentados con sumo cuidadado para obtener puntos más culminantes para sus aplicaciones terapéuticas; esto se ha hecho con varios de ellos y sin duda se hará con todos. Hasta tanto no suceda esto, los doce remedios de los tejidos no ocuparán el lugar que les corresponde en nuestra materia médica, y cuando esto sea se verá que son unos policrestos de suma importancia.

Esperamos que la actual obra revisada, tendrá la aceptación favorable que se le otorgó á la primera

WILLIAM BOERICKE, M. D.

W. A. DEWEY, M. D.

San Francisco, Enero 2 de 1890.

PREFACIO DE LA TERCERA EDICION.

La generosa aceptación y el buen recibimiento que los médicos homeópatas han concedido á las ediciones anteriores de esta obra, han hecho una tarea agradable la preparación de esta nueva. Toda la obra prácticamente se ha vuelto á escribir de nuevo y se ha aumentado considerablemente. Todo lo que el Dr. Schüssler ha escrito personalmente hasta la publicación de su última edición de la «Abgekürzte Therapie» es decir, la décimaoctava, se ha incluido en esta, juntamente con muchas experiencias clínicas de los médicos homeópatas cuyos casos se encuentran esparcidos en todos nuestros periódicos y en el seno de nuestra Sociedad. De este modo la obra ha quedado tan completa como puede estarlo en la actualidad con respecto á todo lo que pertenece al tratamiento bioquímico de las enfermedades y á su relación con la homeopatía.

El concepto que tenemos de la verdadera imporportancia de los doce remedios de los tejidos nos ha separado más y más en cada nueva edición del que ha profesado su distinguido introductor. Mientras que nuestra primera opinión no ha variado, y he-

mos procurado adelantar su desarrollo en todas las filas de la homeopatía, Schüssler prefiere en la actualidad considerar el método bioquímico como completamente distinto del homeopático, y como un procedimiento terapéutico y una higiene química enteramente suficientes por sí mismos. Así, mientras él descansa únicamente en los hechos químicos-fisiológicos y en teorías para guiarse en la aplicación terapéutica de los remedios, nosotros, aceptando y utilizando todo esto, agregamos las indicaciones que se derivan de la experimentación, base únicamente legítima y permanente para la elección de las drogas en las enfermedades. En este asunto, á pesar del Dr. Schüssler, creemos que nuestra Escuela debe hacer una experimentación cuidadosa de estos remedios en todas las potencias. Hasta cierto punto esto se ha hecho ya desde que se publicó nuestra segunda edición, especialmente con el *Kali phosphoricum*, sobre el cual el Profesor H. C. Allen ha publicado recientemente un magnífico informe en el *Medical Advance;* las notas salientes de dicho medicamento las incluimos en nuestra exposición de él.

Para concluir debemos manifestar otra vez nuestro agradecimiento á los amigos que de una manera tan bondadosa y desinteresada nos han ayudado en la preparación del presente volumen, suministrándonos material y observaciones clínicas.

W. Boericke, M. D.
W. A. Dewey, M. D.

San Francisco, Septiembre 10 de 1892.

TABLA DE MATERIAS.

I.

INTRODUCCIÓN GENERAL, HISTORIA, TEORÍA, LA SALUD Y LA ENFERMEDAD, PREPARACIÓN, DOSIS, RELACIÓN BIOQUÍMICA Y RELACIÓN HOMEOPÁTICA, ETC.

II.

MATERIA MÉDICA DE LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS, SÍNTOMAS, NOMBRE COMÚN, DATOS QUÍMICOS, PREPARACIÓN, DATOS QUÍMICO-FISIOLÓGICOS, ACCIÓN GENERAL, INDICACIONES CARACTERÍSTICAS, DATOS HOMEOPÁTICOS, ADMINISTRACIÓN, RELACIÓN, ETC.

III.

APLICACIÓN TERAPÉUTICA DE LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS, INDICACIONES PARTICULARES, CASOS CLÍNICOS ARREGLADOS POR ORDEN ALFABÉTICO.

IV.

REPERTORIO DE LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS DISPUESTO BAJO UNA BASE ANÁTOMO-PATOLÓGICA.

PARTE I.

INTRODUCCION A LA TEORIA Y BOSQUEJO DE LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS.

HISTORIA DE LOS REMEDIOS DE LOS TEJIDOS.

Samuel Hahnemann, cuyo genio adivinó la gran importancia de las celdillas de las sales inorgánicas como agentes curativos de orden superior, fué también el primero que comenzó la investigación completa de sus efectos patogenéticos y sus usos terapéuticos. Sus experimentaciones con las sales de cal y de potasa fueron los que abrieron el camino al resto de los remedios de los tejidos, que mostraron el inmenso acopio de fuerza medicamentosa que poseen estas substancias aun en su estado bruto é inerte; él fué quien por primera indicó la manera de desarrollar y dirigir estas fuerzas para los fines terapéuticos. Más tarde, en 1832, llamó la atención un artículo publicado en el *Stapf's Archiv* sobre la gran importancia como remedios de todas las «partes esenciales componentes del cuerpo humano,» y de nuevo, en el mismo periódico, en 1846, se volvió á llamar

la atención sobre la manera como «Todos los constituyentes del cuerpo humano obran principalmente sobre aquellos órganos en donde tienen que desempeñar una función. Todos llenan ampliamente sus funciones cuando son las causas de los síntomas.»

Más tarde todavía, Grauvogl, en su *Libro de texto*, toma nota de estas observaciones y las amplifica; pero el Dr. Schüssler, de Oldenburgo, Alemania, era el llamado á desarrollar estos pensamientos y á completar la idea obscura que se bosquejaba en ellos como base para un «nuevo sistema.» En Marzo de 1873 se publicó en un periódico homeopático alemán un artículo escrito por él, con el título de *Terapéutica Homeopática Abreviada*, en el cual decía: «Hace cerca de un año traté de descubrir por medio de experimentos en los enfermos si no sería posible curarlos, siempre que sus males tuviesen remedio, con aquellas substancias que son las naturales, es decir, los remedios de las funciones fisiológicas.» Parece que no se tomó nota especial de esto sino hasta cinco meses después cuando el Dr. Lorbacher, de Leipzig, publicó en el mismo periódico algunas consideraciones críticas acerca del asunto. A esto se siguió una réplica de Schüssler, que se publicó en siete números, donde hacía una relación más detallada de este «sistema abreviado de terapéutica homeopática,» cuyas fases más importantes se incorporan en esta obra.

La comunicación original de Schüssler al periódico alemán se tradujo al inglés, y se publicó por la pri-

mera vez en el *Medical Investigator*, Mayo de 1873, y poco después en una pequeña obra del Dr. Hering, titulada «Los doce remedios de los tejidos,» en que este gran maestro de nuestra Escuela los recomendaba para su estudio. Se hicieron en rápida sucesión varias ediciones, de las cuales se ha derivado principalmente este bosquejo histórico, y en seguida de ellas apareció la traducción de la duodécima edición alemana, por J. T. O'connor, M. D., y otra por M. Dosetti Walker, aumentada considerablemente con un apéndice para popularizar el método bioquímico. El Dr. Schüssler acaba de publicar la edición alemana décimaoctava, en la cual la aplicación de los remedios ha sido notablemente aumentada, añadiéndose, además, considerable y nuevo material, todo lo cual se incluye en la presente obra.

No obstante que el Dr. Schüssler niega en la última edición de su obra toda relación con la homeopatía, é insiste en que su método no se basa sobre la ley curativa homeopática, sino sobre el proceso químico-fisiológico que se verifica dentro del organismo, es, sin embargo, una verdad que la adopción actual y vastísima de los remedios de los tejidos en el tratamiento de las enfermedades es el fruto de la semilla sembrada desde 1832 en el fértil suelo homeopático, aunque su desarrollo haya sido lento hasta que Schüssler le dió un impulso maravilloso al presentar hechos fisiológicos y patológicos que sostuvieran su procedimiento terapéutico.

TEORÍA GENERAL.

La idea sobre la cual está basado el método bioquímico, descansa en el hecho fisiológico de que tanto la estructura como la vitalidad de los órganos del cuerpo dependen de ciertas cantidades necesarias y proporcionales de sus constituyentes inorgánicos, que son aquellos que quedan después de la combustión de los tejidos, es decir, las cenizas.

En un sentido verdaderamente real, éstos deben considerarse como la base material de los órganos y tejidos del cuerpo, y son absolutamente esenciales para la integridad de su estructura y su actividad funcional. Según la teoría de Schüssler, cualquier trastorno en el movimiento molecular de estas sales organizadas, producido en los tejidos vivos, constituye la enfermedad, cosa que puede rectificarse y restablecerse en el equilibrio necesario con la administración de las mismas sales minerales en pequeñas cantidades. Se supone que esto se verifica en virtud de la operación de la afinidad química en el dominio de la histología; y en consecuencia, este procedimiento terapéutico es titulado por Schüssler método bioquímico, y de que se haga valer el hecho de que se le suponga en armonía con los hechos y leyes bien conocidas en la química fisiológica y en las ciencias congéneres.

CONSTITUYENTES DEL ORGANISMO HUMANO.

La sangre se compone de agua, azúcar, grasa, substancias albuminosas, cloruro de sodio, cloruro

de potasa, fluoruro de calcio, ácido silícico, hierro, cal, magnesia, sosa y potasa. Las últimas combinadas con los ácidos fosfórico, carbónico y sulfúrico.

Las sales de sosa predominan en el plasma de la sangre, en tanto que las de potasio se encuentran en los corpúsculos de ella. El azúcar, la grasa y las substancias albuminosas son los llamados componentes orgánicos de la sangre, en tanto que las sales mencionadas arriba, constituyen sus componentes inorgánicos. El azúcar y la grasa son compuestos de carbón, hidrógeno y oxígeno; las substancias albuminosas contienen además azufre nitrógeno (ázoe).

El azufre, el carbón y el fósforo, no se encuentran en el organismo en un estado libre, sino combinados con las substancias orgánicas.

El azufre y el carbono se encuentran en la albúmina; el carbono en los hidratos carburados como el azúcar, el almidón y en los productos de las metamórfosis de las substancias orgánicas. El fósforo se encuentra en la lecitina y en la nucleina. El azufre y la albúmina se oxidan por el oxígeno del aire inspirado, formando ácido sulfúrico que combinado con las bases de los carbonatos, forman á su vez sulfatos que ponen en libertad el ácido carbónico.

CONSTRUCCIÓN DE LOS TEJIDOS.

La sangre, conteniendo el material para todos los tejidos y celdillas del cuerpo, suministra la nutri-

ción á todos los órganos, haciéndolos capaces de desempeñar sus funciones individuales; de este modo suple cualquiera falta fisiológica posible de la economía animal.

Verifica esto por medio de la trasudación de una parte de su plasma en los tejidos circunvecinos al través de las paredes de los capilares, por lo cual las pérdidas sufridas por las celdillas á causa de las metamórfosis de los tejidos, se reponen. Según las modernas teorías biológicas, este *pabulum* es una materia *sui generis*, llamada materia irritable ó protoplasma, es la única materia viva y se encuentra difundida por todo el organismo, del cual constituye cerca de la quinta parte; las otras cuatro quintas son por lo tanto materia organizada y relativamente muerta. Bajo este carácter físico constituye un semifluido nitrogenado pulposo sin estructura, translúcido, homogéneo, semejante al de los nervios ganglionares y á la substancia nerviosa gris. En este fluido translúcido aparecen gránulos finos, los cuales se unen para formar los gérmenes, y de los cuales á su vez se desarrollan las celdillas. Por la unión de estas celdillas se forman los tejidos de todas las clases que se necesitan para la construcción del organismo entero. Dos clases de substancias son necesarias en este proceso de construcción de los tejidos, y ambas las suministra la sangre, á saber: los constituyentes orgánicos y los inorgánicos. Entre los constituyentes orgánicos se cuentan, el azúcar, la grasa y las substancias albuminosas de la san-

gre, las cuales sirven para la base física de los tejidos, mientras que el agua y las sales, á saber: la potasa, la cal, la silicea, el fierro, la magnesia y el sodio son las substancias inorgánicas, que se cree determinan la clase particular de celdillas por construir. De cuando en cuando se encuentran otras sales; pero las anteriores, sin embargo, abarcan todas las que constantemente están presentes. Por tanto, siempre que en el organismo animal tengan que formarse ó generarse nuevas celdillas, deben hallarse presentes y en una proporción debida, tanto las substancias orgánicas como las inorgánicas. Por su presencia en la sangre, todos los órganos, las vísceras y los tejidos del cuerpo se forman, fija y hace permanente el orden en sus funciones, y alteradas, causan trastornos funcionales.

CONSTITUYENTES INORGÁNICOS DE LAS CELDILLAS.

Los materiales inorgánicos de las *celdillas nerviosas* son: Magnes. phosph., Kali phosph., Natrum y Ferrum. Las *celdillas musculares*, contienen las mismas, con la adición del Kali muriaticum. Las *celdillas del tejido conectivo* tienen por substancia específica la Silicea, mientras que la substancia de las *celdillas del tejido elástico* es probablemente Calc. fluor. En las de los huesos tenemos Calc. fluor., y además, Magnesia phosph. y una grande proporción de Calc. phosph. Esta última se halla también en pequeñas cantidades en las *celdillas de los músculos, nervios,*

cerebro y tejido conectivo. Las *celdillas de los cartílagos y mucosas,* tienen como material inorgánico específico el Natrum mur., el cual se encuentra también en todas las partes sólidas y líquidas del cuerpo. El *cabello* y el *cristalino,* contienen entre sus substancias inorgánicas también al Fierro. Los carbonatos, en calidad de tales, según Molleschott, no tienen ninguna influencia en el proceso de la formación de las celdillas.

FORMACIÓN DE LAS CELDILLAS DE LOS TEJIDOS.

El oxígeno del aire, al llegar á los tejidos por medio de la sangre á causa de la respiración, obra sobre las substancias orgánicas que deben entrar en la formación de las nuevas celdillas. Los productos de esta transformación son los materiales orgánicos que forman las bases físicas para los músculos, los nervios, el tejido conectivo y las mucosas. Ninguna de estas substancias se presentan como tales en la sangre, sino que se forman de la albúmina en el interior de los tejidos. Con ellas, las sales inorgánicas forman varias combinaciones en virtud de las afinidades químicas, y de esta manera quedan constituidas las nuevas celdillas. Con la formación de las nuevas celdillas se verifica al mismo tiempo la destrucción de las antiguas, resultando esto de la acción del oxígeno sobre las substancias orgánicas que son la base de estas celdillas. Esta oxidación tiene, co-

mo consecuencia, la aniquilación de las mismas celdillas.

Los últimos resultados de esta combustión de las substancias orgánicas son la formación de la úrea, de los ácidos úrico, sulfúrico, fosfórico, láctico y carbónico, y también del agua. Algunos miembros intermedios de la serie, como por ejemplo la hiposantina y los ácidos acético y butírico, etc., no necesitan mencionarse en este método terapéutico, por que hasta donde llega nuestro actual conocimiento de ellos se ve que desempeñan un papel muy secundario. La úrea y los ácidos úrico y sulfúrico son el resultado de la oxidación de las substancias albuminosas, en tanto que el ácido fosfórico es producido por la oxidación de la lecitina contenida en el tejido nervioso, el cerebro, la médula espinal y los corpúsculos de la sangre. El ácido láctico es el resultado de la fermentación del azúcar de leche, que finalmente se transforma en ácido carbónico y agua.

Los productos finales de la oxidación de las substancias orgánicas son la úrea, el ácido carbónico y el agua. Estos se juntan con las sales que dejan en libertad los tejidos, y dan lugar á cuerpos orgánicos que están menos completamente oxidados, los que á su vez sufren finalmente las mismas metamórfosis.

Los productos de este cambio retrógrado de tejidos son conducidos por medio de los vasos linfáticos, el tejido conectivo y las venas á la vesícula biliar, pulmones, riñones, vejiga y piel, y por su con-

ducto los desecha el organismo por medio de varias secreciones, tales como la orina, transpiración, heces fecales, etc.

La importancia y actividad de las funciones del tejido conectivo quedaron establecidos después de las investigaciones de Virchow y Von Recklinhausen, y desde entónces se ha hecho un estudio más profundo de ellos y se ha demostrado su fecunda actividad. Así lo que antes parecía no tener más objeto que servir de un relleno, de una cubierta protectora, aparece en la actualidad como la matriz donde los pequeños capilares llevan el plasma de la sangre á los tejidos y lo recogen para llevarlo á los vasos sanguíneos; al mismo tiempo sirve como uno de los más importantes incubadores de las nuevas celdillas, que son capaces de transformarse de las formas embrionarias latentes, en las estructuras más variadas del cuerpo.

SALUD Y ENFERMEDAD.

La salud puede reputarse como el estado característico de las metamórfosis normales de las celdillas; así, cuando por medio de la digestión de los alimentos y bebidas, la sangre queda recompensada de las pérdidas que sufre al administrar á los tejidos el material con que se nutren; esta compensación se verifica en la cantidad necesaria y en los lugares á propósito, de modo que no ocurre ningún trastorno en el movimiento de las moléculas. Sólo bajo estas condiciones se lleva á cabo de un modo

normal el desarrollo de las nuevas celdillas y la destrucción de las antiguas, y también la eliminación de los materiales inútiles.

La enfermedad es el resultado del trastorno del movimiento molecular de una de las sales inorgánicas de los tejidos. La curación consiste en la restauración del equilibrio del movimiento molecular, suministrando una dosis mínima de la misma substancia inorgánica, puesto que las moléculas de la substancia que de este modo se usa como remedio, llena el vacío de la cadena molecular de la celdilla afectada ó de la sal del tejido.

Virchow dice que la enfermedad es un estado de alteración de las celdillas, y de aquí es que su estado normal constituya la salud. La constitución de la celdilla la determina la composición de su medio nutritivo, exactamente como las plantas prosperan según la calidad de la tierra que rodea sus raíces.

En la química agrícola usamos como abono el elemento que hace más falta á la tierra. Tres substancias esenciales son las que se usan como abonos, á saber: el amoníaco, el fosfato de cal ó la potasa, porque las otras substancias necesarias para la nutrición de la planta se hallan en la tierra en cantidad suficiente. La misma ley de suministrar lo que falta se aplica en los remedios bioquímicos; tómese por ejemplo el siguiente caso:

En el niño que sufre de raquitismo, se manifiesta una falta de fosfato de cal en los huesos, debida al trastorno del movimiento molecular de las molécu-

las de esta sal. La cantidad de fosfato de cal destinada á los huesos, al no llenar su objeto se acumularía en la sangre si no fuera excretada por la orina, porque el oficio de los riñones es mantener la composición de la sangre de un modo debido, y por tanto expulsar cualquiera substancia extraña ó sobrante de uno de los constituyentes. Después que el movimiento molecular normal de las moléculas del fosfato de cal, se restablece dentro de la región nutritiva afectada; al suministrar dosis pequeñas de la misma sal, el sobrante puede entrar de nuevo en la circulación general, verificando así la curación del raquitismo.

Todas las celdillas normales tienen la facultad de absorber ó desechar ciertas substancias. Esta propiedad se disminuye ó suspende, siempre que las celdillas sufran una pérdida en una de sus sales á consecuencia de alguna irritación. Tan luego como se remedia esta deficiencia con la administración de una substancia homogénea derivada de la región nutritiva inmediata, el equilibrio se restablece. Pero si esta provisión no se verifica espontáneamente, debe presumirse que la sal necesaria no se halla en la debida cantidad, ó de otro modo, que las celdillas enfermas han sufrido además una alteración física que evita la asimilación de la sal necesaria al tejido. En tal caso la sal debe administrarse en un estado diluido, esto es, en trituración alta.

Si las celdillas alteradas vuelven á su integridad al recobrar sus pérdidas, pueden desempeñar de nue-

vo sus funciones normales, y remover por medio de procedimientos químicos los productos morbosos, en las exudaciones, etc. La terapéutica bioquímica ayuda á la naturaleza en sus esfuerzos para sanar, suministrándole los remedios naturales que faltan en ciertas partes, esto es, las sales inorgánicas de las celdillas, y de este modo corrige los estados anormales de la química fisiológica.

El objeto del tratamiento bioquímico, es llenar directamente cualquiera deficiencia. Todos los otros métodos curativos llegan indirectamente á este fin, cuando usan agentes medicamentosos heterogéneos á los constituyentes del organismo humano.

DOSIS Ó CANTIDAD DE LAS SALES DE LOS TEJIDOS QUE SE NECESITAN PARA RESTABLECER EL EQUILIBRIO NORMAL DE LAS CELDILLAS.

Los remedios bioquímicos se administran en dosis mínimas.

La virtud curativa de las dosis pequeñas puede deducirse de los hechos siguientes: en toda la naturaleza, los átomos y los grupos de átomos ó moléculas constituyen la base de sus operaciones. El crecimiento de los animales y de las plantas es debido al desarrollo de nuevos átomos ó grupos de átomos en la masa existente de las moléculas.

En vista del hecho de la acción de la luz, por sí misma imponderable, que causa los movimientos moleculares en las plantas vivas por los cuales el

ácido carbónico se descompone en carbono y oxígeno, y en vista también de la acción de la luz sobre la placa fotográfica y la retina del ojo, parece imposible contradecir que las partículas imponderables de materia, infinitamente pequeñas, puedan obrar sobre el cuerpo vivo. El uso de las cantidades pequeñas en el tratamiento bioquímico es una necesidad químico-fisiológica. Por ejemplo, si se desea que la sal de Glauber alcance la sangre, esto no puede hacerse dándola en una solución concentrada, porque de esta manera el canal intestinal es el único afectado, produciendo una diarrea acuosa en la que la sal es arrojada fuera del organismo; pero una solución diluida de esta sal (Natrum sulf.) entrará á la circulación y en los fluidos intercelulares, aun desde la boca y el esófago; y en virtud de su propiedad higrométrica, procurará el pasaje de un exceso de agua á los tejidos y á la sangre venosa, y un aumento de la secreción urinaria.

Todos los remedios bioquímicos deben diluirse suficientemente para evitar la destrucción de las funciones de las celdillas sanas y para restablecer las funciones entorpecidas en donde quieran que se hallen.

En el organismo sano, sea animal ó vegetal, las sales se encuentran en solución, correspondiendo á las diluciones tercera, cuarta y quinta decimales de las medicinas.

La siguiente tabla del análisis de las celdillas de

la sangre, en relación con el organismo humano, manifestará lo dicho.

En 1000 gramos de celdillas de la sangre, la proporción de las substancias inorgánicas es como sigue, según el "Tex-book of physiological and pathological Chemystri," de Bunge:

Fierro	0.998.
Kali sulph	0.132.
Kali mur	3.079.
Kali phos	2.343.
Natrum phos	0.633.
Natrum	0.344.
Calc. phos	0.094.
Magnes. phos	0.060.

El mil gramos de fluido intercelular (plasma), las substancias inorgánicas se hallan en la proporción siguiente:

Kali sulph	0.281.
Kali mur	0.359.
Natrum mur	5.545.
Natrum phos	0.271.
Natrum	1.532.
Calc phos	0.298.
Magnes. phos	0.218.

Natrum sulph., fluor., y Silic., rastros.

Compárense con estos análisis el de la leche. 1000 gramos de ésta ó sea un litro, contiene:

Kali	0.780.
Natrum	0.230.
Calcárea	0.330.
Magnesia	0.060.
Fierro	0.004.
Acido fosfórico	0.470.
Cloro	0.400.

Rastros de Fluoro y Silicea.

Un litro basta para la alimentación diaria de un niño que pese 6 kilógramos.

Ahora si seis centígramos de magnesia bastan para suplir la necesidad diaria de esa substancia en un niño, ¿cuánto menor no debe ser la dosis de magnesia que debe darse para una neuralgía producida por una deficiencia indeciblemente pequeña de esta sal en una porción diminuta del tejido nervioso?

Los elementos minerales de una celdilla son infinitamente pequeños. Según los cálculos del fisiólogo C. Schmidt, cada corpúsculo de la sangre contiene como la billonésima parte de un gramo de Kali mur. Esto corresponde á la 12ª trituración decimal.

Algunos de los remedios usados en la antigua escuela, en dosis muy pequeñas tienen una actividad semejante; por ejemplo: el Sublimado corrosivo del cual el profesor Hugo Schulz dice que una solución de 1-600,000 á 1-800,000 produce una fermentación más poderosa que la normal, si se le añade el fermento de una solución de uvas. (Véase el *Berliner Klinische Wogenschrift*, Nov. 4, 1889.)

Las substancias inorgánicas que sirven para la nutrición de las plantas, las toman éstas solamente en cantidades pequeñas. Liebig en sus cartas químicas observa que el abono más fuerte de los fosfatos terrosos en un polvo grueso no puede compararse, en cuanto á su acción, con una cantidad mucho más pequeña, pero finamente dividida, pues á causa de esta subdivisión puede difundirse al través del suelo. Cada raicecilla no requiere sino una

cantidad pequeña de nutrición cuando está en contacto con el suelo, pero para su actividad funcional y su existencia se necesita que esta cantidad mínima se encuentre justamente en el lugar. Las substancias minerales insolubles que se hallan en el suelo, tienen que ser disueltas por los jugos ácidos de las fibras de la raíz antes que lleguen al organismo vegetal.

Cuando un mineral llega al estómago humano, sufre la acción del ácido muriático que contiene el jugo gástrico, y si es una sal de fierro, se formará un cloruro. Por tanto, si se desea administrar el fosfato de fierro con miras terapéuticas, es necesario conservarle fuera del estómago. Para este fin se necesitan dosis mínimas, y la medicina tiene que diluirse á tal grado que sus moléculas puedan penetrar el epitelio de la boca, faringe y esófago, y llegar á la sangre á través de las paredes capilares. Por eso es que las substancias insolubles en el agua, deben triturarse por lo menos hasta la sexta potencia decimal; las que son solubles en el agua pueden penetrar las celdillas epiteliales en diluciones más bajas.

En algunas de las aguas minerales, las sales solamente se encuentran en cantidades que corresponden á la sexta y octava diluciones decimales; así, en las aguas de Rilchingen la Magnesia phosph. se presenta á la octava, Kali mur. á la quinta y Silicea á la sexta dilución.

El Dr. Behneke en sus cartas balneares hace ob-

servar, con justicia, que es de gran importancia la proporción relativa y el grado de concentración en que las sales se hallen presentes en el agua mineral. Muchos de los manantiales de más fama deben sus buenos resultados al hecho de que los constituyentes curativos no se encuentran sino en estados excesivamente diluidos, y los resultados mejores se obtienen con frecuencia usando dosis que comunmente se consideran demasiado pequeñas.

La adaptabilidad de las dosis mínimas al fin que se persigue está en completa armonía con los hechos fisiológicos y químicos, según puede deducirse de las siguientes palabras del profesor Valentín, fisiologista bien conocido:

"La naturaleza obra donde quiera usando un número infinito de pequeños elementos, los cuales, sean agregados homogéneos ó heterogéneos, nuestros órganos de los sentidos relativamente obtusos, sólo pueden percibirlos cuando se encuentran en masas de determinadas proporciones. La imagen más pequeña que percibe nuestra vista, tiene su origen en millones de ondas luminosas; un granito de sal que apenas es capaz de saborear nuestro gusto, contiene miriadas de grupos de átomos que ningún ojo es capaz de ver jamás."

Este hecho queda también ilustrado con los experimentos bien conocidos de los profesores Kirchoff y Bunsen, hechos con la sal común en la proporción de tres milígramos que se arrojan en un cuarto que tenga 60 metros cúbicos de aire. A los pocos

minutos las líneas del sodio se ven aparecer en una flama puesta á considerable distancia y que el ojo puede distinguir sin ninguna ayuda.

La ciencia moderna nos proporciona numerosas ilustraciones en cuanto al poder de las cantidades infinitesimales. Referiremos muy pocas, comenzando por una del excelente observador Darwin. En su obra sobre las *plantas insectívoras*, dice: "Es un hecho sorprendente que una cantidad tan inconcebiblemente diminuta, como 1-20.000,000 de grano (cantidad mucho más pequeña que la sexta trituración decimal, que es la potencia usualmente prescrita en los remedios de los tejidos) de fosfato de amoníaco produzca cambios en una glándula suficientes para causar un impulso de movimiento que ha de enviarse á lo largo de todo el tentáculo, y que este impulso excite movimientos que alcanzan un ángulo de casi 180°."

Ahora bien, aunque la presencia de la sal común puedan percibirla los nervios del gusto, aun cuando la sal bruta toque las terminaciones periféricas de estos nervios, todavía en tal estado, es dudoso si puede penetrar y alcanzar los conductores del neurilema. Para este fin parece mucho más razonable suponer que el grado de atenuación que se alcanza con las trituraciones es más á propósito para satisfacer la necesidad de las moléculas de sal que se requieren.

La atropina, aun cuando se diluya hasta la millonésima potencia, produce, según Reuter, la dila-

tación de la pupila en el hombre y en todos los animales inferiores de sangre caliente.

Un litro de leche contiene como cuatro milígramos de fierro, y el niño que se alimenta con ella recibe menos de un milígramo de fierro por dosis: Si cuatro milígramos representan la cantidad diaria de fierro que contribuye para el alimento y crecimiento del niño (porque se distribuye á todas las celdillas del organismo que lo necesitan), cuánta menor no debe ser la dosis considerada terapéuticamente, de una sal de fierro que se dé para subsanar el trastorno molecular que apareciere en un limitado espacio celular, tal como el que determinara la hiperemia de la irritación.

La cantidad de fluorina contenida en la leche, no ha sido todavía determinada cuantitativamente, pero la que contiene el organismo es mucho menor que la de fierro. Puede considerarse que la cantidad de fluorina contenida en la leche, está representada por un décimo de milígramo; por lo tanto, un milígramo de fluorum de calcio, *pro dosi*, si se prescribe como remedio, constituye una dosis muy fuerte.

La cantidad de remedio que ha de prescribirse según la terapéutica química, ha de ser más bien, demasiado pequeña, que demasiado grande; porque si se administra demasiado pequeña, su repetición puede alcanzar el fin deseado; pero si se dá demasiado grande, no se conseguirá el resultado que se busca.

Las grandes dosis de fierro que se dan para curar la clorosis, ó los desórdenes del estómago, se expulsan intactas con las heces fecales, y en la mayor parte de los casos dejan la enfermedad sin afectarla.

El ácido hidroclórico, cuando se diluye en mil partes de agua, disuelve con facilidad, á la temperatura natural del cuerpo, la fibrina y el gluten; pero este poder no se aumenta, antes bien, se disminuye, cuando se acrecienta la proporción del ácido en la dilución.—*Liebig's Chemical Letters*, vol. II, pág. 119.

PREPARACIÓN Y DOSIS.

Los remedios de los tejidos se preparan para fines terapéuticos, á semejanza de todos los remedios homeopáticos, esto es, en trituración ó solución, según la escala decimal ó centesimal. Se toma la substancia bruta y químicamente pura, y se la tritura con azúcar de leche, en la proporción de una parte de la droga, por nueve de azúcar, y durante una hora, por lo menos. Esto da la primera trituración decimal, que contiene en cada grano una décima de grano de la sal orgánica triturada.

Luego se toma una parte de esta primera trituración decimal, y nueve partes de azúcur de leche que se trituran durante una hora, y con esto se obtiene la segunda trituración decimal, que es equivalente á la primera trituración centesimal, y en la cual cada grano contiene un centésimo de la sal orgánica triturada. Pero la experiencia ha demostrado, como

puede también colegirse por las ilustraciones dadas más antes, que aun esta subdivisión tan pequeña resulta grande para muchos de los propósitos de la economía animal, y por esta razón se ha llevado el procedimiento de trituraciones y subdivisión aun hasta la sexta, duodécima y aun más altas preparaciones.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SCHÜSSLER.

Schüssler, al principio, comenzó á emplear la sexta centesimal ó la duodésima trituración decimal; pero muy pronto adoptó en su práctica la sexta preparación decimal como la más útil. No ha mucho tiempo usaba las más bajas trituraciones de las sales de Potasium y de Sodium, la tercera decimal, y de las otras sales la cuarta y la quinta, obteniendo igualmente buenos resultados. En la última edición alemana de su "*Abjekürzte Terapie*," dice sobre este punto: "En mi práctica empleo como término medio la sexta trituración decimal. En las enfermedades agudas, una dosis en polvo del tamaño de un guisante, administrada cada una ó cada dos horas; en las enfermedades crónicas, tres ó cuatro veces al día solamente. El polvo puede darse en seco sobre la lengua ó disuelto en una cucharada de agua."

Nosotros mismos hemos tenido los resultados más satisfactorios con la sexta trituración decimal: por rareza pasamos á las más altas, á veces bajamos de potencia, y generalmente preferimos dar el remedio elegido en solución, disolviendo una conveniente-

te cantidad de polvo en un medio vaso de agua, y administramos por dosis una cucharada de las de té cada una ó dos horas.

Si se usa solución líquida, pueden disolverse unas cuantas gotas en agua, ó saturar glóbulos ó pastillas y darlas de este modo, lo que está recomendado especialmente para los niños.

FRECUENCIA DE LAS DOSIS.

En los casos agudos, una dosis cada hora ó cada dos; en los más graves y afecciones dolorosas, una dosis cada diez ó quince minutos; en las enfermedades crónicas, de una á cuatro dosis al día.

En ciertos casos está indicado el uso externo de los remedios y ha sido útil su aplicación. Para llenar este objeto pueden usarse la segunda, la tercera, y aun la sexta trituración. Para determinar la dosis de un remedio bio-químico, no es la *cantidad* que implica el producto morboso; por ejemplo, una deficiencia muy pequeña de *Natrum mur.*, en las celdillas de la capa epitelial de una serosa, puede dar lugar á una considerable exudación serosa, y una pequeña cantidad de *Natrum mur.*, correspondiente á la deficiencia, puede efectuar una reabsorción completa del exudado.

Guiados por las cantidades relativas de las sales celulares, cada práctico puede elegir la dosis conveniente del remedio bio-químico indicado.

Un milígramo (1—100 de grano=á la 2ª trituración decimal) de una substancia se calcula que con-

tiene 16 trillones de moléculas. Según este cálculo, la 6ª trituración decimal de ella contendrá cerca de 16 billones; esta cantidad es más que suficiente para restablecer el trastorno del movimiento molecular á su estado normal.

Puede pretextarse como una objeción que las moléculas de una sal dada, administrada como una medicina, se unirían con sus semejantes contenidas en la sangre, y de esta manera harían ilusoria cualquiera intención curativa; pero esta combinación no puede tener lugar simplemente porque el ácido carbónico que se encuentra en la sangre forma un medio aislador de las sales.

RELACIONES DE LA BIO-QUÍMICA AL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO.

Frecuentemente se ha hecho esta pregunta: "¿el método de Schüssler es la homeopatía?" y también con frecuencia se ha contestado tanto por la afirmativa como por la negativa. Schüssler mismo pretende que no está relacionado de modo alguno á la homeopatía, y coloca ante ella á la Bio-química con un deseo manifiesto de llegar á ser el fundador de un nuevo sistema de medicina.

Pretende, con otros, que los Remedios de los Tejidos obran supliendo la deficiencia. Esta idea, tomada literalmente, parece errónea; por ejemplo, en un desorden de las moléculas de *Natrum mur.* no hay precisamente una *deficiencia* de *Natrum mur.*

en el cuerpo, sino más bien una falta de continuidad en la disposición de las moléculas existentes en él. Esta sal dada como remedio no suple una falta ó deficiencia de la misma, porque la cantidad suministrada es por lo regular demasiado infinitesimal para ese objeto, en cuyo caso sería conveniente se administrase en cantidad con el alimento y la bebida para el objeto deseado. Lo que se puede obtener con las dosis mínimas es el arreglo del equilibrio de la cadena molecular del *Natrum mur.* en los tejidos afectados, como antes se explicó, haciendo de este modo que ejecuten propiamente sus funciones; porque, puesto que el déficit es una falta molecular, el suplemento debe también ser molecular.

Esta idea de la acción de los remedios no es nueva, como puede atestiguarlo cualquiera de los que hayan leído cuidadosamente las obras de Von Grauvogl, aquel astuto observador. Muchas de las ideas de Schüssler pueden verse profetizadas en Grauvogl y en Hering.

Siempre ha sido un objeto de disputa la acción de nuestros remedios homeopáticos. La cuestión, abrazando lo referente á las dosis infinitesimales, es una de las más vitales para la Homeopatía, y una de las que aún hoy nos expone al ridículo de nuestros comprofesores de la antigua escuela.

Insinuamos la hipótesis de que la homeopatía y la bio-química son una misma cosa; que la bio-química es una interpretación racional de la acción homeopática contenida en la ley de Hahnemann, *Similia Similibus Curantur!*

La tabla siguiente muestra, según los análisis que hasta ahora se han hecho, que las Doce sales de los Tejidos son constituyentes de muchos de nuestros bien conocidos y experimentados remedios del reino vegetal:

TABLA.

Ferr. phos.	China, Gelsem., Veratr., Acon., Arnica, Ail., Anis stel., Phytol., Berb. vulg., Rhus, Asaf. (4), Viburn. pr., Secale (.25), Graphite (2.74).
Calc. phos.	China, Viburn. pr., Ail., Phytol., Berb. vulg., Coloc. (2.7), Graphite.
Natr. phos.	Rheum, Ail., Anis stel., Hamam.
Kali phos.	Pulsat., Bapt., Rhus, Veratr., Epiphegus, Viburn. pr., Digit., Cimicif., Cactus gr., Stramon., Xanth., Ail., Anis stel., Hamam., Phytol.
Kali mur.	Phytol., Sanguin., Stilling., Pinus C., Asclep., Viburn. pr., Ail., Anil stel., Hamam., Cimicif.
Natr. mur.	Cedron, Arum tr., Ail., Anis stel., Hamam., Cimicif., Secale (.50).
Calc. fluor	Phytol.
Silicea.	Equisetum (próximamente 18.2), Cimicif. (4.), Chelidon., Graphite (13.), Secale (.15).
Calc. sulph.	Apocyn., Ail., Asaf. (6.2).
Natr. sulph.	Apocyn., Iris v., Chamom., Chionanthus, Lycop., Bryon., Podoph., Chelid., Nux vom., Anis stel., Hamam., Cimicif.
Kali sulph.	Pulsat., Hydrast., Myr. cer., Cimicif., Phytol., Viburn. pr., Anis stel., Hamam.
Magnes phos.	Viburn. op., Bellad., Lobel., Stramon., Viburn. pr., Ail., Secale (.50), Coloc. (3.), Gelsem., Rhus, Graphite.

Las cifras de la anterior tabla indican el tanto por ciento.

Esta tabla es muy incompleta; porque han sido sólo analizados comparativamente pocos de los remedios que usamos de los reinos animal y vegetal, y muchos de estos análisis se han hecho tan imperfectamente que sólo se anotan en ellos la presencia de estas sales, sin dar sus proporciones. Hacer esto exactamente sería obra costosa y de mucho tiempo. Por consiguiente, para el Alópata, esta es cuestión de poca importancia; pero nosotros, como Homeópatas, quienes usamos las dosis infinitesimales, tan enormes cantidades como 18.2 por ciento de *Silicea* que se encuentran en *Equisetum;* 6 por ciento de las sales de sodium y potasium en *Hamam;* 4 por ciento de *Silicea* en *Cimicif;* 3 por ciento de *Magnes. Phos.* en *Coloc;* así como otros constituyentes inorgánicos en cantidades diferentes, llega á ser un asunto de vital importancia. Podríamos obtener un análisis exacto cuantitativo y proporcionado de cualquiera substancia del reino animal ó vegetal, examinar luego minuciosamente sus síntomas y decir cuáles pertenecen á una sal de tejidos y cuáles á otra; y es muy probable que nosotros, por este medio, fácilmente explicaríamos *por qué los síntomas de una droga se hallan tan frecuentes en la patogenesia de otra, por qué lo que es característico en una lo es solamente génerico en la otra,* cuando, realmente, no pertenece de un modo exacto á cualquiera de las dos, sino á una sal de tejido inorgánica, constituyente de cada droga.

Quizá la droga de la que se ha hecho un análisis más completo es *Phytolaca decandra.* Después de

que por la evaporación é incineración se separan los constituyentes orgánicos, quedan 8.4 por ciento de los inorgánicos; de estos, 6.8 por ciento son solubles y consisten por lo común en sales de potasio, mientras los residuos insolubles, 1.6 por ciento, se componen de calcium, fierro y silicea. Si comparamos la patogenesia de *Phytol* con la aplicación bio-química de estas sales, veremos una sorprendente y significante analogía. Como la cantidad más grande de sales inorgánicas que aquella contiene es el potasium, hallaremos que los más de los síntomas de *Phytol*, corresponden á los *Kalis*, en tanto que los síntomas febriles correponden á calcium, fierro y silicea. Ilustra esto la tabla siguiente:

KALI MUR.	KALI PHOS.	KALI SULPH.	CALC. PHOS.	CALC. FLUOR.	CALC. SULPH.	FERR PHOS.	SILICEA
Trompas de Eustaquio obstruidas. Secreción acuosa de la nariz. Ulceras en la boca, en las amigdalas y en la garganta. Expectoración dificil del moco. Difteria. Cefalalgia. Oftalmia catarral Frialdad en la cabeza. Ulceras pequeñas en la boca. Inflamación de las encias. Pérdida del apetito. Vómitos de sangre coagulada. D arrea. Hemorroides sangrantes. Constipación, sedimento rojo en la orina, gonorrea y gota militar. Sifilis, chancros, úlceras. Infartos duros en las mamas. Senos supurados. Ronquera; afonía. Expectoración espesa y viscosa. Hinchazón de las articulaciones de los dedos. Reumatismo agravado por el movimiento. Ulceras en las piernas. Glándulas hinchadas é inflamadas. Sycosis. Escarlatina con angina.	Irritabilidad. Timidez. Melancolia. Tristeza. Deseo urgente para orinar. Cancrum oris. Menstruación profusa y anticipada. Vértigo. Cara hipocrática. Dolores en el cáncer. Gran agotamiento y postración. Ciática. Siente cansancio al despertar. Pus fétido é icoroso.	Capa amarilla en la lengua. Tos agravada en la noche. Sensación de sofocación. Dolores reumáticos ambulantes. Sifilis. Garraspera agravada en la noche Reumatismo articular crónico.	Glándulas inflamadas é hinchadas. Dolores agudos en la noche. Dentición retardada.	Nudosidades, tumorcillos y glándulas induradas en los pechos de las mujeres. Fisura del recto, dolor en la región lombar. Tumores duros en las piernas.	Supuración acelerada. Tiña capitis. Mamas supuradas. Diviesos.	Huesos inflamados. Sensación de arena en los ojos. Sensación de quemadura Vómitos de sangre y viscosos. Dolor en el esternón con tos.	Supuración apresurada. Sudor de pies. Dolores en el periostio. Ulceras.

En el análisis cuantitativamente correcto, hallaríamos probablemente algo de *Natr. mur.*, como uno de los síntomas prominentes en *Phytol:* por ejemplo, la secreción acre y acuosa de la nariz.

Esto explicará por qué tenemos diferente conjunto de síntomas bajo la acción de una droga homeopática, pareciendo competir entrambos, siendo cada uno producido por una sal diferente de los tejidos.

Esto vale mucho para las substancias del reino animal y vegetal, que pueden reducirse por medio del análisis á cuerpos elementales.

En el reino mineral la acción es algún tanto diferente. Nada necesita decirse de aquellos remedios que son compuestos de *sulphur* y de *phosphorus*, ellos derivan su potencia medicinal por las combinaciones que forman las sales de los tejidos. Los carbonatos llegan á trasformarse en fosfatos; esto se aplica á aquellas drogas como *Kali carb.*, *Calc. carb.*, *Magnes. carb.*, etc.

Quedan solamente los minerales, tales como Aurum, Platinum, Argentum, etc. Estos en estado bruto se consideran como inertes, y desarrollan su potencia si los trituramos.

En estado bruto no parecen sufrir cambios materiales por la acción de algunos de los ácidos orgánicos del cuerpo. Finalmente, cuando los dividimos, quedan siempre lo mismo; pero se desarrolla en ellos una nueva potencia, un poder *catalítico.*

Son muy pocos, por desgracia, los ejemplos de poder *catalítico.* Uno de los conocidos es el siguiente:

El Platinum en masa no cambia (no se combina

con el oxígeno é hidrógeno), como lo haría, según la química nos enseña, si estuviera sutilmente dividido, sin sufrir cambios en sí mismo.

Consiste la *catalísis* en que un cuerpo produce cambios en otro sin cambiar él mismo.

El por qué de esta acción no es conocido, pero sin embargo es un hecho. La *catalísis* es *acción de contacto*, y por esta acción de contacto, las drogas minerales obran como inertes en el estado bruto; por la trituración se desarrolla una acción de *contacto*, la que origina cambios, y cuando se da en estado de salud produce *síntomas*.

Esto explica racionalmente cómo las substancias inertes adquieren por subdivisión (trituración) propiedades medicinales. Este ha sido largo tiempo el tropiezo alopático para la comprensión de la Homeopatía.

¿No tratamos cuando experimentamos una droga, es decir, cuando la administramos en estado de salud para producir síntomas (y casi todas nuestras experimentaciones homeopáticas son hechas, con la droga potentizada, más ó menos, cuya operación potentiza también las sales inorgánicas contenidas en aquella), producir un desorden en el equilibrio molecular de las sales de los tejidos que contienen la droga propinada? Por ejemplo: Cuando damos Phytol. ¿no la experimentamos, en virtud de las 6, 8 por ciento de sales de potasio que contiene, causando un desorden molecular de estas sales, el que no ocurriría si fuese dada en una forma tan bruta que no

pudiese tomarse por los conductos del neurilema de los nervios del gusto, etc.?

Este desorden es corregido solamente cuando se debe la enfermedad á la influencia de la administración de Phytol, siendo las sales de potasio que en ella se encuentran las que le dan su poder curativo. En vista de esto, de ninguna manera sacamos la conclusión de que cada droga sea una entidad, experimentada como un todo, sino que contiene muchas sales que son en ciertas proporciones su complemento esencial, cuya presencia es necesaria para fijar, determinar é incorporar la esencia interior de la droga; y es una cuestión que debe ser determinada, ya sea que obtuviéramos los mismos resultados dando los constituyentes de la sal inorgánica de una droga como propinando la droga misma. Nos parece, si esto fuera posible, que lo primero sería una Homeopatía más elemental, y ésta una Bio-química indirecta.

Schüssler, en su última edición alemana, admite esto y dice que el desorden del movimiento molecular de las sales celulares inorgánicas manifestándose como enfermedad, es rectificado por la Bio-química *directamente* administrando substancias homogéneas, siendo así que es rectificado *indirectamente* por la Homeopatía administrando substancias heterogéneas.

PARTE II.

MATERIA MEDICA DE LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS.

CALCAREA FLUORICA.

SINÓNIMOS.—Calcii Floridum. Calcium Fluoride. Calcarea Fluorata.

NOMBRE COMÚN.—Espato fluor. Fluoruro de cal.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula, Ca. F_2. Peso específico de los cristales, 3. 4. Contiene 58.21 partes de calcium. Se encuentra en la naturaleza en el espato fluor mineral; es hermosamente cristalino, cristalizando en diferentes colores que presentan una forma cúbica ú octaédrica. Es insoluble en el agua, pero descomponiéndose por el ácido sulfúrico produce ácido hidrofluórico.

PREPARACIÓN.—Escogidos los fragmentos de los cristales de espato fluor son preparados por trituración, como se prescribe en la Clase VII de la *Farmacopea Americana.*

DATOS QUÍMICO-FISIOLÓGICOS.—La *Calc. fluor.* se encuentra en la superficie de los huesos y en el esmalte de los dientes. Es también un constituyente

de las fibras elásticas y de la epidermis. Las fibras elásticas se hallan en la piel, en el tejido conectivo, y en las paredes vasculares.

Un desorden del equilibrio en las moléculas de *Calc. fluor.* produce una dilatación continua, ó una condición crónica de relajación, de las fibras que envuelve. Si las fibras elásticas de alguna porción de los vasos del tejido conectivo ó del sistema linfático han llegado á tal grado de relajación, la absorción de una exudación sólida en aquella parte no puede tener verificativo, en consecuencia se produce la induración. Cuando las fibras elásticas de los vasos sanguíneos sufren un trastorno de las moléculas de *Calc. fluor.*, el ensanchamiento patológico tiene lugar, el que se presenta bajo la forma de tumores hemorroidales, várices y venas dilatadas, tumores vasculares y glándulas induradas.

La pérdida de *Calcar. fluor.* en el sistema se conoce por estos síntomas:

1° Una exudación dura y nudosa en la superficie de un hueso.

2º Relajación de las fibras elásticas, en consecuencia, dilatación de los vasos, relajación y dislocamiento del útero, relajación también de las cubiertas abdominales, de lo que resulta el "vientre colgante," hemorragia de la matriz; ausencia de dolores de sobre parto.

3º Exudación de Keratina de las celdillas de la epidermis (la keratina está contenida en la piel, cabello y uñas). La exudación se seca pronto y forma una costra adherente. Con frecuencia se hallan en

las palmas de las manos, que por el trabajo, se les forman grietas y fisuras.

Con respecto de la reabsorción de la induración, consideramos dos posibilidades:

(a). Las fibras elásticas inmediatas á la induración han perdido su aptitud funcional á causa de la esforzada presión. Las moléculas de *Calc. fluor.* administradas restablecen su integridad funcional y de este modo están en disposición de expeler la exudación, la que entonces absorberán los vasos linfáticos.

(b). Por medio de la fuerza volumétrica de ácido carbónico contenido en la sangre el Fluoruro de cal desprende una parte de Fluorina, la que combinada con el Hidrógeno naciente, forma Acido hidrofluórico, el cual disuelve gradualmente las moléculas del producto morboso, y éstas son llevadas por los linfánticos.

La parte que desempeña el Acido Carbónico puede serlo también por el Sulfúrico. Este último se forma durante la oxidación de los albuminoides.

De un modo semejante, conforme á la explicación hecha en *b*, es posible efectuar por la *Calcar. fluor.* la solución de la membrana croupal de la laringe ó la exudación diftérica.

Acción general.—Se extiende á las enfermedades que tienen su asiento en la substancia que forma la superficie de los huesos, en el esmalte de los dientes, y en parte de todas las fibras elásticas, ya sean de la piel, del tejido conectivo, ó de las paredes de los vasos sanguíneos, etc. Así, todos los pa-

decimientos que puedan atribuirse á las condiciones de relajación de cualquiera de las fibras elásticas, incluyendo la dilatación de los vasos sanguíneos, tumores arteriales y venosos, hemorroides, várices y venas ensanchadas, glándulas induradas como la piedra. Mala nutrición de los huesos, especialmente de los dientes. Exóstosis después de traumatismos. Abdomen flácido. Dislocaciones uterinas, etc. Induraciones.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Gran depresión, temores infundados de ruinas pecuniarias. Indecisión. Disposición á fijar en el dinero más valor del que tiene.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Tumores sanguíneos en los huesos parietales de los recién nacidos, con una base áspera y huesosa; contusiones de los huesos del cráneo con masas duras, ásperas y desiguales; excrecencias duras sobre el cráneo; cefalohematoma; úlceras de la piel con bordes duros y callosos; cefalalgia acompañada de náusea extenuante en la tarde, mejoría por la noche.

En una experimentación por el Dr. Sarah N. Smith, el síntoma siguiente fué absolutamente constante: «Una especie de crujido, tensión y tirantez, semejante al ruido hecho por un violín desafinado y principalmente alternando con sueño.»

OJOS.—Alternativas de luz y chispas delante de los ojos, manchas en la córnea, conjuntivitis; después de ejercitar los ojos se borra la vista, dolor de

los globos oculares, alivio por cerrarlos y apretarlos ligeramente. CATARATA. Aumento de volumen de las glándulas meibomio. Casos de ceguera parcial. Obscurecimiento de la visión por esfuerzo excesivo de los ojos. Tumores de los párpados.

OÍDOS.—Depósitos calcáreos en el tímpano; enfermedad del mastoideo cuando está afectado el periostio.

NARIZ.—Frío en la cabeza, deseo ineficaz de estornudar, obstrucción por el frío, coriza seco, ozena. Catarro nasal copioso, de mal olor, amarillo, y en masas espesas y verdiosas. Vegetaciones óseas; afecciones de los huesos nasales; desaparece el olor de los huesos necrosados después de usar este remedio.

Vegetaciones adenoides en el espacio postnasal y en la faringe.

CARA.—Hinchazón dura del carrillo con dolor ú odontalgia, hinchazón endurecida de la mandíbula inferior; el frío, aunque ligero, molesta; úlceras duras y herpéticas en los labios, ocasionadas por el frío, no se extienden como con *Natr. mur.*

BOCA.—Tumores en las encías con dureza é hinchazón en la mandíbula, dureza pétrea é hinchazón en el maxilar inferior. El frío produce úlceras en las comisuras de la boca. Gran sequedad de la boca.

LENGUA.—Apariencia agrietada de la lengua con ó sin dolor. Hinchazón de la lengua; queda dureza después de la inflamación.

DIENTES.—El esmalte de los dientes es áspero y deficiente; aflojamiento prematuro de los dientes con ó sin dolor; vacilan en sus alveolos. Nutrición defec-

tuosa de los mismos. Si algún alimento toca el diente, produce odontalgia con aflojamiento del mismo.

GARGANTA.—Difteria cuando la afección viene de la tráquea. Relajación de la garganta con cosquilleo en la laringe causado por prolongación de la úvula. La campanilla relajada produce irritación, cosquilleo y tos. Esfuerzos para expectorar el moco en la mañana; ardor en la garganta, aliviado por las bebidas calientes. Gran sequedad de la garganta.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Vómitos de alimentos sin digerir; hipo por el esfuerzo de expectorar, mejorado y debilitado durante el día. Flatulencia.

ABDOMEN Y EVACUACIONES.—Constipación intestinal, imposibilidad para expeler las heces. Fisura del ano, y grieta intensamente dolorosa cerca de la extremidad inferior del intestino. Hemorroides sangrantes. Picazón en el ano como por lombrices pequeñas. Hemorroides internas y ciegas con dolores frecuentes en la espalda, generalmente debajo del sacro; constipación. Las hemorroides producen congestión á la cabeza. Dolor en el hipocondrio derecho que se agrava acostándose sobre el lado adolorido. Muchos gases en el intestino grueso.

ORGANOS URINARIOS.—Orina abundante acompañada de urgencia frecuente. Orina escasa y muy encendida, despide un olor picante.

EMBARAZO.—Los dolores de sobreparto son debidos á la debilidad de las contracciones uterinas. Nódulos endurecidos en las mamas. Dándolo durante el embarazo, no se presentan incomodidades de sobreparto.

ORGANOS SEXUALES.—Destilación constante de líquido seminal y prostático con degeneración de los testículos. Dislocación del útero. Dolor tractivo en la región del útero y muslos, descenso del útero.

Tonifica el poder contráctil del útero en los casos de flujo abundante. Excesiva catamenia con dolores y sensación de presión hacia abajo. Hydrocele, hidropesía de los testículos, induración de los mismos. Sífilis; chancro Hunteriano indurado.

APARATO RESPIRATORIO.—Cosquilleo en la laringe, sequedad y garraspera. La tos produce esfuerzos de expectoración como si un cuerpo extraño hiciera cosquillas en la laringe. *El remedio principal en el verdadero croup.* En el asma, cuando después de mucho esfuerzo se vomitan pequeñas masas de moco amarillento; tos con expectoración de pequeños pedazos de moco amarillo y glutinoso; sensación de cosquilleo é irritación al acostarse, producida por prolongación de la úvula como si una gota cayese al fondo de la garganta. Respiración difícil; la epiglotis se siente cerrada como si se respirase al través de una substancia densa.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—El aneurisma en su primer período puede ser reducido ó mantenerse sin crecimiento por este remedio y *Ferr. phos.*, con tal que no haya sido antes suministrado el *Ioduro de potasa.*—Dilatación, ensanchamiento de los vasos sanguíneos; siendo el principal remedio para restaurar la contractibilidad de las fibras elásticas. Dilatación del corazón con palpitaciones. Principal remedio para los tumores vasculares con dilatación

de los vasos. Ulceraciones varicosas de la venas; también ES EL PRINCIPAL REMEDIO PARA LA VÁRICES Ó DILATACIÓN DE LAS VENAS; hipertrofia del corazón.

CUELLO Y DORSO.—Glándulas cervicales induradas como una piedra. Bocio pequeño. Dolor de espalda simulando irritación espinal con debilidad, dolor tractivo que se extiende hacia abajo. Sensación de cansancio y dolor en la parte inferior del dorso (sacro), acompañado de ardor y plenitud, pereza intestinal. Casos crónicos de lumbago agravados al comenzar á moverse y mejorados por la continuación del movimiento.

EXTREMIDADES.—Tumores ó ganglios enquistados en el dorso del carpo. Abultamiento gotoso en las articulaciones de los dedos, espina ventosa, lumbago por torcedura, inflamación articular de la rodilla, sinovitis crónica; crujido en las articulaciones, dislocación fácil de las falanges. Supuración de los huesos, tumores óseos en la espina del omóplato; hinchazón del codo, crepitación que acusa una falta de fluido sinovial. Exóstosis en los dedos; crecimientos óseos en los huesos de las extremidades inferiores. Esparavanes en los caballos.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Debilidad y fatiga todo el día, especialmente en la mañana.

SUEÑO.—Ensueños vivos con sensación de inminente peligro, ó escenas nuevas, lugares, etc.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Ataques de fiebre que duran una semana ó más, con sed y lengua seca y morena.

PIEL.—Hendeduras y grietas en la piel. Fisuras ó grietas en las palmas de las manos ó piel dura; fisu-

ra del ano. Supuración con bordes duros y callosos. Panadizos en supuración; propensión á la erisipela. Ulceras fistulosas é indolentes con secreción de pus amarillo y espeso. Las úlceras varicosas de larga duración han sido curadas por el remedio que venimos estudiando.

Eczema debido á hiperemia venosa; peor en el tiempo húmedo; mejoría por la noche. Eczema escamoso, con engrosamiento y hendeduras de la piel. Eczema del ano como consecuencia de las hemorroides.

TEJIDOS.—Infiltraciones solidificadas, y también *glándulas induradas como una piedra.* Crecimientos óseos, especialmente en las articulaciones del tarso y del carpo. *Nudosidades y tumores en las mamas.* Contusiones en la superficie de los huesos, con masas duras, ásperas y desiguales, así como en las espinillas. Hidropesía causada por afecciones del corazón; anemia; ganglios, tumores císticos por una torsión de las fibras elásticas, relajación de estas mismas fibras. HINCHAZONES Ó INDURACIONES, teniendo su asiento en la fascia y en los ligamentos capsulares de las articulaciones ó en los tendones. Espina ventosa. Ulceras indolentes. Caries del hueso y esmalte, aspecto inyectado del hueso. Uñeros ó panadizos; exudación de la superficie de los huesos, la que se endurece prontamente adquiriendo una forma nodular ó desigual. Supuración de los huesos.

MODALIDADES.—Agravación con el tiempo húmedo; pero mejoría por las fomentaciones y friegas.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—*Calc. fluor.* ha sido experi-

mentada por J. B. Bell, y la experimentación se publicó completa en *Allen's Encyclopedia*, vol. X, pág. 398. Los datos más completos se hallan en el *Guiding Symptoms*, vol. III. La droga había sido muy poco usada, casi nada, homeopáticamente, hasta que Schüssler la elevó á un grado prominente.

ADMINISTRACIÓN.—Las más altas potencias de esta droga dan los mejores resultados, especialmente en las afecciones de los huesos. Puede también usarse exteriormente en enfermedades tales, como fisura del ano, excrescencias óseas, hemorroides, venas varicosas y panadizos. Se emplea disolviendo cerca de veinte granos de la potencia deseada en medio vaso de agua y aplicándola en compresas humedecidas de algodón, lino ú otro modo cualquiera: Schüssler recomienda la 12ª trituración decimal.

RELACIONES.—Los síntomas de *Calcarea fluorica* en la mente y en la laringe se estudiarán en conexión con los relativos de *Calc. carb.* y en sus síntomas sobre el sueño con *Fluoric acid.* Corresponde á muchos síntomas de *Phosphor.*, *Mercur.*, *Ruta*, *Aurum*, *Silicea*, etc. Con frecuencia es útil después de *Rhus* en el lumbago, teniendo las mismas modalidades; después de *Silicea* en las supuraciones; después de *Bryonia* y *Calcarea* en la artritis; después de *Sticta* y *Ferrum phos.* en la sinovitis; después de *Natrum mur.* en los resfriados. Compárese, además: en las hinchazones de los huesos del cráneo en los niños, con *Silicea;* en la supuración de los huesos, con *Calc. phosph.*, *Assafœt.* y *Silicea;* en los esparavanes de

los caballos con *Phosph. acid* y *Silicea.* En la anemía es útil después de *Calcar. phos.*

Grupos para estudio.—Para las induraciones: *Calc. fluor.*, *Baryta iod.*, *Calcar. iod.*, *Hecla lava*, *Asterias*, *Conium*, *Phytolacca*, *Carbo. anim.*, *Mercur*, *prot. iod.*, *Silicea.* Para el ozena: *Cadmium*, *Calc. phos.*, *Nitric. acid*, *Kali bich.*, *Aurum*, *Hepar*, *Antimon. sulph. aur.*, *Aurum mur. natron.*, *Arsenic. iod.*, *Natrum carb.*, *Syphilin.*

CALCAREA PHOSPHORICA.

Sinónimos.—Calcii Phosphas Precipitata. Calcis Phosphas. Fosfato precipitado de Calcium. Fosfato de Calcium.

Nombre común.—Fosfato de cal.

Propiedades Químicas.—Fórmula $Ca_3 (PO_4)_2$.

El Dr. Hering lo preparaba con el ácido fosfórico diluido que vertía en gotas sobre el agua de cal en cantidad suficiente para formar un precipitado blanco. Este era lavado con agua destilada y puesto á secar al baño de maría. Insoluble en el agua ó alcohol, es soluble en el ácido nítrico diluido y en otros ácidos, y también hasta cierta cantidad en agua de ácido carbónico.

Preparación. El *Fosphato de Cal* se prepara por trituración, como se indica en la Clase VII de la *American Pharmacopœia.*

Datos químico-fisiológicos.—*Calc. phos.* es absolutamente indispensable para el crecimiento y nutrición del cuerpo. Esta sal se encuentra en el plasma

de la sangre, y en los corpúsculos, saliva, jugo gástrico, huesos, tejido conectivo, dientes, leche, etc. Comunica solidez á los huesos; tiene una afinidad química especial con la albúmina, la cual forma la base orgánica para esta sal en las celdillas de los tejidos, y es necesaria siempre que la albúmina ó las substancias albuminosas se encuentran en las secreciones. También suministra nuevas celdillas sanguíneas, llegando á ser el principal remedio en la anemia y la clorosis. Es de la mayor importancia para el crecimiento de los tejidos blandos, promueve celdillas nacientes, suministrando la base principal para los nuevos tejidos, de aquí que sea necesario cuando se INICIA el crecimiento.

ACCIÓN GENERAL.—La *Calc. phos.* es curativa en toda enfermedad dependiente de alteración de las moléculas de cal en el organismo, como ocurre en la formación tardía del callo alrededor de los bordes de los huesos fracturados, en el crecimiento defectuoso, nutrición imperfecta del hueso y otras lesiones de textura que se encuentran en la raquitis y enfermedades de condición semejante; de este modo la esfera de acción del remedio abraza todas las ENFERMEDADES DE LOS HUESOS dependientes de una cualidad enfermiza de la sangre por un vicio discrásico, comprendiendo también los tejidos dérmico y huesoso. Cuando por cualquiera causa se asimila una cantidad insuficiente de Phosphato de cal para los usos de la economía animal, el sistema vegetativo sufre principalmente, causando NUTRICIÓN DEFECTUOSA el crecimiento imperfecto de las celdillas

y como consecuencia la degeneración y destrucción del tejido, con especialidad del huesoso y del sistema ganglionar. Es de uso DURANTE LA DENTICIÓN, en las convulsiones y espasmos de las personas débiles, en los escrofulosos, estimulando la nutrición, etc. Otro carácter importante es su PODER RESTAURATIVO después de las enfermedades agudas, ya sea directamente ó preparando la indicación para otros remedios, estimulando el sistema por su acción; de esta manera llega á ser un INTERCURRENTE é importante remedio. Reconociendo Schüssler el origen de los glóbulos rojos de la sangre en los blancos ó embrionarios, é influyendo esta droga en ellos con estímulo nutritivo, pretende que promoviendo la formación de los glóbulos blancos se promueve indirectamente la de los rojos.

Prácticamente se ha probado que esta droga es un tónico verdadero en muchos casos; en las enfermedades crónicas destructivas y hécticas, cuando los fosfatos están en exceso en la orina, corresponde de esta manera á la imperfecta asimilación secundaria y al defectuoso trabajo de los órganos de excreción. En la anemia consiguiente al crecimiento rápido de los adolescentes; en las mujeres debilitadas á consecuencia de repetidos partos, en la lactancia prolongada ó leucorrea y menstruación excesiva; en las enfermedades acompañadas de pérdidas debilitantes, como la bronquitis crónica, diarrea tuberculosa y sudores nocturnos, abscesos y úlceras escrofulosas, en todo esto tiene gran poder y acción curativa sobre las secreciones.

En la vejez, cuando disminuyen las funciones regenerativas del tejido nervioso, está perfectamente indicada la *Calc. phos.* y también es de utilidad en las afecciones cutáneas seniles y en la picazón vaginal como durante cualquier residiva de las enfermedades graves y agudas. En la tuberculosis pulmonar acompañada de extenuación, sudores nocturnos, hemoptisis y otros síntomas físicos característicos, *Calc. phos.* en baja potencia ofrece mucha esperanza para mejorar la gravedad del caso; es igualmente benéfica en las poluciones de los hombres jovenes recién casados (y en la excitación sexual de las mujeres) y en los onanistas. En los desarrollos de los huesos en los niños raquíticos, Traeger usa la sidra interior y exteriormente, y administra al mismo tiempo *Cal. phos.* ó *Calc. fluor.* Este es también su tratamiento favorito en la clorosis (sidra delgada, y tres veces al día cerca de 10 granos de la segunda trituración de *Calc. phos.)*, y lo prefiere con mucho al tratamiento usual con el fierro. Las sales de cal administradas en la corea durante la pubertad sosiegan á nuestros enfermos mucho mejor que los remedios comunmente recomendados.

DOLORES EN EL LUGAR EN QUE LOS HUESOS FORMAN SUTURAS Y ADORMECIMIENTO Y SENSACIÓN DE REPTACIÓN, dolores con calofrío, debido á los síntomas anémicos, agravación por la humedad, tendencia á la traspiración y al infarto glandular. Las sensaciones por lo común se manifiestan en un pequeño lugar; diátesis phosphática, falta general de calor vital y agravación por la humedad.

Si el movimiento molecular de *Calc. phos.* está desordenado en las celdillas epiteliales de las membranas serosas, tiene lugar en la bolsa una exudación sero-albuminosa.

De este modo desarrolla la hidropesía del ovario, el higroma de la rótula, etc. Pequeñas dosis de *Calc. phos.* absorberán estas exudaciones.

Si las celdillas de la epidermis han perdido *Calc. phos.*, la albúmina saldrá hacia la superficie y por desecación forma una costra, una descamación que puede efectuarse de una manera terapéutica por la administración de *Calc. phos.* Semejantes secreciones albuminosas se localizan en las superficies mucosas, si su epitelio sufre á causa de la pérdida de *Calc. phos.*

Los espasmos y dolores producidos por la anemia son curados con este remedio; estos dolores son acompañados de una sensación de hormigueo, frialdad y entorpecimiento.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Debilidad de la memoria, ansiedad mental con agitación. Los niños son impertinentes, enojadizos, estúpidos, tardíos en comprender. Además de esto, pesar, contrariedad, disgusto.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Vértigo en las personas ancianas; dolor de cabeza con sensación de frío en ella; la cabeza se siente fría al tocarla. Ce-

falalgia antes y durante el período de la segunda dentición, PEOR EN LA REGIÓN DE LAS SUTURAS, después de ejercicios mentales, por la humedad y CAMBIO DE TEMPERATURA. Dolor de cabeza con flatulencia. Cefalalgia reumática, sensación de desgarramiento en los huesos del cráneo.

Reptación, SENSACIÓN DE HIELO EN EL OCCIPUCIO. Dolor de cabeza en las escolares que están en la pubertad, son muy nerviosas, inquietas, con diarrea ocasionada por el uso de gelatinas y cosas ágrias. FONTANELAS ABIERTAS POR MUCHO TIEMPO, SIENDO EL CRÁNEO BLANDO Y DELGADO. Hidrocéfalo crónico; cabeza voluminosa, suturas separadas. Craniotabes. Dolor en el cuero cabelludo, tensión, entorpecimiento, picazón del cuero cabelludo en la tarde. Ulceras escrofulosas en la parte superior de la cabeza. Condiciones hidrocefaloides, agudas ó crónicas; también las impide el uso de este remedio. Manchas de calvicie en la cabeza.

OJOS.—Afecciones espasmódicas de los párpados si *Magnes. phos.* no produce efecto. Amaurosis y catarata. Inflamación y sequedad excesiva de los ojos durante la dentición. Fotofobia. La luz del gas no puede tolerarse. Ulceras en la córnea. Opacidades consecuentes á la inflamación de los ojos. Keratitis y oftalmía en las personas escrofulosas.

Ambliopía congénita en los niños de una constitución raquítica y diátesis escrofulosa.

OÍDOS.—Sensación de frío al exterior. Todos los huesos del oído se sienten dañados y doloridos. Do-

lor de oídos con síntomas reumáticos é hinchazón de las glándulas en niños escrofulosos.

Catarro crónico del oído con incomodidad á la vez en la garganta.

NARIZ.—La punta de la nariz tan fría como el hielo. Hinchazón y ulceración de la nariz en niños escrofulosos. Frío en la cabeza con secreción albuminosa de la nariz. Estornudos y escoriación de las ventanas de la nariz. Frialdad crónica en los sujetos anémicos y escrofulosos. Pólipos nasales grandes y pedunculados. Ozena, con *Calc. fluor.* Epistaxis por la tarde.

CARA.—Cara llena de barros, especialmente en las muchachas. Aspecto pálido, sucio y como grasiento, sudor frío en la cara. Prosopalgia; dolor en el maxilar superior, agravado por la noche.

Hinchazón de las glándulas parótidas y submaxilares con otalgia. Lupus. Pecas.

BOCA.—Gusto desagradable en la boca por las mañanas. Amargor con dolor de cabeza. Aversión para abrir la boca á causa del dolor de las tonsilas hinchadas. Labio superior hinchado y doloroso.

LENGUA.—Lengua hinchada, torpe, tiesa, con granulaciones y saburra blanca. En la mañana sabor amargo con dolor de cabeza.

DIENTES.—Desarrollo lento de los dientes; PADECIMIENTOS DURANTE LA DENTICIÓN; caída demasiado rápida de los dientes. Convulsiones durante la dentición (después de *Magnes. phos.*). Dolor de muelas desgarrante, terebrante, que empeora por la noche. Encías dolorosas é inflamadas, ó pálidas.

GARGANTA.—Glándulas externas dolorosas. Ronquera continua, ardor en la laringe y en la raíz de la lengua. MOLESTIA Y MUCHO DOLOR AL DEGLUTIR. Constante gargajeo y garraspera cuando se habla. HIPERTROFIA CRÓNICA DE LAS AMÍGDALAS. Dolor de garganta en los oradores. RELAJACIÓN DOLOROSA DE LA GARGANTA.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.— Cardialgía y flatulencia, hambre extraordinaria, sensación de hundimiento en el epigastrio. Dolor después de comer con molestia á la presión; los sufrimientos del estómago se agravan por tomar aun la más pequeña cantidad de alimento. Dispepsia con angustia en el estómago, aliviada temporalmente por comer y por expulsar gases. Cuando se está en ayunas, el dolor se extiende hacia la columna vertebral. Los niños necesitan mamar con frecuencia y vomitan repetida y fácilmente. Dolor en el estómago con debilidad; vómitos después de tomar agua fría ó helados; dolor de cabeza y diarrea que empeora comiendo. ANTOJO DE COMER TOCINO, JAMÓN, CARNES SALADAS Y AHUMADAS. MUCHA FLATULENCIA. ABDOMEN HUNDIDO Y BLANDO. Hipertrofia de las glándulas mesentéricas; cólico á cada intento para comer; marasmo.

ABDOMEN Y EVACUACIONES.—Dolencia, ardor, sensación de vacuidad y hundimiento en la región umbilical. Cólico con diarrea verde, viscosa, conteniendo alimentos sin digerir, acompañada de GASES FÉTIDOS. CÓLERA INFANTIL, mucho deseo de cosas indigestas como jamón, carne ahumada, etc.; abdomen hundido y blando. LA DEPOSICIÓN ES CALIENTE, ACUO-

SA, ABUNDANTE, DE MAL OLOR, RUIDOSA Y BABOSA. Es útil en los padecimientos del verano, en el marasmo y en los niños de pecho. Diarrea agravada por la fruta; gritos causados por la molestia y el dolor alrededor del ombligo cada vez que el niño mama. Modifica la tendencia á la producción de vermes intestinales en los enfermos anémicos y débiles *(Natr. phos.)*. Impide la formación de cálculos biliares oponiéndose á su reproducción. Hernia abdominal; secreción crónica hemorroidal en los pacientes anémicos y débiles; fisura del ano. FÍSTULA EN EL ANO, ALTERNANDO CON SÍNTOMAS DEL PECHO, Ó EN LAS PERSONAS QUE TIENEN DOLOR EN LAS ARTICULACIONES POR CUALQUIER CAMBIO DE TEMPERATURA. Fístula indolente; constipación, heces duras con sangre, especialmente en las personas de edad, acompañada con depresión de la mente, vértigo, dolor de cabeza y tos crónica. Hernia en los sujetos anémicos. Tabes mesentérica. Pus ofensivo en las deposiciones. Neuralgia ani. Dolor intenso en la parte inferior del sacro, que se presenta después de la defecación, durando todo el día hasta el momento de acostarse.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.— Se orina la cama y tiene gran debilidad. Urgencia frecuente para orinar. Dolores incisivos en la uretra y cuello de la vejiga; enuresis en los ancianos y en los niños pequeños, con gran debilidad; diabetes mellitus, cuando los pulmones están afectados; orina copiosa con cansancio. Enfermedad de Bright, albuminuria (alternando con *Kali phos.)*. Gonorrea crónica en las personas anémicas con picazón y dolorimien-

to, Hinchazón de los testículos y escroto. Arenillas, cálculos, depósitos fosfáticos, aumento de orina con sedimento formando copo. Piedra en la vejiga; impide la formación nuevamente de la misma. Hidrocele.

ORGANOS FEMENINOS.—Debilidad y angustia en la región uterina. DISLOCACIÓN UTERINA CON DOLORES REUMÁTICOS. Prolapso del útero con debilidad y sensación de hundimiento que empeora después de la defecación. Pulsaciones en los órganos genitales con sensaciones voluptuosas; también está indicada en la tendencia á la masturbación en los niños escrofulosos. Ninfomanía agravada antes del período menstrual; dolor violento en la espalda y en el útero. Dolorimiento en las sincondrosis sacro-iliacas. Leucorrea (como un tónico constitucional), secreción semejante á la clara de huevo, como la crema, peor en la mañana, con exitación sexual, tiene la enferma aversión al movimiento. Amenorrea. Anticipación del período menstrual en las jóvenes. La secreción de color rojo-claro, vuelve cada dos semanas menos penosa que otras veces. Menstruación durante la crianza. En las personas adultas, especialmente en las reumáticas, el período es tardío y obscuro, precedido de excitación sexual, acompañado y seguido por gran debilidad y angustia, con dolores reumáticos. Dolores como de parto antes y durante la menstruación; algunas veces después de exonerar ú orinar; agravación por el cambio de tiempo. Ardor en la vagina. Dureza de las mamas.

EMBARAZO.—Dolores ardientes y molestos en las

mamas; éstas se sienten alargadas. Mala calidad de la leche de la madre, es salada y de color azulado, el niño la rechaza. Decaimiento después del puerperio y durante el embarazo. Prolapsus en personas debilitadas (con *Kali phos.*). DESPUÉS DE LA CRIANZA PROLONGADA, agotamiento, voz débil, tos y dolor entre los hombros. Cansancio en los miembros durante el embarazo.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.—SUSPIROS INVOLUNTARIOS. Tos con expectoración no acuosa, de moco amarillo y albuminoso, peor en las mañanas y con dolor y sequedad en la garganta. Pecho dolorido al tacto. Esternón y clavículas doloridas con contracción del pecho y dificultad al respirar. Esfuerzos frecuentes para aclarar la voz. OPRESIÓN DEL PECHO, ASOCIADA CON FÍSTULA EN EL ANO. Tos crónica en los que padecen consunción y á la vez enfriamiento de las extremidades. Tisis incipiente en las personas anémicas. Sudor profuso con especialidad en la cabeza y cuello; casos obstinados de tos ferina ó en niños de pecho de constitución debilitada. Tos sofocante en los niños con mejoría al acostarlos. Catarros en los escrofulosos ó gotosos con anemia; espasmo de la glotis á causa de dentición retardada.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Palpitación con ansia, seguida por una debilidad temblorosa, particularmente de las pantorrillas. Aún existe la abertura del *foramen ovale.* Circulación imperfecta. Dolor agudo y penetrante en el corazón durante la inspiración.

CUELLO Y DORSO.—Cuello delgado en los niños.

Dolor reumático y rigidez del cuello por la más ligera acción de tragar. Dolor de espalda en la región lumbar por la mañana al despertar; dolor semejante á calambre en el cuello, alrededor de los hombros y omóplatos, en la espalda, región de los riñones, cuando hace esfuerzos al levantarse ó al sonarse. Dolorimiento en la sínfisis sacro-iliaca. Dolor incómodo en el cóxis. Enfermedad de Pott. Curvatura espinal en las jóvenes, especialmente en la época de la pubertad. Espina bífida. Adormecimiento en la espalda y región glútea.

EXTREMIDADES.—Dolor violento en los hombros y omóplatos, á lo largo de los brazos, no pudiendo levantar éstos; punzadas en los codos. Dolor calambroide en los antebrazos, muñecas, dedos, especialmente en el pulgar. Dolores ulcerativos en la raíz de las uñas; nudosidades gotosas. REUMATISMO ARTICULAR CON FRIALDAD Ó SENSACIÓN DE ENTORPECIMIENTO. Reumatismo que se empeora con los cambios atmosféricos, logrando estar bien en Primavera y vuelve de nuevo en el Otoño. Torpeza y frialdad de los miembros ó una sensación de hormigueo en las partes afectadas. Reumatismo gotoso, peor de noche y con el mal tiempo; dolor en todas las extremidades, con gran debilidad. Dolores reumáticos de carácter ambulante. Dolencia violenta de los muslos; dolores en las rodillas, agravándose al andar. Sensación de entorpecimiento en las extremidades inferiores; dolor en la espinilla; calambre en las pantorrillas. La articulación del tobillo se siente como dislocada; dolor gotoso en la misma articulación y

en los dedos gordos de los pies. Coxartrocace, tercer período. Sinovitis crónica. Hinchazón de las apófisis. Piernas torcidas en los niños. Lentitud para comenzar á andar. Ulceras fistulosas en las articulaciones del pie y en el maleolo. Enfermedad de Pott. Curvatura espinal. Abscesos lumbares. Periostitis y úlceras sifilíticas.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Neuralgias; comienzan en la noche, y vuelven períodicamente; profundas como si fuesen en los huesos; dolores desgarrantes, que empeoran con cualquier cambio de tiempo, con sensación de REPTACIÓN, TORPEZA y FRIALDAD, ó como choques eléctricos. Dolor en un lugar pequeño y limitado. Parálisis reumática. DESFALLECIMIENTO, cansancio, especialmente ascendiendo. Poca disposición para el trabajo. Temblor de los miembros. Gran debilidad después de enflaquecer por las enfermedades agudas. Convulsiones por la dentición. Espasmos de toda clase, después de que *Magnes. phos.* haya fallado. Epilepsia.

SUEÑO.—Somnolencia, especialmente en los ancianos, acompañada de pensamientos sombríos. Dificultad para despertar por la mañana. Los niños gritan en la noche. Constantes bostezos y pandiculaciones.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Horripilaciones fugaces. SUDORES NOCTURNOS, copiosos EN LOS TÍSICOS. Sudor frío en la cara y frialdad en el cuerpo. Fiebre intermitente crónica en los niños escrofulosos.

PIEL.—Piel seca, fría, arrugada, cobriza y llena de barros. Ulceración de las cicatrices. Piel escaldada, escoriaciones; comezón de la piel y de carác-

ter senil en los ancianos. Eczema con costras ó vesículas blancas y amarillas en las personas de constitución, anémica, escrofulosa ó gotosa. Las pecas disminuyen con el uso de este remedio. Herpes agudo ó crónico con picazón. Lupus, prúrigo, prurito y comezón. Prurito vaginal en las mujeres ancianas. Exudaciones albuminosas en la piel; tubérculos en la misma; ulceraciones escrofulosas de los huesos. Los diviesos forman úlceras. Acné rosácea.

TEJIDOS.—En la ANEMIA y la CLOROSIS suministra nuevas celdillas sanguíneas. NIÑOS EXTENUADOS, CONTRAÍDOS, DE CARNES BLANDAS. Complexión color de cera, verdosa ó blanca. Exóstosis, osteofitos y enfermedades de los huesos. Condilos hinchados. RAQUITIS. DIFICULTAD PARA SOLDAR LOS HUESOS EN CASO DE FRACTURA. Espina bífida. PÓLIPOS, nasal, rectal y uterino; tabes, diátesis fosfática. Nutrición defectuosa. Huesos delgados y frágiles; afecciones hidrópicas, irregularidad en el desarrollo. Todos los padecimientos se acompañan de extenuación. Leucœmia, exceso de glóbulos blancos. Broncocele, bocio, quistes. Tumores blancos. Enfermedades pancreáticas. Dolencia en los tendones y coyunturas.

MODALIDADES.—Los síntomas se agravan generalmente con el frío, el movimiento, los CAMBIOS DE TIEMPO, y humedeciéndose. Muchos se mejoran por acostarse.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—Experimentado por C. Hering, la compendió en la *Guiding Symptoms*, volumen III, y en la *Allen's Encyclopedia*. Una historia de los diferentes experimentos se encuentra en el

Hahnemannian Monthly, Marzo, 1871, por C. Hering; también se halla un Resumen por el mismo en el *North American Journal of Homœpathy*, volumen XX.

ADMINISTRACIÓN.—Las más bajas trituraciones, 3X á 6X, son las potencias comunmente empleadas, problablemente producen los más satisfactorios resultados; pero también las más altas, 30 á 200, han obtenido éxitos brillantes. Schüssler prescribe la 6X. Dosis más grandes son poco usadas y aun perjudiciales. La administración prolongada ha producido el cólico nefrítico y la expulsión de pequeños cálculos.

RELACIONES.—Muy semejante á *Calc. carb.*; pero en *Calc. phos.* el paciente, cuyo aspecto es blanco-terroso ó moreno, está comunmente muy extenuado; corresponde más á las afecciones AGUDAS de los pulmones. Los PHOSPHATOS se adaptan á los de color obscuro en los ojos y el cabello, mientras que los carbonatos obran mejor en los de pelo claro y ojos azules. Ocupa un puesto entre *Calc. carb.* y *Phosphor.*, supliendo frecuentemente á este último con ventaja. *Calc. phos.* y *Berberis* son ambos útiles en la fístula del ano; tienen gran semejanza en los síntomas del pecho, particularmente los que se siguen á operaciones quirúrgicas. En los dolores de cabeza de las escolares anémicas, es seguida por *Magnes. phos.* En la caries dental es semejanto á *Fluor. ac.*, *Magnes. phos.* y *Silicea;* en la epilepsía á *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Kali phos.* y *Silicea;* en la diabetes á *Kali phos.*, *Natr. phos.;* la última también es

semejante en las afecciones verminosas. Sigue á *China* en el hidrocéfalo y en la anemia. Es complementaria á *Carb. an.* y á *Ruta.* En la neurastenia puede ser preferida *Calc. hypophos.* por los síntomas semejantes. En los sudores copiosos, después de enfermedades agudas y debilitantes, compárese con *Psorin.* En el reumatismo articular agudo, si después de *Natr. mur.* y *Kali phos.* quedan todavía señales de la enfermedad. En el lupus, compárese con *Kali mur.* El suero y el koumiss son alimentos inestimables para los ancianos, porque el acid. lactic. en ellos contenido, disuelve el *fosfato de cal* é impide la osificación en los tendones, arterias, etc. Como un remedio para los ancianos, compárese con *Baryta.* En la ANEMIA y CLOROSIS compárese también con *Natr. mur.*, especialmente con constipación, palpitación al acostarse, color exterior terroso. En el acné, *Calc. picr.* es con frecuencia más útil para los niños y *Calc. phos.* para los jóvenes. En la dispepsia, aliviada temporalmente comiendo encuentra su aplicación *Calc. phos.*, pero la droga que tiene este síntoma específico es *Anacardium. Chelidon.* tiene una condición semejante. Compárese con *Helonias* en la depresión mental, debilidad y orina fosfática; con *Silicea* en la anemia de los niños delgados y enfermizos con tendencia al raquitismo, pero con traspiración muy oleaginosa en la cabeza; también con *Ferr.*, *Cupr.*, *Arsenic.*, etc., *Zinc.* es su suplementario en el hidrocéfalo, y *Ruta* en las afecciones articulares. En la dificultad de consolidación de las fracturas compárese con *Symphytum.* En la

consunción, *Calc. phos.* es seguida con éxito por *Silicea*, *Sulph.*, *Tuberc.*, y con frecuencia indicada después de *Phos.*, *Merc.*, *Iod.*, y *Arsen. iod.*

CALCAREA SULPHURICA.[1]

SINÓNIMOS.—Calcii Sulphas. Sulfato de calcio.

NOMBRE COMÚN.—Yeso. Sulfato de cal. Estuco.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula $Ca\ SO_4$. Se encuentra en la naturaleza como anhidrita, yeso, alabastro y selenita; también en varias aguas, constituyendo una causa de crudeza permanente. Peso molecular, 172. Se presenta como prismas aplanos (selenita) y en masas terrosas (yeso). Es un polvo fino, blanco cristalino, soluble en 400 partes de agua fría, insoluble en el alcohol y en los ácidos nítrico é hydroclórico diluidos. Puede obtenerse precipitando una solución de cloruro de calcium en ácido sulfúrico diluido.

PREPARACIÓN.—Por trituración, como se indica en la clase VII de *nuestra Farmacopea.*

DATOS QUÍMICOS FISIOLÓGICOS.—Según Bunge, se

---

1 En los últimos años de la vida del Dr. Schüssler fué descartado de su lista este remedio, dejando solamente *once* en vez de los *doce* remedios de los tejidos. Se ha pensado mejor retener el número original contenido en las precedentes ediciones de esta obra, tomando en cuenta las pruebas clínicas que han sido recogidas en favor de este remedio. En una de las últimas ediciones de la terapéutica de Schüssler, Natrum phos. y Silicea están sustituidas por este remedio.

presenta solamente en la bilis, y aun aquí no es constante su existencia.

La *Calcarea sulph.* contenida en la bilis, viene del hígado, en donde llena la función de destruir los corpúsculos gastados de la sangre roja, separando el agua que contienen. Por causa de la falta de *Calcar. sulph.* en el hígado, se impide la destrucción de corpúsculos ineptos y en consecuencia la sangre contiene pronto una superabundancia de celdillas inútiles. Bajo las condiciones normales, todos los corpúsculos inútiles de la sangre se desagregan en el hígado por la acción de *Calcar. sulph.*, sus residuos son excretados por la acción de la bilis y separados de la sangre por el camino más corto que pudieran seguir; pero si una parte de esos corpúsculos inútiles puede destruirse por oxidación en la circulación, su eliminación de este modo se volverá tardía.

Los residuos que no son excretados de la circulación por la vía del hígado, ni conducidos por los vasos linfáticos, llegan á las membranas mucosas y á la piel, y producen allí catarros y erupciones.

Acción general.—*Calc. sulph.* está en estrecha relación con las supuraciones; cura las secreciones purulentas de las membranas mucosas y las exudaciones del mismo género en los sacos serosos, tan bien como las úlceras ó abscesos tuberculosos de los tintestinos, úlceras de la córnea, etc. Es curativa en las supuraciones en aquel período en que la materia se ha descargado, ó continúa fluyendo después de que el sitio infiltrado ha secretado su contenido

purulento. En todos los padecimientos en que el proceso de secreción continúa por mucho tiempo y la supuración afecta el tejido epitelial. Obra sobre el tejido conectivo. Si hay una deficiencia de esta sal en cualquiera parte de sus dominios, por pequeña que sea, resulta la supuración. La presencia del PUS EN UN TUMOR es la indicación general. (J. C. Morgan).

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Genio voluble. Pérdida repentina de la memoria, del conocimiento interior.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Tiña en los niños; si hay secreción purulenta ó amarilla, costras purulentas. Supuraciones, etc., en el cuero cabelludo. Dolor de cabeza con náusea y sensación de hundimiento en los ojos. Dolor en toda la cabeza, peor en la frente. Craniotabes. Vértigo con terrible náusea.

OJOS.—Abscesos profundos en la córnea. Inflamación de los ojos con secreción de materia amarilla y espesa. En el hipopión para absorber la efusión de pus en el ojo, después de *Silicea*. Retinitis. Ulceras profundas sobre la córnea. Oftalmía, pus espeso y amarillo. Córnea opaca, pus en la cámara anterior, sensación como de un cuerpo extraño; hay levantamiento del ojo hacia arriba, después de traumatismo del ojo por una astilla. Keratitis y conjuntivitis flic-

tenular acompañadas de hinchazón de las glándulas cervicales. Hemiopía, punzadas en los párpados. Angulos del ojo inflamados.

Oídos.—Sordera con secreción de materia del oído medio, algunas veces mezclada con sangre, después de *Silicea*; granos alrededor del oído. Hinchazón sensible detrás del oído con tendencia á la supuración.

Nariz.—Frío en la cabeza, secreción nasal purulenta, amarillosa y espesa, frecuentemente teñida con sangre. Hepistaxis; la nariz fluye de un lado. Bordes doloridos de las ventanas de la nariz; secreción amarillenta de la parte posterior de las fosas nasales.

Cara.—Hinchazón del carrillo; amenaza de supuración; granos blandos bajo la barba, erupciones herpéticas sobre la cara; *granos y pústulas en la misma.*

Boca.—Dolor en la parte interior de los labios. Ulceración de ellos.

Lengua.—Lengua floja, pareciendo tener una capa de arcilla seca. Gusto agrio, picante y como de jabón, capa amarilla en la base, inflamación de la lengua con supuración, color arcilloso.

Dientes.—Odontalgia reumática, el interior de las encías hinchado y dolorido; hinchazón del carillo. Las encías sangran con el frote del cepillo sobre los dientes. Tumores en la encía, ulceración de los dientes. "Es el mejor remedio para las postemillas." (M. F. R.)

GARGANTA.—Mal de garganta con supuración, último período de la ulceración con secreción de materia amarilla. Tonsilitis en grado de supuración cuando el absceso se ha descargado, difteritis de la parte blanda del paladar, las fauces están muy hinchadas. Angina, secretando pus.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Deseos de fruta, té, clarete, y de vegetales ácidos y verdes. Mucha sed y apetito, náusea con vértigo. Dolor en el paladar cuando se come, molestia ardorosa en el estómago,

ABDOMEN Y DEPOSICIONES.—Diarrea purulenta mezclada con sangre, disentería, evacuaciones saniosas con pus, úlceras intestinales en el tifus. ABSCESOS DOLOROSOS CERCA DEL ANO en casos de fístula; dolores en la región del hígado y lado derecho de la pelvis, seguidos de debilidad, náusea y dolor de estómago. Diarrea después de tomar árbol de azúcar y por el cambio de tiempo, prolapsus ani, constipación con fiebre héctica y dificultad para respirar. Secreción intestinal viscosa y como el pus.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Orina roja con fiebre héctica, estado crónico de la cistitis con formación de pus, nefritis; detiene la supuración en los casos de bubones si se alterna con *Silicea*. Gonorrea con secreción saniosa y purulenta, absceso de la próstata, supuración crónica en el último período de la sífilis, ulceraciones glandulares, etc.

Espermatorrea; menstruación tardía, prolongada, con dolor de cabeza, pellizcos y gran debilidad. Extravasación de pus en los tejidos de la pelvis no limitada por alguna membrana pyogénica. (Betts).

SISTEMA RESPIRATORIO.—Tos con esputos purulentos é icorosos y fiebre héctica, asma con la misma clase de fiebre. Empiema, formación de pus en los pulmones ó en las cavidades pleurales, expectoración purulenta y saniosa, dolores en el pecho, tercer período de la neumonía, ronquera tenaz.—Tercer período de la bronquitis, empiema después de la toracentesis; consunción, esputos purulentos, catarro con secreción de masas espesas, blanco-amarillentas ó como el pus. Croup (después de *Kali mur).* Tos intensa en los niños con molestia en el pecho, deposiciones verdes y erupciones herpéticas.

EMBARAZO.—Mastitis, cuando es secretada la materia (después de *Silicea).*

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Pericarditis, período supurativo.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Dolor en la espalda y en el coxis; dedos tiesos; carbunclos en la espalda; último período de la supuración de los dedos, cuando aquella continúa y es solamente superficial. Ciática.

Reumatismo agudo y crónico, enfermedad de la articulación de la cadera por la secreción de pus; este remedio con *Ferr. phos.* completará la curación. Supuración de las heridas. COMENZÓN ARDOROSA DE LAS PLANTAS DE LOS PIES.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Punzadas nerviosas. Debilidad y languidez. Nevralgía en las personas ancianas.

SUEÑO.—Somnolencia durante el día, insomnio; sueña, si es mujer, que tiene convulsiones ocasionadas por un susto.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Tifus con diarrea persistente; fiebre héctica causada por la formación de pus, acompañada de ardor en las plantas de los pies; ERUPCIONES HERPÉTICAS en todas partes, comezón de las plantas de los pies.

PIEL.—Reduce y detiene la supuración en los diviesos, cortaduras, heridas, magulladuras, etc., de mal aspecto, y que secretan pus y no han sido curadas con oportunidad. Es el segundo remedio para el período purulento de las quemaduras y escaldaduras. Carbunclos que secretan pus. Sabañones en supuración. Costra de leche. Costras amarillas que secretan pus, exudaciones purulentas de la piel, forúnculos inflamados, granos, pústulas y costras. Afecciones de la piel con costras amarillentas, pústulas de las viruelas en supuración; llagas purulentas, úlceras de los miembros inferiores. Granitos insignificantes en el cuero cabelludo que sangran al rascarse.

TEJIDOS.—Abscesos; acorta el proceso supurativo y limita la secreción del pus; si se da después de *Silicea* producirá la curación de los abscesos.

Hinchazones serosas, tumores císticos, tercer período de la inflamación, con secreción de masas endurecidas ó sanguinolentas. SECRECIÓN MUCOSA en la tos, leucorrea, gonorrea, etc., amarilla, ESPESA Y EN MASAS. Descarga de materia ó pus sanioso de la piel ó membranas mucosas. Efusiones cuando se forma el pus, secreción del mismo de las glándulas linfáticas con ulceraciones. Supuraciones, ya articula-

res ó en cualquiera otra parte del cuerpo. Granulaciones excesivas, dolorosas, etc.

MODALIDADES.—Agravación y renovación de los síntomas después del trabajo y de los baños.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—*Calc. sulph.* fué experimentada por el Dr. Clarence Conant. La experimentación apareció en las *Transactions of the American Institute of Homœopathy*, en 1873.

Se hallan también en la *Allen's Encyclopedia*, vol. II, pág. 410. Nada especialmente característico aparece en estas experiencias. En el *Guiding Symptoms*, vol. III, pág. 227, se halla un arreglo completo de los síntomas de este remedio.

ADMINISTRACIÓN.—Este remedio es usado también exteriormente en algunas afecciones como: panadizos, úlceras y abscesos. La potencia más común para el uso interno es la 6 y la 12 ×. Las potencias más bajas son muy útiles en las enfermedades purulentas de los ojos.

RELACIONES HOMEOPÁTICAS.—*Calc. sulph.* se parece á *Hepar sulph.*, pero su acción es más profunda é intensa, y con frecuencia es útil después que ha cesado éste de obrar. También es útil cuando *Kali mur.* agotó su acción. *Apocynum* contiene *Calc. sulph.* Compárese con *Calendula* en las supuraciones; con *Kali mur.* en la costra láctea y otras afecciones de la piel, hinchazón del carrillo, croup, disentería; con *Natr. sulph.* en la hidropesía post-escarlatinosa; con *Silicea* en las glándulas duras y supuradas, úlceras de la córnea, tonsilitis, mastitis y en la congelación.

En la neuralgia ocupa un lugar entre los agudísimos dolores de *Magnes. phos.* y los paralizantes de *Kali phos.* (más en las personas de edad, si falta la fuerza regenerativa del tejido nervioso).

En el tercer período de la inflamación (resolución) después de *Kali mur.*, si la secreción es en masas ó sanguinolenta; pero si es amarilla ó mucosa debe darse *Kali sulph.;* si es como pus ó sanguíneo-purulenta, entonces conviene la *Silicea.*

En los carbunclos *Anthracine,* es mejor. *Calc. sulph.* es útil frecuentemente después de *Kali mur.* cuando éste no ha aliviado sino de una manera parcial, también después de *Bellad.* y otros remedios activos.

FERRUM PHOSPHORICUM.

SINÓNIMOS.—Ferroso-ferric. Phosphate. Ferri. Phosphas.

NOMBRE COMÚN.—Fosfato de fierro.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula $Fe_3(PO_4)_2$.

Se prepara mezclando fosfato de sodio con sulfato de fierro en ciertas proporciones. El precipitado que resulta se filtra, lava y seca, se reduce á polvo que toma un color gris-azulado por el contacto del aire, sin olor ni sabor alguno. Es soluble en los ácidos, pero insoluble en el alcohol y el agua. Probablemente ese fosfato es capaz de tomar el color azul, lo que ocurre en los pulmones de los tísicos en donde se encuentra pus azulado en la expectoración.

PREPARACIÓN.—El fosfato puro de fierro se prepara por trituración, según la clase VII de la *American Pharmacopœia.*

DATOS QUÍMICO-FISIOLÓGICOS.—El fierro se encuentra en la hemoglobina ó substancia colorante de los corpúsculos rojos de la sangre. Según Dalton, exceptuando el cabello, en ninguna otra parte del organismo se encuentra en tan considerables cantidades. En un hombre con peso de 65 kilogramos (165 libras) se hallan 2.82 gramos (44 granos) de fierro contenido en la sangre toda del cuerpo. La base orgánica de cada una de las celdillas es la albúmina. Puesto que la albúmina contiene fierro, cada celdilla debe contenerlo. El fierro y sus sales tienen la propiedad de atraer el oxígeno. El fierro de los corpúsculos de la sangre toma el oxígeno del aire inspirado, éste es conducido á cada una de las celdillas de todo el organismo por medio de la reacción mútua del fierro y del *Kali sulph.* Un desorden del equilibrio de las moléculas de fierro en las fibras musculares causa su relajación; ésta, si tiene lugar en la cubierta muscular de los vasos, causa dilatación y acumulación en ellos de la sangre—congestión;—aumentando la presión de la sangre, se rompen sus paredes y resulta la hemorragia; si la capa mucosa del intestino sufre una relajación por alterarse el equilibrio de las moléculas del fierro, resulta entonces la diarrea; cuando esta alteración se verifica en las paredes musculares del intestino, la acción peristáltica de los mismos se debilita y llega

á ser menos activa, causando tendencia á la constipación. Cualquier trastorno que acuse una relajación en las paredes musculares de los vasos y la consecuente hiperemia, como por ejemplo, las contusiones, encontrará su remedio en *Ferr. phos.*, que en dosis infinitesimales restablece el equilibrio de las moléculas de fierro, fortificando así las fibras musculares. Por el poder que tiene el fierro de atraer el oxígeno, es un remedio útil en algunas enfermedades de los glóbulos de la sangre, como anemia, clorosis y leucoemia.

ACCIÓN GENERAL.—Por lo expuesto se ve que realmente el *Ferr. phos.* llega á ser el principal remedio en todos los casos que dependen de una condición relajada del tejido muscular, en donde quiera que ésta se verifique; también para el estado anormal de los corpúsculos mismos de la sangre.

Si se administra un nuevo refuerzo de moléculas de fierro para las celdillas musculares relajadas, por causa de la falta de esta sal, se restablece su tonicidad normal, las fibras-circulares de los vasos recobran su forma fisiológica, regularizando la circulación y abatiendo la fiebre.

Por consiguiente, su esfera de acción se extiende á todos los padecimientos de naturaleza hiperémica ó congestiva, con el usual acompañamiento de estas condiciones, tales como dolor, calor, hinchazón y enrojecimiento, aceleración del pulso y aumento de circulación; en una palabra, todos LOS DESARREGLOS É INFLAMACIONES FEBRILES EN SU PRINCIPIO, ESPECIAL-

MENTE ANTES DE COMENZAR LA EXUDACIÓN. Anemia, falta de glóbulos rojos, etc. Es útil especialmente en la debilidad de los niños con falta de apetito, que se ponen tristes é indiferentes, pierden las fuerzas y el peso.

Ferr. phos. no solamente aumenta las fuerzas, sino que ayuda al aumento del desarrollo corporal y regulariza la acción de los intestinos.

Supone Schüssler que esta droga deja de estar indicada cuando tiene lugar la exudación y la supuración; pero si se adapta á la individualidad del paciente, puede á pesar de eso confiarse en su acción. Solamente cuando cesa de mejorar debe abandonarse.

En muchas fiebres inflamatorias y en algunas eruptivas, especialmente en las personas jóvenes y sensibles, parece ocupar un lugar intermedio entre la actividad de *Acon.* y *Bellad.* y el entorpecimiento de *Gelsem.*

El fierro es el remedio Bio-químico para las siguientes afecciones:

1. En el primer período de todas las inflamaciones.
2. Dolores que empeoran por el movimiento y se mojoran por el frío.
3. Hemorragias causadas por hiperemia.
4. Heridas recientes causadas por traumatismos.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Indiferencia para las ocupaciones habituales, las cosas insignificantes parecen muy grandes, pérdida del valor y la esperanza, mejoría por el sueño, molestarse por bagatelas. La hiperemia del cerebro produce delirio y monomanía; manía transitoria; delirium tremens; locuacidad; vértigo por congestión, consecuente á la cólera.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Agolpamiento de sangre á la cabeza, cefalalgia por predisposición á la gota *(Natr. sulph.)* Dolor obtuso, presivo en el vértice, durante la menstruación profusa, y por el frío: dolor de magulladura, presivo ó punzante y *dolorimiento al tacto;* dolor como si un clavo fuera introducido en un lado, sobre el ojo; cefalalgia congestiva, dolor pulsativo, peor del lado derecho; la presión del lugar dolorido contra un objeto frío parece aliviarlo; también se alivia si sangra la nariz. Dolor de cabeza con vómitos de alimentos sin digerir. La parte superior de la cabeza es muy sensible al aire frío, al ruido, á la vibración; no consiente nada que toque el cabello; dolor obtuso del lado derecho que baja desde el vértice á la región supra-orbital del mismo lado. Malos efectos del calor solar (seguido de *Calc. phos.)* Es el principal remedio en las cefalalgias de los niños, con sensación de latido, CARA ROJA y ojos dilatados, agravación al mover la cabeza, sacudirla é inclinarla; ceguera por el dolor.

Cefalalgia con vómitos de alimentos sin digerir, vértigo con agolpamiento de sangre á la cabeza; síntomas de meningitis con somnolencia y pesadez. Primer período de las erupciones en el cuero cabelludo, sensibilidad dolorosa del mismo al frío y al tacto.

OJOS.—Ojos inflamados. Hiperemia aguda de la conjuntiva.

Inflamación de los ojos con dolor agudo sin secreción de pus ó de moco; conjuntivitis aguda con relajación de la conjuntiva y fotofobia; dolor en el globo del ojo agravado al moverlo; retinitis. OJOS INFLAMADOS, ROJOS, CON SENSACIÓN DE ARDOR, DOLORIDOS Y ASPECTO ROJIZO DE LOS OBJETOS y congestión retinal. SENSACIÓN COMO SI HUBIESE GRANOS DE ARENA BAJO LOS PÁRPADOS; tumor enquistado de los mismos. Orzuelo en el párpado inferior del ojo derecho; neuralgía en lo interior de la órbita y en la nariz.

OÍDOS.—Sensibilidal al ruido. "Otalgia después de exponerse al frío ó á la humedad." (Copeland.) Dolor de oído inflamatorio con ardor ó latidos, agudo y punzante, tirantez; latidos y calor en los oídos; los ruidos en los oídos son originados por la presión de la sangre, pues á causa de la relajación de las venas no se efectúa debidamente la circulación. PRIMER PERÍODO DE LA OTITIS; dolores que irradian con pulsación de los oídos; cada impulso del corazón parece sentirse en ellos. Pulso acelerado en vez de compresible y débil, que indica debilidad marcada. Apariencia inflamatoria circunscrita y de color obscuro. Sordera de origen inflamatorio, ó supuración

cuando hay dolor incisivo, de tensión ó latido. Tinnitus aurium. Tendencia marcada á la extensión del proceso inflamatorio en lugar de circunscribirse; aspecto obscuro y enrojecido de las partes, secreción moco-purulenta, si hay alguna, con predisposición á las hemorragias; el establecimiento completo de la secreción no es seguido por el alivio del dolor, el que se presenta radiante y en paroxismos. Inflamación del oído externo. La apófisis mastoides está hinchada y dolorosa. Catarro crónico, no supurativo, del oído medio con engrosamiento de la membrana del tímpano y probable anquilosis de los huesecillos.

NARIZ.—Primer período de los corizas, predisposición á resfriarse. Escozor, especialmente en el conducto de la nariz derecha, empeora con la inspiración. Catarro nasal con sensación como de goteo en la nariz; membrana mucosa nasal congestionada; fiebre catarral. EPIXTASIS, especialmente en los niños y cuando es síntoma concomitante de otras enfermedades. La sangre de la nariz es de color rojo brillante.

"Su indicación en el principio de los resfriados ó en la congestión localizada en cualquier parte de las membranas mucosas, es semejante á *Acónito*, pero su período de acción es mucho más largo. A menos que no se dé el *Acónito* inmediatamente después de manifestarse la enfermedad es inútil, según mi experiencia, mientras que el valor curativo de *Fe-*

rrum phos. continúa por varias horas." (R. S. Copeland.)

CARA.—*Una complexión florida* con menos tensión nerviosa que la de Bellad. Dolor de la cara con enrojecimiento, calor y pulso vivo, peor con el movimiento, con latidos ó presión, bochornos, acompañados con sensación de frialdad en la nuca; enrojecimiento de la cara cuando es precusor de una cefalalgia periódica. Anemia, aspecto clorótico, terroso, pálido y cetrino. Carrillo dolorido y caliente, cuando son agradables las aplicaciones frías; tic doloroso congestivo é inflamatorio.

BOCA.—Encías calientes é inflamadas; enrojecimiento de la membrana mucosa de la boca.

LENGUA.—Lengua cargada, ó limpia y roja, con dolor de cabeza; inflamación de la lengua con hinchazón y color rojo-obscuro.

DIENTES.—Dolor de muelas con mejillas calientes; se empeora con el calor y mejora con los líquidos ó alimentos fríos; desórdenes de la dentición con calentura; gran dolencia del diente al tacto ó la presión. Los dientes se sienten alargados.

GARGANTA.—Inflamación de las fauces, enrojecimiento y dolor sin exudación. GARGANTA ULCERADA. Alivia la congestión, el calor, la fiebre, el dolor y los latidos. GARGANTA DOLORIDA, SECA, ROJA, INFLAMADA Y CON MUCHO DOLOR. Abscesos faringeos, amígdalas rojas é inflamadas y glándulas hinchadas. Disminuye la fiebre en el PRIMER PERÍODO DE LA DIFTERIA; hemorragias de la faringe, laringe, tráquea

y acaso de los bronquios; afecciones catarrales agudas de las trompas de Eustaquio. Garganta dolorida en los cantantes y en todas aquellas personas que hacen uso diariamente de la voz.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Aversión para la carne y la leche, sed con deseo de agua fría y de algunos estimulantes como brandy y cerveza; eructos corrompidos. Primer período de la gastritis con dolor, hinchazón y sensibilidad en la boca del estómago; dispepsia con bochorno, calor á la cara, y epigastrio sensible al tacto; lengua cargada, dolor pulsativo y de latido, color rojo de la cara, VÓMITOS DE ALIMENTOS SIN DIGERIR; indigestión debida á relajación de los vasos sanguíneos del estómago, dolor después de tomar alimento y por la presión; dolor mortal en en el estómago; dolor de estómago inflamatorio en los niños, por frío y evacuaciones sueltas. VÓMITOS DE SANGRE ROJO-CLARA. Flatulencia y eructos del gusto de los alimentos que se han tomado; pérdida del apetito, repugnancia por la leche, náuseas y vómitos después de comer; las materias vomitadas son algunas veces muy ácidas, no pudiendo tomar arenques, carne, café, ácidos y mamones; persistencia de los vómitos alimenticios, algunas veces antes de almorzar.

ABDOMEN Y DEFECACIÓN.—Primer período de todas los fiebres gástricas y entéricas, mucho calofrío, también al principio del cólera y de la peritonitis; constipación y calor en la porción inferior del intestino asociado con prolapso, hemorroides y aver-

sión á la dieta de carne; diarrea, cólera infantum, con cara roja, pulso lleno y blando, deposiciones acuosas y aun sanguinolentas; después de suprimirse la transpiración, las deposiciones acuosas contienen moco y sangre, tienen urgencia, pero no tenesmo. Diarrea por relajación de las vellosidades intestinales, que carecen de la cantidad necesaria de humedad. DEPOSICIONES DE ALIMENTOS NO DIGERIDOS. Diarrea causada por el frío, disentería (alternado con *Kali mur.)* HEMORROIDES inflamadas ó sangrantes, siendo la sangre roja-viva y con tendencia á coagularse, antes que ocurra alguna induración; predisposición al prolapso rectal, hernia estrangulada é inflamada, lombrices intestinales.

ORGANOS URINARIOS.—Deseo frecuente de orinar, el chorro de la orina se escapa con cada golpe de tos, hematuria, primer período de la cistitis con calor, dolor ó estado febril, diabetes cuando hay aceleración del pulso ó cuando existe dolor, tensión, latidos ó calor y congestión en cualquier parte del sistema. INCONTINENCIA DE LA ORINA POR DEBILIDAD DEL ESFÍNTER, enuresis diurna, dependiente de irritación del cuello de la vejiga; iscuria, supresión de la orina con calor, especialmente en los niños pequeños; cualquier dolor inflamatorio en los riñones. Enfermedad de Bright con desórdenes febriles, irritación del cuello de la vejiga y de la próstata; los síntomas empeoran cuando el paciente está mucho tiempo en pie y se mejoran después de orinar; poliuria simple y excesiva secreción de orina.

ORGANOS SEXUALES.—Varicocele con dolor en los testículos, bubón con calor y latidos ó estado febril, primer período de la orquitis ó epididimitis y gonorrea, emisiones seminales. *Ferrum phos.* tiene una estrecha relación con los estados de irritabilidad del útero, asociados con molestia en la vejiga, y también en la membrana que cubre la matriz. Cólico menstrual con aflujo de sangre á la cara y aceleración del pulso, vómito de alimentos sin digerir, algunas veces con gusto ácido. En el primer período de la metritis para aliviar la fiebre, el dolor y el calor; congestión excesiva en los períodos menstruales, siendo la sangre de color rojo-vivo, menstruación cada tres semanas, profusa, con presión en el abdomen y en la parte inferior de la espalda y dolor en el vértice de la cabeza. Sensación de presión hacia abajo y dolores constantes de carácter obtuso en el ovario; dismenorrea con urgencia frecuente para orinar. Dismenorrea congestiva con dolores antes y durante los primeros días del flujo. Vaginismo, vaginitis, vagina seca y caliente, dolor en este órgano por el coito ó al examinarla; espasmo de la vagina motivado por el aumento de la sequedad y de la sensibilidad.

EMBARAZO Y PARTO.—Primer período de la mastitis, padecimientos matutinos del embarazo, con vómitos de alimentos sin alterar, con gusto ácido ó sin él. Dolores de sobreparto y como un preventivo de la fiebre de lactancia.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.—PERÍODO AGUDO, FEBRIL

Ó INICIAL DE TODAS LAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. Rinitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, neumonía, pleuresía y pleuroneumonía. BRONQUITIS DE LOS NIÑOS. Tisis florida. Expectoración escasa, con estrías de sangre; pecho dolorido y magullado. Es el primero y principal remedio para el dolor de costado, resfrío en el pecho, disnea y tos, y debe continuarse mientras no se establezca una completa transpiración. Congestión de los pulmones con debilidad y opresión; hemoptisis después de una conmoción ó caída, respiración corta, dificultosa y fiebre intensa; en las afecciones bronquiales con calor y dolor ardiente, sin expectoración; en las agravaciones recientes de la bronquitis crónica; tos breve y dolorosa con irritación ó cosquilleo en la tráquea. Tos espasmódica con emisión involuntaria de orina; tos seca y dura con dolor en los pulmones; tos con estertores mucosos en el pecho, agravada en la noche; síntomas febriles del croup. Tos ferina con vómito de alimento; PÉRDIDA DE LA VOZ, RONQUERA, garraspera después de cantar ó ejercitar la palabra, dolor é irritación en la laringe.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Al principio del período congestivo de la carditis, pericarditis, endocarditis y arteritis. En el aneurisma para restablecer la circulación normal y evitar las complicaciones ocasionadas por la excesiva acción del corazón; dilatación de este órgano ó de los vasos sanguíneos, telangiectasia y nævi; palpitaciones cardiacas, pulso

rápido y vivo. Venas varicosas, primer período de la flebitis y linfagitis. Pulso lleno, veloz, no filiforme.

Dorso y extremidades.—Rigidez del cuello por el frío, dolor en la espalda, lomos y sobre los riñones; también dolores punzantes en las rodillas y tobillos; dolores reumáticos que empeoran con el movimiento, exasperándose y aumentando; por eso el reumatismo se siente sólo durante el movimiento y se mejora por el calor. Reumatismo articular, especialmente del hombro; los dolores se extienden á la parte superior del pecho, invadiendo una articulación después de otra; reumatismo muscular ó subagudo, cojera y envaramiento por el frío. Dolor reumático en la muñeca derecha y en el hombro, inflamación de los dedos y primer período del panadizo. Enfermedad de la cadera con dolor, latido, inflamación y calor de las partes blandas; torceduras de los ligamentos y tendones, tenalgia crepitante, crujidos en los tendones del dorso de la mano. Calambre en la espalda *(Calc. sulph.)* Manos hinchadas y doloridas, las palmas de las mismas se sienten calientes.

Síntomas nerviosos.—Malestar, cansancio, gran postración y debilidad de los niños, sin lesión orgánica, sensación de indolencia; siente necesidad de un estimulante, parálisis reumática, nerviosidad en la noche. Convulsiones con fiebre en el período de la dentición, epilepsía con aflujo de sangre á la cabeza, el frío ocasiona neuralgías congestivas é inflamatorias.

Sueño.—Desvelo por un estado hiperémico del ce-

rebro, desasosiego en la noche, ensueños ansiosos, somnolencia en la tarde.

SÍNTOMAS FEBRILES.—En todas las fiebres catarrales é inflamatorias durante el calofrío ó período de iniciación, rigidez, calor, dolor y viveza del pulso; fiebres reumática, gástrica, entérica y tifoidea durante el período de frío, en cualquier enfermedad ó padecimiento que principie con calor y calentura; fiebre intermitente con vómito de alimentos; en los casos simples de fiebre escarlatina; primer período del tifo; calofrío diario á la 1 p: m.; fiebre alta, pulso vivo y aumento de temperatura; copiosos sudores nocturnos; calor seco de la cara, garganta, pecho y palmas de las manos.

PIEL.—Hiperemia debida á traumatismos mecánicos; heridas recientes que aún no supuran; congestión capilar con ardor de la piel que aumenta con el ejercicio y el calor; abscesos, granos, carbunclos y UÑEROS; al principio de estas afecciones el remedio de que tratamos reduce el calor, la acumulación de la sangre, el dolor y los latidos. Para la fiebre y el dolor en la varioloide, en la ERISIPELA y en las inflamaciones de la piel con carácter erisipelatoso; procesos supurativos de la piel con síntomas febriles; sarampión, ESCARLATINA y viruela; barros, acnea, cuando están congestionados con dolor y calor; úlceras con síntomas febriles. Nœvi.

TEJIDOS.—Anemia, pobreza de la sangre, FALTA DE GLÓBULOS ROJOS, leucoemia, hiperemia por relajación de las fibras musculares de los vasos sanguí-

neos; PERÍODO PRE-EXUDATIVO DE LA INFLAMACIÓN. Hemorragias de cualquiera parte del cuerpo, la sangre es roja-brillante con tendencia á coagularse rápidamente; epistaxis, especialmente en los niños; traumatismos mecánicos como resultado de coces, golpes y caídas; cortaduras, cuando hay síntomas inflamatorios. Enfermedades de los huesos cuando las partes blandas están rojas, inflamadas y dolorosas; hidropesía por pérdida de sangre y agotamiento del organismo; venas varicosas en las personas jóvenes; fracturas, especialmente si están heridas las partes blandas; primer período de la osteitis, torceduras, tanto internas como externas; ulceración glandular. Heridas de las partes blandas con síntomas inflamatorios; se administra en la verdadera clorosis después de *Calc. phos.*

MODALIDADES.—Todos los dolores de este remedio se agravan por el movimiento y se alivian por el frío. Obra espléndidamente en las personas de edad.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—*Ferr. phos.* fué experimentado por J. C. Morgan M. D. en 1876. La sintomatología se encuentra en la *Allen's Encyclopedia*, vol. X, y en la *Cyclopedia of Drug Pathogenesis*, vol. II. La vasta y extensa utilidad de esta droga y su introducción en homeopatía se debe á Schüssler: las experiencias anteriores no daban una base suficiente para las múltiples aplicaciones clínicas que se han hecho conforme á las indicaciones del citado Schüssler; no obstante, han ido tan lejos cuanto ha sido necesario para sostenerlas.

ADMINISTRACIÓN.—Las trituraciones y diluciones de la 6x á la 12x son las recomendadas por Schüssler, aunque para la anemia se han usado preparaciones mucho más bajas como la 1x ó la 2x. Observadores verídicos y competentes han encontrado que no es conveniente usar este remedio por la noche, en más baja potencia de la 12x, porque se corre peligro de provocar el insomnio. Schüssler lo recomienda también en aplicaciones externas, tales como para torceduras, heridas, hemorragias, hemorroides, etc. Las curas hechas con la 200ª potencia se han verificado en los catarros, en las enfermedades propias del verano, en la gonorrea, etc. El Dr. Morgan (experimentador) usa la 30ª potencia diluida en agua para la escarlatina.

RELACIONES.—Correspondiendo como lo hace al primer período de la inflamación sin exudado, es el más estrecho análogo de *Acon.* Está en un término medio entre *Acon.* y *Gels.* Schüssler mismo se expresa como sigue respecto al uso del *Acon.* para las indicaciones semejantes: "En los casos en que se usa el remedio vegetal, *Acónito,* para la irritación—hiperemia, que es la base del primer período de todas las inflamaciones—se practica indirectamente la bio-química. Respecto al modo y manera en que *Acon.* puede efectuar una curación, se presentan dos posibilidades. O las moléculas de *Acon.* que han llegado al lugar de la enfermedad, sirven como un sustituyente temporal para las moléculas de hierro, las que han cesado de ejecutar sus

funciones, hasta que este desorden funcional se haya reparado por medio de la circulación vital, ó las moléculas de *Acon.* causan á un tiempo la introducción de nuevas moléculas de hierro en el tejido enfermo, y son ellas mismas arrojadas como cuerpos extraños tan pronto como la integridad de las últimas se ha restablecido—resultado del que también participarían naturalmente las moléculas de *Acon.* que puedan haber servido como sustituyentes. Cada una de estas posibilidades descansaría en una bio-química INDIRECTA. La curación de la irritación—hiperemia—á lo menos, por medio de *Ferr. phos.*, es un procedimiento bio-químico DIRECTO. *(Walker's Ed. of Schüssler's Diphth).*

Acónito tiene un pulso más saltante y la inquietud y ansiedad características; *Gelsem.* un pulso ondulante, más blando y hay más somnolencia y pesadez.

En los estados anémicos compárese también con *China*, la que tiene muchos síntomas que le son comunes. Es interesante notar que el árbol del cual se obtiene la *China* se halla siempre en las localidades ferruginosas.

En su acción sobre los órganos respiratorios claramente se ve que está colocado entre el FIERRO y el FÓSFORO. Como el *Ferr.*, está indicado en la congestión de los órganos respiratorios, aun cuando haya fiebre considerable. Especialmente se observa que la opresión y la disnea, que son sumamente marcadas en *Ferr.* y *Phosphor*, se duplican en este

compuesto y producen indicaciones preciosas para su uso; por lo mismo, se puede decir de un modo general, que los síntomas de opresión, semejantes al *Phosphor.*, se tratarán por esta droga. (Allen *Handbook).*

Ferr. phos. corresponde en muchos casos también á *Bryon.*, *Bellad.* y *Arnica*, y á *Hepar* y *Mercur.*, especialmente en la inflamación aguda del oído medio. En la debilidad, pérdida de fuerzas y vitalidad de los niños, es el remedio si los músculos son duros, la complexión delicada, el cabello rubio y rizado; pero *Sulphur* ocupa su lugar en los niños de piel obscura, músculos blandos y piel húmeda. En las afecciones reumáticas de los ancianos, cuando los músculos están rígidos y débiles con predisposición á los calambres dolorosos, compárese con *Strych. phos.* El vino Zinfandel, de California, que es un clarete puro, producto de la vid que crece en un terreno virgen y volcánico, está fuertemente impregnado de fierro, posee grandes virtudes en casos de tendencia á la anemia, debidas probablemente al fierro del terreno en que crece. Después de *Ferr. phos.* está frecuentemente indicado *Kali mur.* (Véase la parte terapéutica). Especialmente en la difteria, neumonía, crup, etc., etc.

En la clorosis sigue ó precede á *Calc. phos.*

En las hemorroides, á *Calc. fluor.*

En la diabetes, á *Natr. sulph.*

En la bronco-neumonía, á *Tart. emet.*

En las afecciones del oído y sordera catarral, á *Calendula* é *Hydrastis.*

KALI MURIATICUM.

SINÓNIMOS.—Potassium Cloride. Kali Chloratum. Kali Chloridum. Potassii Chloridum.—Nombre común. Cloruro de Potasa ó Potasium. (N. B.—ESTA DROGA NO DEBE SER CONFUNDIDA CON KALI CHLORICUM, CUYOS SINÓNIMOS SON: POTASSIUM, CLORATO, POTASSÆ CHLORAS, y POTASII CHLORAS, QUE TOMAN EL NOMBRE COMÚN DE CLORATO DE POTASA, Y CUYA FÓRMULA ES K Cl O_3. Esta ha sido experimentada, y los autores de la "*Guiding Symptoms*" la han juzgado suficientemente semejante al *Kali mur.* de Schüssler para incorporarla á su obra. (Véase vol. VI, "*Guiding Symptoms.*")

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula, K Cl. Se encuentra en la naturaleza en estado mineral. Puede prepararse neutralizando el ácido hydrochlórico puro acuoso con el carbonato de potasio puro ó el hydrato. Cristaliza en cubos, algunas veces en octaedros. Los cristales son incoloros ó blancos, se derriten á un calor bajo y volatilizan á una alta temperatura, sin descomponerse. Es soluble en dos partes de agua hirviendo y en tres de fría; es insoluble en el alcohol fuerte.

PREPARACIÓN.—El cloruro se prepara por trituración, según la clase VII.—*American Pharmacopœia.*

DATOS QUÍMICO-FISIOLÓGICOS.—Esta sal, según

Schüssler, está en una relación química con la fibrina; el desorden en su acción molecular es la causa de la exudación fibrinosa. Sin la presencia de esta sal no pueden tener lugar la formación de nuevas celdillas cerebrales. Esta sal se encuentra en los corpúsculos de la sangre, músculos, nervios y celdillas del cerebro, lo mismo que en el fluido intercelular; en sus caracteres fisiológicos se halla en estrecha relación con el cloruro de sodio, de muchas de cuyas propiedades participa. Si las celdillas de la epidermis, á consecuencia de alguna irritación, pierden las moléculas de *Kali mur.*, arrojan de sí fibrina bajo la forma de una exudación blanca ó gris-blanquecina; secándose ésta se convierte en una erupción de aspecto farináceo; si la irritación se extiende á los tejidos que hay bajo la epidermis, exudarán suero y fibrina, y la parte atacada de la piel se levantará en forma de ampolla. Semejante proceso puede tener lugar dentro y entre las celdillas epiteliales. Si la integridad de los tejidos afectados vuelve á restablecerse por la administración de las moléculas de *Kali mur.*, entonces tiene lugar la eliminación ó reabsorción del exudado; cualquiera de los dos resultados se obtiene probablemente debido á la producción del ácido hydroclórico. La acción de este ácido hydroclórico consiste en disolver la fibrina en su estado naciente ó de formación.

Acción general. — *Kali mur.* corresponde al segundo período de las inflamaciones de las membranas serosas cuando el exudado es de un carácter

plástico. Si quedan leucocitos después de la absorción de la fibrina de una exudación plástica, es útil el empleo de *Natrum phosph.* *Kali mur.* corresponde á las exudaciones cruposas ó diftéricas, y por esto es útil en enfermedades como la difteria, la disentería, el crup, la neumonía cruposa, LAS EXUDACIONES FIBRINOSAS EN EL TEJIDO CONECTIVO INTERSTICIAL, aumento de las glándulas linfáticas, inflamaciones intersticiales, erupciones cutáneas por mal virus vacuno, etc.

Los síntomas principales y característicos en lo general, son: CAPA BLANCA Ó GRIS EN LA BASE DE LA LENGUA, EXUDACIÓN BLANCA Ó GRIS, HINCHAZONES GLANDULARES, SECRECIONES Ó EXPECTORACIONES DE UNA FLEMA ESPESA, BLANCA, FIBRINOSA Ó VISCOSA de cualquier superficie mucosa, ó escamas farináceas de la piel, pereza del hígado, etc. *Kali mur.* es uno de los más útiles y positivos de todos nuestros remedios en las manos de los médicos auristas, conviene principalmente al segundo ó al último período de los estados catarrales.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—El enfermo se imagina estar en la miseria.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Dolor de cabeza con vómito y expectoración de moco blanco ó lechoso, capa blanca en la lengua, vómito de flema también blanca, ocasionado por pereza del hígado,

falta de apetito, etc. Como un segundo remedio en la meningitis. Costra de leche. Caspa.

OJOS.—Los ojos secretan un moco blanco ó amarillo, ó bien materia amarilla y verdosa, costras purulentas. Señales de pus en los párpados, úlcera plana y superficial del ojo, rodeada de una vesícula. Retinitis cuando hay exudación; ámpulas en la córnea, sensación de arena en los ojos, iritis, catarata, después de *Calc. fluor;* úlceras de tipo asténico, casos insidiosos, el enrojecimiento no es excesivo, secreción moderada de color blanco-sucio ó amarillo. Onix é hipopión. Tracoma. Keratitis parenquimatosa.

OÍDOS.—CONDICIÓN CATARRAL CRÓNICA DEL OÍDO MEDIO. Sordera ó dolor de oídos por congestión é hinchazón del oído medio ó trompas de Eustaquio, con infarto de las glándulas, ruidos de crujido al soplar por la nariz ó al tragar; sordera por enfermedad de la garganta, lengua blanca, etc. Sordera por hinchazón del oído externo, exfoliación húmeda de la membrana epitelial del tímpano, condición granular de la misma y del meato externo; granulaciones excesivas, forma prolífera de la inflamación del oído medio, sensación de tapazón, sordera y obstrucción naso-faringea. *Trompas de Eustaquio cerradas.* "Cuando falta que se abran las trompas del saco de Politzer, después de unas cuantas dosis de *Kali muriaticum*, pueden inflarse fácilmente." (R.S. Copeland.) Retracción de la membrana del tímpano. Atrofia de las paredes del meato externo; pare-

ce tener más acción sobre la trompa del lado derecho. Hinchazón de las glándulas inmediatas al oído. ESTALLIDOS Y RUIDOS EN EL OÍDO.

NARIZ.—Catarro, flemas blàncas, espesas, frío intenso en la cabeza, lengua gris-blanquizca, coriza seco, bóveda de la faringe cubierta con costras adherentes. Sangre por la nariz en la tarde. (Holbrook.)

CARA.—Carrillo hinchado y doloroso. Dolor de la cara por hinchazón de ésta ó de las encías.

BOCA.—Aftas, algodoncillo, úlceras blancas en la boca de los niños pequeños ó de las nodrizas; cáncer, escoriación y úlceras en la boca. Glándulas hinchadas cerca del maxilar y del cuello.

LENGUA.—Para la hinchazón que se presenta en la inflamación de la lengua, capa BLANCA-GRISÁCEA, SECA Ó VISCOSA; lengua jaspeada.

DIENTES.—Postemilla, antes de la formación del pus. Dolor de muelas con hinchazón de los carrillos y encías.

GARGANTA.—El único remedio EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS DE DIFTERIA, con *Ferr. phos.* Gárgaras hechas con el mismo. Paperas, hinchazón de las glándulas parótidas; faringitis, garganta hinchada en la que aparecen manchas ó pústulas con exudación gris ó blanquizca (folicular). Expectoración desagradable, caseosa, en pequeñas masas, dolor al deglutir; sífilis de la garganta; segundo remedio en la tonsilitis tan pronto como aparce la hinchazón, las amígdalas están tan inflamadas y aumentadas

de volumen que con dificultad se puede respirar; placas ó manchas parduscas en la garganta, depósitos blancos, las amígdalas están manchadas de blanco ó gris; costras adherentes en la bóveda de la faringe.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Falta de apetito; estado bilioso con lengua blanca ó gris; dispepsia é indigestión con lengua blanquizca ó parda, sensación de disgusto después de tomar grasas, dolor y pesadez en el lado derecho bajo el hombro. Los alimentos muy nutritivos y grasosos causan indigestión. Indigestión con vómitos de mucosidades blancas y opacas; acumulación de saliva en la boca; gastritis producida por bebidas demasiado calientes; dolor de estómago con constipación, vómito de flema blanca y espesa, ó de sangre viscosa, obscura y coagulada. Sabor amargo con constipación pertinaz, icteria con estos mismos síntomas. (Holbrook.)

ABDOMEN Y DEPOSICIONES.—Icteria causada por un enfriamiento del que resulta un catarro del duodeno, deposiciones descoloridas, acción perezosa ó torpeza completa del hígado, dolor en el lado derecho, evacuaciones de un amarillo pálido, constipación y lengua cargada. Fiebre entérica ó tifoidea, soltura de los intestinos, deposiciones floculentas; hinchazón y sensibilidad en el abdomen; tifus con constipación; pequeñas ascárides blancas y filiformes, que causan comezón en el ano *(Natr. phos.)*. Flatulencia, hinchazón abdominal, etc. Segundo período de la peritonitis, tiflitis y peritiflitis (véase el caso clínico men-

cionado en la tiflitis). CONSTIPACIÓN, deposiciones ligeramente coloreadas que denotan la falta de la bilis, por pereza de la acción del hígado, ó que se presentan como consecuencia de algún desorden primitivo, especialmente en los casos en que no se soportan la grasa y la pastelería. DIARREA después de una alimentación grasosa, y en la fiebre tifoidea, con deposiciones amarillentas, de color de ocre ó arcilla, ó bien blancas y viscosas. DISENTERÍA, como si se purgase, con evacuaciones viscosas. HEMORROIDES sangrantes, la sangre es obscura y espesa, fibrinosa y coagulada.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Casos agudos de inflamación de la vejiga, en el segundo período, cuando se fija la hinchazón y la secreción es de moco blanco y espeso. Es el principal remedio en la cistitis crónica; afecciones inflamatorias de los riñones, orina de color obscuro con depósitos de ácido úrico; el principal remedio en la gonorrea y la orquitis, cuando ésta es resultado de la supresión de aquella. En el bubón para la hinchazón blanda y en los chancros blandos es también el primer remedio (3 x). Período crónico de la sífilis con las condiciones patológicas características; gota militar ligada á eczema visible ó latente. Menstruación lenta ó suprimida, detenida ó demasiado anticipada, secreción excesiva, sangre negra, tenaz, obscura y coagulada como alquitrán. Amenorrea, supresión del período ó cuando éste es demasiado frecuente. Leucorrea, secreción de un moco blanco-lechoso,

espeso, no irritante, sino suave. Ulceración del cuello del útero con su característica secreción suave, espesa y blanca. Congestión crónica del útero, segundo período de su hipertrofia (véase *Calc. fluor).*

EMBARAZO.—Padecimientos matinales con vómito de una flema blanca. Principal remedio de la fiebre puerperal; mastitis, el pecho amenaza supurar, detiene la hinchazón.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.—Pérdida de la voz, ronquera por el frío, lengua blanca. Asma con desarreglos gástricos, expectoración blanca y difícil; asma bronquial, segundo período de la bronquitis cuando se forman flemas blancas y espesas; en la tos de la tisis el esputo es espeso, blanco y lechoso. Tos estrepitosa con ruido en el estómago, corta, aguda y espasmódica, como la de la coqueluche, expectoración espesa y blanca. Ojos en apariencia salientes, lengua blanca, tos crupal, dura, áspera y perruna; en el crup es el principal remedio para la exudación. Neumonía, segundo período, expectoración blanca y viscosa; pleuresía, segundo período, con exudaciones y adherencias plásticas. Estertores jadeantes, ó ruido producido por el paso del aire al través del moco espeso y tenaz de los bronquios, tos dura y dificultad para expectorar. El niño se lleva las manos á la garganta durante el acceso de la tos.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Embolia, sangre en una condición favorable para la formación de coágulos, los que obran como tapones; segundo período de la pericarditis, exudación plástica, adherencias, etc.

Palpitación por excesiva afluencia de sangre al corazón en estado de hipertrofia.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Hinchazón de las glándulas del cuello; fiebre reumática, exudación é HINCHAZÓN ALREDEDOR DE LAS ARTICULACIONES. Reumatismo articular agudo, dolores gotoso-reumáticos, si empeoran por el movimiento y si la lengua está cubierta con una capa blanca. Los dolores reumáticos se sienten solamente durante el movimiento ó aumentan por él (*Ferr. phos*). Dolores reumáticos nocturnos que empeoran con el calor de la cama; dolores como relámpago de la parte inferior de la espalda á los pies, que obligan á salir de la cama y sentarse. Las manos se entiesan al escribir; reumatismo crónico é hinchazón cuando todos los movimientos causan dolor; hinchazón crónica indolente de las piernas y pies, comezón violenta. Segundo período en las enfermedades de la articulación de la cadera; úlceras en las extremidades con secreción fibrinosa; juanetes; tenalgía crepitante, crujido de los tendones del dorso de la mano, sabañones en las manos, pies y cualquiera otra parte del cuerpo.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Es el específico ó principal remedio en la epilepsía, especialmente cuando se acompaña con eczema ó después de la supresión del mismo ó de otras erupciones. Tabes dorsal.

SUEÑO.—Sobresaltos al más pequeño ruido. Somnolencia. Sueño inquieto.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Segundo período de las congestiones é inflamaciones DE CUALQUIER ÓRGANO ó

parte del cuerpo. Segundo remedio en las fiebres gástrica, entérica ó tifoidea; en la fiebre puerperal es el principal remedio para la exudación; también en la fiebre reumática; en la escarlatina, con *Ferr. phos.*, es suficiente para curar la mayor parte de los casos. En el tifus, para la constipación; en la intermitente, con los síntomas característicos de esta droga. Es profiláctico en la escarlatina. Fiebre catarral, gran calofrío, la menor corriente de aire frío produce en todo el cuerpo considerable calofrío, tiene el enfermo necesidad de sentarse cerca del fuego para mantenerse caliente y aún así está friolento. Mejoría por meterse en la cama. (Holbrook).

PIEL.—Abscesos, granos, carbunclos, etc., en el segundo período, cuando tiene lugar la exudación intersticial; la causa de la hinchazón desaparecerá antes de la formación del pus. Acné, eritema, eczema y otras erupciones de la piel en forma de vesículas, cuyo contenido es blanco y espeso; eczema albuminóideo y otras enfermedades de la piel que se presentan después de la vacunación hecha con pus vacuno de mala calidad. Eczema por supresión ó desarreglo de las funciones uterinas; escamas secas y farináceas de la piel; eczemas obstinados, costra de leche, erupción sarnosa en la cabeza y cara de los niños pequeños. Su uso en los eczemas obstinados ha sido comprobado repetidas veces. Quemaduras de cualquier grado (también al exterior), ampollas, etc. Juanetes, sabañones, erupciones relacionadas con desarreglos gástricos ó uterinos. El princi-

pal remedio en la erisipela vesiculosa; herpes, sarpullido, sarampión, tos ronca é hinchazón glandular, también para los efectos posteriores de la última de las enfermedades (sarampión). Barros en la cara, cuello, etc. Principal remedio en la viruela; detiene la formación de las pústulas; úlceras con capa blanquizca, farinácea ó secreción blanca y fibrinosa; primer remedio en la sicosis; falta de crecimiento en las uñas de los dedos de los pies; verrugas en las manos.

TEJIDOS.—En la anemia, como remedio intercurrente, si se presentan afecciones de la piel; hemorragias, cuando la sangre es obscura, negra, coagulada ó viscosa; para las inflaciones á causa de golpes, cortadas y magulladuras, tumores; hidropesía originada por enfermedades del corazón, hígado ó riñones, por obstrucción de los conductos biliares, por debilidad del corazón con palpitaciones. Secreciones del líquido blanquizco; sedimento de moco blanco en la orina y lengua blanca. Exudaciones fibrinosas y linfáticas en los tejidos conectivo é intersticial que no son absorbidas. REMEDIO PRINCIPAL EN LA HINCHAZÓN GLANDULAR, Ó EN LAS INFILTRACIONES FOLICULARES. Carne fungosa, granulaciones exuberantes; aumento escrofuloso de las glándulas; escorbuto, infiltraciones duras. Segundo remedio en las torceduras, diátesis estrumosa, malos resultados de la vacunación, sífilis.

MODALIDADES.—Todos los síntomas de esta droga que se refieren al estómago y abdomen, se empeo-

ran después de hacer uso de ALIMENTOS MUY SUBSTANCIOSOS, DE GRASAS Ó PASTELERÍA. Los dolores reumáticos ó de otra especie aumentan y se agravan por EL MOVIMIENTO.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—La Guiding Symptoms de Hering, vol. IV, contiene un resumen completo de los síntomas de esta droga, pero por desgracia están mezclados con los de *Kali chloricum* con signos que no los distinguen, haciendo la colección de síntomas menos importante para el estudio; lo contrario sería si estuviesen separados.

ADMINISTRACIÓN.—Trituraciones y diluciones. Schüssler emplea con preferencia la 6 x ó la 12 x; sin embargo, últimamente ha dado potencias más bajas. En la difteria recomienda la 3 x en gárgaras, 10 ó 15 granos en un vaso de agua; su aplicación externa está también recomendada en las quemaduras, granos, carbunclos, afecciones de la piel, verrugas, etc., aplicadas en compresas de hilas.

RELACIONES.—Como corresponde al segundo período de todas las enfermedades inflamatorias, inmediatamente que aparece la exudación, sus aliados más estrechos son: *Bryon.*, *Mercur.*, *Apis*, *Thuja*, *Spongia*, *Iodum*, *Pulsat.*, *Rhus* y *Sulphur*.

El análisis ha demostrado que contienen *Kali mur.* en cantidad completamente considerable (hablando homeopáticamente) las drogas siguientes: *Phitol.*, *Sanguin.*, *Stilling.*, *Pinus Can.*, *Asclep.*, *Ailanth.*, *Anis. stell.*, *Hamam. virg.*, *Cimicif.*, *Berber.*

Los más de éstos poseen muchos síntomas comunes con *Kali mur.*

Cuando se hayan hecho más amplios análisis químicos de las varias drogas, vegetales y animales, estaremos en aptitud de comparar los síntomas de cada una de ellas con los de sus partes componentes. Compárese en las afecciones de las trompas de Eustaquio con *Merc. dulc.* En la sífilis es seguido por *Kali sulph.* y *Silicea.* En el lupus por *Calc. phos.* En la terapéutica de Schüssler *Kali mur.* asume un papel muy semejante al que corresponde á *Sulphur* en la Homeopatía pura, como un remedio de acción profunda con tendencias extirpadoras, útil como intercurrente, y para preparar la vía á otros remedios indicados. *Kali mur.* es frecuentemente seguido por *Calc. Sulph.*, la que COMPLETA la acción de aquel. *Kali mur* sigue á *Ferr. phos.* cuando la verdadera exudación linfática se establece por la madurez de la inflamación intersticial. También suspende la acción de *Natr. mur.* cuando las capas más profundas del epitelio, contiguas á lo que forma la base del tejido conectivo, son atacadas y sufren exfoliación, causando la capa blanca de la lengua y una secreción opaca blanquizca. (Morgan).

El *Kali mur.* puede ser comparado con el chlorato, *Kali chlor.*, la más venenosa de todas las sales de potasa, que produce una violenta irritación de toda la membrana mucosa gastro-intestinal y ulceración gangrenosa. Compárese en las aftas,

disentería, epitelioma y nefritis. (Véase Allen's *Andbook*).

KALI PHOSPHORICUM.

SINÓNIMOS.—Potassium Phosphats. Potassii Phosphas.

NOMBRE COMÚN.—Fosfato de potasa.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula, K_2 H. P. O_4. Se prepara mezclando el ácido fosfórico acuoso con una cantidad suficiente de hydrato ó carbonato de potasa, hasta la evaporación de la reacción ligeramente alcalina. Cristaliza con dificultad; es muy delicuescente, francamente soluble en el agua é insoluble en el alcohol.

PREPARACIÓN.—Se prepara por trituración como los de la clase VII, *American Farmacopeia.*

DATOS QUÍMICOS FISIOLÓGICOS.—*Kali phos.* es un constituyente de todos los fluidos y tejidos animales, especialmente del cerebro, nervios, músculos y glóbulos sanguíneos. Todos los tejidos que lo contienen lo conservan con la más grande tenacidad, también lo contienen todos los fluidos nutritivos, de aquí que pueda muy bien concluirse que es indispensable á la formación de los tejidos. Sabemos también que los procesos de oxidación, el cambio de gases en la respiración y otras transformaciones químicas en la sangre, así como la saponificación de las grasas y su consecuente oxidación, son llevadas á cabo por la presencia de los álcalis y principal-

mente por la de *Kali phos.* Esta reacción alcalina es indispensable á un gran número de procesos vitales que se efectúan en el interior, y se presenta, sin excepción, en todos los fluidos animales que actualmente están contenidos en el sistema de la circulación, ó en las cavidades cerradas del cuerpo. (Dalton). Se encuentra que los nervios conservan sus propiedades vitales por largo tiempo y casi completamente en una solución de esta sal. POR LA DIMINUCIÓN de la excreción de *Kali phos.* en la orina, se producen en el organismo condiciones que pueden presentar muchos lados de semejanza con los elementos destructores del tifus, lo mismo que á la extensión de su proceso. (Grauvogl). *Kali phos.* es antiséptico é impide la degeneración de los tejidos. La adinamia y el decaimiento son los síntomas CARACTERÍSTICOS del *Kali phos.*

El importantísimo descubrimiento de Liebig, de que el fosfato de potasa predomina en el serum de los músculos, y el cloruro de sodio en la sangre, nos ha servido frecuentemente para poder dar la preferencia á uno ú otro de estos medicamentos. (Hering). Un desorden de las moléculas de *Kali phos.* tiene por resultados:

1. En la esfera mental se presentan condiciones tales, como: timidez, ansiedad, temor, llantos, recelo, nostalgia, debilidad de la memoria, depresión, etc.

2. En los nervios vaso-motores: pulso al principio pequeño y frecuente, más tarde retardado.

3. En los nervios sensorios: dolores con sensación paralítica.

4. En los nervios motores: postración nerviosa y muscular, que llega á la parálisis.

5. En las fibras tróficas del nervio simpático: retardo de la nutrición hasta la completa suspensión de ella en una esfera celular circunscrita; de aquí resulta el reblandecimiento y la degeneración de estos nervios.

ACCIÓN GENERAL.—Condiciones originadas por FALTA DE PODER NERVIOSO, como postración, esfuerzo, pérdida de vigor mental, depresión. En general, obrará como excitante en la indolencia mental; también en el estado de agotamiento después de algún esfuerzo intelectual ó de gran violencia. Corresponde á esa condición que se apodera del organismo y es conocida con el nombre de NEURASTENIA, en la que ha conquistado sus más grandes laureles. Es el restaurador en la debilidad muscular que sigue á las enfermedades agudas, mialgía, gasto ó enflaquecimiento muscular, todo lo que depende de un deterioro de la enervación. Condiciones de atrofia en los ancianos. En los casos originados por descomposición rápida de los corpúsculos de la sangre y del jugo muscular, tales como hemorragias de naturaleza séptica, escorbuto, estomatitis, angina gangrenosa, chancro fagedénico, diarrea semejante á carne podrida y fétida, estados adinámicos ó tifoideos, etc.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Ansiedad, MIEDO NERVIOSO sin causa alguna especial, humor melancólico, caprichoso, ve las cosas por el lado malo, le asaltan tristes presentimientos. Gran desconfianza acerca de los negocios y asuntos pecuniarios. Poca disposición para estar en sociedad, aversión á conversar. CANSANCIO CEREBRAL POR EXCESO DE TRABAJO, DEPRESIÓN DE ESPÍRITU, IRRITABILIDAD GENERAL, ó gran impaciencia. PÉRDIDA DE LA MEMORIA, omite las letras ó palabras al escribir, usa mal las palabras, confusión de ideas. Miedo y exceso de sensibilidad á los ruidos. Negligencia, falta de energía, el más ligero trabajo parece una tarea pesada; indeciso, caviloso, voluble; habla vagamente un corto rato antes de despertar *(Natr. mur.)* Efectos del susto. Consecuencias después del pesar, alucinaciones é ilusiones de los sentidos; nostalgia; se presentan visiones del pasado y dura mucho tiempo la impresión de ellas. HISTERIA después de emociones violentas, accesos de risa y de gritos, impresiones falsas; locura, manía y otros desórdenes mentales; hipocondría y melancolía profundas; manía puerperal; suspiros y depresión; esquivez, bochornos excesivos ocasionados por la sensibilidad de las emociones; estupor y delirio bajo; quejas y carácter enojadizo, bostezos en la histeria; delirium tremens, temor, insomnio, inquietud y desconfianza, habla vagamente; parece asir objetos imaginarios, aberraciones de la mente.

Primer período del reblandecimiento del cerebro, estremeciéndose al tacto; síntomas mentales en los niños: mal humor, enfado; miedoso, espantadizo, grita y se queja. Terrores nocturnos. Esquivez y bochornos excesivos. Sonambulismo; muy nervioso, se estremece al más ligero ruido; habla mientras está dormido, necesita ser llevado de un cuarto á otro. Despierta fácilmente. (Holbrook).

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Vértigo al levantarse, al acostarse, estando de pie, al sentarse ó cuando se mira hacia arriba, vértigo y desmayo por agotamiento, y debilidad nerviosa. ANEMIA CEREBRAL. Conmoción del cerebro, estado de astenia, dolor de cabeza nervioso, sensibilidad al ruido, confusión. Dolor de cabeza de los estudiantes y agotamiento por la fatiga; dolores de cabeza que se mejoran por el movimiento moderado; dolores y pesadez en la NUCA á través de los ojos; MEJORÍA MIENTRAS SE COME, con sensación de cansancio y agotamiento, incapacidad para pensar y los demás síntomas mentales característicos; dolor de cabeza con cansancio, vacío y sensación de desfallecimiento en el estómago. Dolor de cabeza de origen menstrual con sensación de hambre; dolor de cabeza neurálgico, zumbido en los oídos, parece imposible poder permanecer en pié aunque producen alivio las sensaciones alegres; tendencia al llanto que se mejora comiendo. Hidropesía cerebral; comezón en el cráneo, la nuca se siente dolorida como si el cabello hubiera sido arrancado; dolores intensos en el

mastoideo izquierdo, agravados por el movimiento y el aire libre.

Ojos.—Debilidad de la vista, pérdida del poder perceptivo después de la difteria ó por agotamiento, los ojos parecen fijos y excitados, estrabismo ó acomodación defectuosa después de la difteria. Lacrimeo. Incoordinación de los músculos oculares y dificultad de acomodación para los objetos cercanos. Sensación de granos de arena introducidos en los ojos. Dolencia de los globos oculares, dolor y ardor en los bordes de los párpados como si estuviesen llenos de humo. Piquetes en los ojos, la vista llega á borrarse. Manchas negras delante de los ojos.

Oídos.—Sordera por falta de percepción nerviosa, con debilidad y agotamiento de los nervios; ruidos en los oídos al quedarse dormido producidos por agotamiento nervioso. Secreción de los oídos de un pus sucio, fétido é icoroso; ulceración de la membrana del tímpano y supuración del oído medio, cuando las secreciones son sucias, icorosas, FÉTIDAS ó saniosas. Condiciones atróficas en los ancianos, tendencia de los tejidos á formar escamas y arrugas. Zumbidos y soplos en los oídos. *(Magne phos.)* Comezón en el canal auditivo. Hiperestesia del oído, no puede tolerar ningún ruido.

Nariz.—Epistaxis en las personas débiles, predisposición á la misma en las de constitución delicada. Ozena, costras amarillas y desagradables, úlceras; SECRECIÓN AMARILLA ESPESA; estornudos por la más ligera exposición al aire. Se desprenden costras ama-

rillas de la nariz seguidas de epixtasis; se expectora un moco espeso, provenido de la parte posterior de la nariz.

CARA.—Faz lívida é hipcrática, con ojos hundidos. Cara roja, caliente, con ardor en ella y en la frente; otras veces pálida y amarilla. Neuralgía facial con gran agotamiento después del ataque; neuralgía del lado derecho aliviada por aplicaciones frías; punzadas neurálgicas de los dientes superiores al oído izquierdo. Dolor en los huesos maxilares, mejorados por comer, hablar ó tocar la parte dolorida; la pérdida del poder de los músculos faciales causa contorsiones, comezón de la cara bajo la barba; granos. Parálisis facial á causa de trabajar en el agua.

BOCA.—Hidroa en los labios; granos y costras dolorosas sobre las mismas, desprendimiento de la piel que los cubre. Estomatitis, mal olor del aliento, fetidez, encías esponjosas con bordes retraídos, noma, cancrum oris; ulceras de color gris-ceniciento. Mal olor de la boca, salivación profusa, espesa y salada.

LENGUA.—SEQUEDAD EXCESIVA en la mañana, sensación como si estuviese clavada contra el paladar; lengua blanca, viscosa, morena, semejante al color de la mostaza francesa; inflamación de la lengua originada por la sequedad excesiva ó el agotamiento, bordes de ella rojos y doloridos.

DIENTES.—Predisposición de las encías á sangrar, huellas rojas en las mismas; dolor alveolar intenso por degeneración de los dientes; dolor de muelas que alterna con cefalalgia frontal. Odontalgia en

las personas nerviosas, delicadas ó pálidas, impresionables, cuyas encías sangran fácilmente y tienen líneas de un rojo brillante sobre ellas. Rechinamiento nervioso de los dientes, modo de hablar lento é inarticulado, encías esponjosas y retraídas; los dientes se sienten doloridos. Sensación de agrandamiento en los dientes.

GARGANTA.—Amígdalas aumentadas y dolorosas con depósito blanco y sólido como membrana diftérica; garganta muy seca; deseo de tragar continuamente. Ronquera y pérdida de la voz, se desprende un moco salado de la garganta; gangrena, último período del crup, síncope y postración nerviosa. Efectos posteriores de la difteria, debilidad de la vista, habla nasal y cualquier especie de parálisis; estado maligno y gangrenoso con postración, etc. Parálisis de las cuerdas vocales.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Ulcera gástrica á causa de un trastorno de los nervios tróficos; sensación de hambre excesiva poco después de haber tomado alimento, "sensación de desfallecimiento" nervioso en la boca del estómago, eructos gaseosos, gastritis, cuando el tratamiento ha sido retardado, con un estado asténico. Indigestión con depresión nerviosa, dolor de estómago por susto ó excitación, mucha sed; náusea y vómitos de sangre y de alimentos agrios, amargos; vacuidad, sensación de roedura aliviada por comer, regüeldos de gas con gusto ácido y amargo. Dolor constante en el epigastrio, localizado en un pequeño lugar, vómitos de una mate-

ría verde ó azul obscura debidos á algún trastorno cerebral.

ABDOMEN.—Debilidad en el lado izquierdo bajo el corazón, trastornos esplénicos, FLATULENCIA con angustia cardíaca, ó en el dado izquierdo del estómago; abdomen hinchado, lengua seca, etc.; fiebre tifoidea, debilidad y otros síntomas característicos de esta droga. Abdomen distendido por el gas, dolores que se extienden hacia abajo, cólico en el hipogastrio con deseo infructuoso para defecar; mejoría doblándose. Colapso, semblante lívido, cianosis y pulso lento.

DEPOSICIONES Y ANO.—Diarrea indolente, acuosa, por susto ó alguna otra causa depresiva, con gran postración; evacuaciones pútridas, como agua de arroz, sanguinolentas y de olor corrompido; disenteria pútrida y tifoidea; deposiciones acuosas con urgencia violenta, seguidas de tenesmo.

Síntomas del cólera; RUIDOS, GASES DE MAL OLOR.

Evacuaciones imperiosas mientras se come, profusas; indolentes y de olor desagradable, seguidas por una urgencia no satisfecha. Ardor en el recto y sensación dolorosa después del movimiento; prolapso, constipación intestinal, evacuaciones obscuras, morenas, estríadas con moco verde-amarillento; estado paralítico del recto y del colon; comezón y dolor en las hemorroides.

ORGANOS SEXUALES.—Deseo sexual intenso, priapismo en la mañana; impotencia y emisiones dolorosas en la noche sin erección, depresión del instin-

to sexual, muchas veces enteramente extinguido; suma postración y debilidad de la visión después del coito, chancros fagedénicos, balanitis. ORGANOS FEMENINOS: Menstruación prematura y profusa en las personas nerviosas, irregular, escasa, casi negra y de mal olor. AMENORREA CON DEPRESIÓN DE ESPÍRITU, LASITUD Y DEBILIDAD NERVIOSA EN CENERAL. Cefalalgia obtusa durante la menstruación, muy cansada y soñolienta, dolor de piernas, dolor punzante en la pelvis y en el útero, dolor en el lado izquierdo y en los ovarios, dolor intenso de una á otra parte del sacro; leucorrea amarillenta, COLOR DE NARANJA, acre, que produce ampollas y escaldaduras; DESEO INTENSO SEXUAL después del período. Cólico menstrual en las mujeres nerviosas, lacrimosas y pálidas, HISTERIA, sensación de una bola que sube á la garganta, NERVIOSIDAD.

ORGANOS URINARIOS.—Enuresis en los niños YA CRECIDOS, estado paralítico de la vejiga, incontinencia de orina por debilidad nerviosa, micción frecuente ó que sale como agua, produciendo escoriaciones, sangre de la uretra; incontinencia por parálisis del esfínter de la vejiga, cistitis en condiciones asténicas con postración; enfermedad de Bright, Diabetes con debilidad nerviosa y apetito voraz, etc. Gonorrea con secreción de sangre, orina completamente AMARILLA como azafrán, comezón en la uretra, dolor incisivo en la vejiga y uretra.

EMBARAZO.—Tendencia al aborto en las personas nerviosas. MANÍA PUERPERAL, FIEBRE PUERPERAL.

Dolores de parto débiles é ineficaces, dolores falsos que hacen el trabajo lento por debilidad constitucional. Mastitis, cuando el pus es moreno, de aspecto sucio, olor desagradable y estado de adinamia.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.—Asma, por tomar la más mínima cantidad de alimento. Asma (grandes dosis y frecuentemente repetidas 3ª x), con abatimiento del sistema nervioso. Pérdida de la voz por parálisis de las cuerdas vocales. Asma de heno. Ronquera con sensación de agotamiento por excesivo ejercicio de la voz, si el sujeto es reumático ó nervioso; tos por iritación en la tráquea, la que se siente dolorida. Expectoración espesa, amarilla, salada y fétida. El pecho muy dolorido. Tos convulsiva en las personas extraordinariamente nerviosas, con gran agotamiento. Edema agudo de los pulmones, tos espasmódica, vomitando masas serosas y espumosas en exceso y amenazando sofocación. Respiración corta cuando se suben escaleras ó por cualquiera ejercicio. Ultimo período del crup, debilidad extrema, aspecto lívido y pálido.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Sensación de languidez en las personas nerviosas, ó vértigos por acción débil del corazón. Abatimiento por el susto, la fatiga, etc. Acción intermitente del corazón con sensibilidad nerviosa por emociones, pesar ó cuidado, PALPITACIONES. Desórdenes funcionales del corazón acompañados de debilidad, ansiedad y estado nervioso. Palpitaciones por la más ligera emoción mental ó al subir escaleras, pulso intermitente, irregular

ó más bajo que en el estado normal. Palpitación después de fiebre reumática, con agotamiento. Anemia, pobreza de la sangre, palpitación con insomnio y desasosiego. Circulación lenta.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Anemia espinal. Rebiandecimiento idiopático de la médula espinal, el enfermo experimenta dificultad en guiarse por sí mismo; pérdida de la facultad de moverse, cae y tropieza fácilmente. COJERA REUMÁTICA Ó PARALÍTICA, con rigidez después del reposo, pero mejorada por un movimiento suave. Dolor en la espalda y las extremidades, aliviado por el movimiento; incomodidad entre las escápulas; las puntas de los dedos como si estuviesen dormidas, comezón en las palmas de las manos y plantas de los pies, picazón de las piernas en la noche con adormecimiento y debilidad. Ardor de los pies, sensación de inquietud en ellos. Los dolores empeoran al levantarse de una postura sentada y por el ejercicio violento. Sensación de magullamiento doloroso en las partes enfermas, las que también están descoloridas. Reumatismo agudo y crónico, los dolores desaparecen moviéndose, son más fuertes en la mañana después del descanso, y al enderezarse de una posición sentada se sienten rígidas las partes enfermas. Agravación por el ejercicio y la fatiga. Rigidez, tendencia paralítica. Dolor en las caderas. Dolor paralizante y tractivo en la planta del pié. Sabañones. Debilidad muscular después de enfermedad grave.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Esta sal es el principal com-

ponente de los tejidos nerviosos. EN LOS DOLORES NEURÁLGICOS DE CUALQUIER ÓRGANO, CON DEPRESIÓN, FALTA DE FUERZA, SENSIBILIDAD EXAGERADA PARA EL RUIDO Y LA LUZ, MEJORADOS DURANTE EJERCICIOS AGRADABLES Y MOVIMIENTOS SUAVES, PERO EMPEORADOS EN LA SOLEDAD Y LA QUIETUD. Ciática. Dolor tractivo que de la espalda baja á los muslos y rodillas, entorpecimiento, rigidez, gran inquietud y dolor, agotamiento nervioso, etc. NERVIOSIDAD sin causa razonable. El paciente vierte lágrimas y "todo lo exagera en gran tamaño." PARÁLISIS DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, parcial, paraplegia, hemiplegia facial ó de la vejiga, de los párpados, etc. Por lo común viene repentinamente. Parálisis atrófica, parálisis locomotriz, pérdida de la fuerza motriz ó del poder estimulante. Parálisis que obliga á arrastrar los pies y cuyo progreso es lento, tendencia al agotamiento del cuerpo, con pérdida del sentido del tacto, parálisis facial. Epilepsía, semblante hundido, frialdad y palpitación después del ataque, el que se presenta á consecuencia de un susto; histeria, ataques por emoción violenta, sensación de una bola que sube á la garganta; estado trémulo, inquieto é impaciente, debilidad general con nerviosidad é irritabilidad. Los dolores se sienten demasiado agudos, se sobresalta fácilmente; tiene miedo á ladrones. Neurastenia, especialmente por excesos sexuales, caracterizada por intensa irritación espinal. PAROXISMOS DE DOLOR CON AGOTAMIENTO SUBSECUENTE. Parálisis infantil. ANEMIA ESPINAL por enfermedades enervantes, cojera

dolorosa, empeorada en el descanso, pero que se exacerba al comenzar á moverse.

Sueño.—Desvelo después de excitación ó molestia por causas nerviosas. Sonambulismo, los niños andan dormidos; bostezos, pandiculaciones y cansancio con sensación de vacuidad en la boca del estómago. Bostezos histéricos. Sueños constantes de incendio, ladrones, caídas, fantasmas, etc. Terrores nocturnos en los niños, despiertan de un sueño profundo gritando asustados; ensueños lascivos; pereza para levantarse por la mañana. Sacudimiento de los músculos al quedarse dormido.

Síntomas febriles.—Fiebre intermitente; transpiración fétida, debilitante, profusa. Tifo maligno, pútrido, de los campamentos, nervioso, fiebre cerebral. Es el principal remedio en la fiebre tifoidea, gástrica y entérica, con lengua seca y negra, petequias, insomnios, estupor, delirio, etc. Todos los síntomas malignos y tifoideos encuentran su remedio en esta droga. Temperatura elevada, escarlatina, condiciones pútridas de la garganta, agotamiento, estupor, etc. Sudores excesivos y debilitantes con olor fétido. Transpiración durante la comida con debilidad en el estómago; fiebre de heno, por irritabilidad nerviosa.

Piel.—Eczema, acompañado de nerviosidad y exceso de sensibilidad. Uñeros, abscesos y carbunclos cuando el pus adquiere un carácter fétido. Pénfigo maligno, vesículas y ampollas sobre el cuerpo

con líquido obscuro, la piel tiene un aspecto arrugado y marchito. Costras grasosas y de mal olor, ALOPECIA AREATA. Secreciones irritantes de la piel. COMEZÓN EN LAS PALMAS DE LAS MANOS Y PLANTAS DE LOS PIES, en donde la piel es más gruesa, comezón también de la epidermis con sensación de reptación; la frotación suave es agradable, el exceso de ella causa dolencia é irritación. Viruela, estado pútrido. Sabañones en los pies, manos y orejas; dolor, zumbidos y comezón en los oídos. Pústula maligna.

TEJIDOS.—Estado anémico. Pérdida de las carnes cada vez mayor. ATROFIA, ENFERMEDADES DEBILITANTES CON DEPOSICIONES FÉTIDAS. Hemorragias. La sangre es negra, delgada, pútrida y no coagulable. Debilidad general y agotamiento. En las personas que sufren de supresión del instinto sexual ó demasiada inclinación á él. Exudaciones irritantes, corrosivas, serosas, icorosas, saniosas, sucias y de mal olor. CONDICIONES GANGRENOSAS. Primer período de la mortificación de los tejidos. Cáncer, para los dolores, las secreciones desagradables y la decoloración. Raquitismo con deposiciones fétidas. Escorbuto con estado gangrenoso. HEMORRAGIAS SÉPTICAS. En las supuraciones cuando la secreción es asquerosa, sucia, icorosa y desagradable. Leucoemia lienalis, tifo, estados pútridos. Condiciones de atrofia en los ancianos, tejidos secos, escamosos, falta de vitalidad. Las secreciones tienen un olor de carne podrida.

MODALIDADES.—Muchos síntomas de este remedio se agravan por el ruido, por levantarse al estar sen-

tado, por el esfuerzo y el trabajo continuo y después de la quietud. EL AIRE FRÍO AGRAVA TODOS LOS DOLORES. La mejoría característica la produce un movimiento suave, LA COMIDA, bajo el estímulo de la compañía; empeoran los síntomas con la soledad. Los dolores y la comezón son peores de las 2 á las 5 a. m.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—El remedio ha sido experimentado por la Prover's Union of Chicago, bajo la dirección del Dr. H. C. Allen, del cual se han incluido los rasgos más salientes en la sintomatología mencionada. Otro experimento (por decirlo así) se llevó á cabo por el Dr. B. Fincke, con una joven muy sensible, usando la c. m., potencia, manteniéndola entre los dedos. Debemos confesar que no hemos leído personalmente la relación de este heroico experimento, así es que no podemos en conciencia incorporarlo en nuestro tratado. Sin embargo, algún interesado en este caso curioso puede hallar una relación de él en las Proceedings of I. H. A. Transactions, y también en The Medical Advance, Marzo de 1892, en cuyo número pueden asimismo hallarse las experiencias ordenadas por el Dr. Allen. Una diagnosis diferencial acerca de los fosfatos, cuidadosamente extraídas de las otras imperfectas, y hechas por el finado Dr. Samuel Lilienthal, puede hallarse en las "Transactions of the American Institute of Homœopathy," del año de 1890. La droga merece más extensión y una cuidadosa experimentación con todas las potencias.

ADMINISTRACIÓN.—Parecen obrar mejor las más bajas potencias, así la 2 x ó 3 x están recomendadas en el asma por Schüssler. Sin embargo, las más altas, 6 x y 12 x, y aun potencias elevadas, han sido empleadas todas con éxito satisfactorio.

RELACIONES.—Probablemente los medicamentos más análogos á esta sal son *Rhus tox.* y *Phosph.*, con los que tiene muchos síntomas comunes. Los síntomas nerviosos de *Pulsat.* parecen depender de la cantidad de *Kali phos.* que en ella se contiene. El estado mental peculiar de *Pulsat.* también se encuentra bajo este remedio. *Phytol.* tiene muchos síntomas comunes con *Kali phos.* Compárese en la ciática. *Ignat.*, probablemente también contiene *Kali phos.*, porque los síntomas histéricos son casi idénticos. En su acción como sedativo nervioso está en relación con *Ignat.*, *Coffea*, *Hyosc* y *Chamom.* En la cefalalgia menstrual compárese con *Zinc.*, *Cimicif.*, *Gelsem.*, *Cyclamen*, etc. En los trastornos de la vejiga frecuentemente encuentra un remedio complementario en *Magnes phos.*, la que corresponde más á las afecciones espasmódicas, mientras *Kali phos.* á los síntomas paralíticos. En la parálisis incipiente del cerebro, cuando se acompaña de irritación nefrítica, compárese con *Zinc. phos.* En las hemorragias, ya sea la sangre roja brillante ú obscura, delgada, acuosa y no coagulable, *Kali phos.* es seguido por *Natr. mur.* y también por *Nitr. ac.* Después de enfermedades debilitantes, la variedad de una especie de hongo que se encuentra en Francia, que con-

tiene grandes cantidades de *Kali phos.* restaura el poder y la nutrición muscular más rapidamente que cualquiera otra substancia. En los estados de desorden intelectual compárese con *Cyclam.*, el que frecuentemente corrige los síntomas anormales, tales como los desvaríos que se presentan en el estado mental de la locura. En la fiebre puerperal compárese con *Kali mur.* En los padecimientos post-diftéricos con *Lachesis* y *Caust.* En el estado gangrenoso con *Kali chlor.*

Estudio por grupos con *Kali phos.*:

1. Sistema nervioso, *Cimif.*, *Hyos.*, *Stramon. Zinc.*, *Silicea.*, *Ignat.*, *Anacard.*, *Conium.*, *Staphisag.*

2. Degeneración de la sangre, *Baptis.*, *Mur. acid.*, *Laches.*, *Crotalus*, *Kreosot.*, *Arsenic.*, *Carbo.*, *China.*

KALI SULPHURICUM.

Sinónimos.—Potassium Sulphate. Kali Sulphas. Potassæ. Sulphas.

Nombre común.—Sulfato de Potasa.

Propiedades químicas.—Fórmula, $K\ SO_4$.

Se encuentra en estado nativo en las lavas de los volcanes, etc., en forma de prismas cristalizados, cortos, permanentes, incoloros y de cuatro ó seis lados. Es soluble en diez partes de agua fría, y en tres, hirviendo; insoluble en el alcohol; tiene un gusto salino, penetrante y amargo.

Preparación.—El sulfato puro de potasa se pre-

para por trituración, como se indica en la Clase VII, *American Pharmacopœia.*

Datos químico-fisiológicos.—La acción de este remedio, según Schüssler, se ejerce sobre la epidermis y el epitelio. La falta de las partículas de esta sal ocasiona sobre la lengua un depósito amarillo y viscoso; una emisión y secreción por todas las superficies mucosas de una materia acuosa francamente amarilla ó verdosa, y la descamación de la epidermis y del epitelio.

Lo amarillento es debido probablemente á la metamórfosis retrógrada—degeneración grasosa de los productos inflamatorios y del epitelio gastado, etc.

Los sulfatos en la naturaleza y el óxido de fierro sirven como conductores del oxígeno. Si el sulfato y el óxido de fierro llegan á estar simultáneamente en contacto con una substancia orgánica en estado de degeneración, abandonan su oxígeno y se forma de este modo el sulfato de fierro; éste puede de nuevo descomponerse por el oxígeno del aire, formando ácido sulfúrico y óxido de fierro, los que, bajo la influencia de condiciones favorables, llegan otra vez á ser conductores del oxígeno. Semejante proceso puede ocurrir en el organismo humano; por lo tanto, de todos los sulfatos, Kali sulph. representa probablemente un papel importante, porque él se encuentra en las celdillas y en los fluidos intercelulares, músculos, nervios, epitelio y en los corpúsculos sanguíneos. Es, pues, el conductor del oxígeno. Tomado el oxígeno por el fierro contenido en

los corpúsculos de la sangre es conducido á cada celdilla del organismo por la acción recíproca del Kali sulph. y del fierro. Cada celdilla requiere para su crecimiento y desarrollo la influencia vitalizadora del oxígeno; pero su acción continuada oxida la base orgánica de las celdillas, por esta razón separan sus moléculas en el interior de sus elementos constitutivos. Una deficiencia de Kali sulph. puede, según la localidad y extensión, dar origen á los siguientes síntomas: Sensación de pesadez y cansancio, vértigo, calofrío, palpitaciones, temor, melancolía, dolor de muelas, cefalalgia, dolores en los miembros, los que son intermitentes y cambian de situación. Estos dolores empeoran en un cuarto caliente y cerrado hacia el principio de la noche, y se mejoran al aire fresco y libre, que es rico en oxígeno.

La epidermis y las celdillas epiteliales alimentadas pobremente de oxígeno se desprenden y descaman espontáneamente; si por medio de Kali sulph. es llevado el oxígeno suficiente á las partes que sufren, tiene lugar de este modo la formación de nuevas celdillas, y éstas, por su actividad, favorecen la descamación de las antiguas.

Acción general.—Puesto que los sulfatos son los productos característicos de la oxidación de los tejidos y la potasa tiene su esfera especial en los sólidos, la sal resultante es un activo reconstituyente de sus cenizas, por lo que es aplicable *Kali sulph.* para el tercer período de la inflamación ó en el es-

tado de retrogradación, infiriendo de esto su homeopaticidad para este estado.

Los padecimientos van acompañados por profusa descamación del epidermis. SECRECIONES AMARILLAS MUCOSAS. Elevación de la temperatura por la noche, produciendo una AGRAVACIÓN NOCTURNA. Otra indicación característica es la MEJORÍA POR EL FRÍO Y AL AIRE LIBRE. En las enfermedades causadas por una retrocesión de las erupciones. Produce perspiración si falla *Ferr. phos.*

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Temor de una caída.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Vértigo, especialmente al mirar hacia arriba y al ponerse en pie. Dolor de cabeza, que se empeora en un cuarto caliente y al anochecer, y se mejora por el frío y al aire libre. Caída de los cabellos. Manchas de calvicie. Cefalalgia reumática, comenzando al anochecer y en una atmósfera caliente; se agrava moviendo la cabeza de un lado á otro ó hacia atrás. Abundantes escamas del cuero cabelludo, húmedas y pegajosas. Caspa y tiña en la cabeza.

OJOS.—Catarata, opacidad del lente cristalino. Costras amarillas en los párpados, secreción purulenta AMARILLA ó verdiosa de los ojos. Conjuntivitis, oftalmía neonatorum. Abscesos de la córnea. Hipopión.

OÍDOS.—Sordera por hinchazón de la cavidad tim-

pánica, ó con catarro é hinchazón de las trompas de Eustaquio, agravada en un departamento caliente. Capa amarilla y viscosa sobre la lengua. Dolor de oído con secreción de materia acuosa ó AMARILLA. Después de la inflamación el fluido secretado es DELGADO, AMARILLO-VIVO ó verdioso. (*Cal. sulph.*, si es ESPESO y purulento). El dolor debajo del oído es agudo, incisivo, con tensión y punzada penetrante bajo la eminencia del mastoideo. Otorrea muy fétida. La excrecencia de los pólipos cierra el meato auditivo.

NARIZ.—Resfriados con expectoración amarilla y viscosa, ó secreción de materia acuosa. El paciente se encuentra generalmente peor al anochecer ó en una habitación caliente. La secreción de la nariz es frecuentemente amarilla ó verde-amarillosa. En los enfriamientos, después de *Ferr. phos.*, si este no produce una libre perspiración y la piel permanece seca. Catarro antiguo con secreción amarillenta y viscosa. Nariz obstruida con secreción amarillenta por la región posterior de las fosas nasales. Pérdida del olfato. Ozena.

CARA.—Dolor de la cara agravado en un cuarto caliente y al caer la tarde, se mejora por el frío ó al aire libre. Palidez de la cara ó enrojecimiento, semblante descompuesto. Epitelioma.

BOCA.—Hinchazón del labio inferior. Sequedad y descamación del mismo, se descascara en grandes láminas; epitelioma, calor ardiente en la boca.

LENGUA.—Capa amarilla y viscosa, algunas veces

con bordes blanquizcos. Sabor insípido. Labios, lenguas y encías blancas. Pérdida del gusto.

DIENTES.—Dolor de muelas agravado por el calor y en la noche, mejoría con el aire libre y frío. Dolencia crónica de las encías.

GARGANTA.—No hay síntomas que sean notables.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Calor ardoroso en el estómago, sed ardiente, náusea y vomitos. Catarro crónico del estómago con capa amarilla y viscosa de la lengua. Indigestión con sentimiento de opresión como de peso y plenitud en la boca del estómago, dolor, acumulación de agua en la boca. Sensación de languidez en el estómago. Dolores de cólico en el mismo, cuando falla *Magnes phos.* Dolor profundamente localizado. Fiebre gástrica con elevación de temperatura en la noche y diminución en la mañana. Falta de sed. Repulsión para las bebidas calientes, icteria por catarro gastro-duodenal.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES.—Diarrea purulenta, acuosa, viscosa y amarilla, con los síntomas característicos en la lengua. Dolores semejantes al cólico. El abdomen se siente frío al tacto. Dolores parecidos al cólico flatulento, causados por gran calor, con excitación y violento enfriamiento de la parte enferma. El gas que se escapa de los intestinos tiene un olor sulfuroso. Diarrea y cólico intenso. Constipación habitual. Hemorroides internas y externas con la capa de la lengua y las secreciones características. Fiebre entérica y tifoidea con elevación de temperatura por la noche y descenso por

la mañana. Abdomen timpánico, calambres y todas las indicaciones de próxima peritonitis. Abdomen muy distendido. Síntomas del cólera. Deposiciones fétidas, delgadas y negras. Nefritis post-escarlatinosa.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Gonorrea, secreción viscosa, amarilla ó verdiosa. Balanitis, gota militar. Orquitis después de la supresión de la gonorrea. Leucorrea, flujo amarillo, viscoso y verdioso ó secreción acuosa. Menstruación demasiado tardía y al mismo tiempo escasa, con una sensación de peso y plenitud en el abdomen, dolor de cabeza, capa amarilla de la lengua. Sífilis con la agravación característica al anochecer. Metrorragia.

EMBARAZO.—Los síntomas son escasos.

ORGANOS RESPIRATORIOS.—Asma bronquial con expectoracion amarilla, peor en la estación de los calores ó en una atmósfera caliente. Bronquitis con expectoración francamente amarilla, viscosa, verdiosa ó acuosa y profusa. Tos agravada en la noche con el calor. Neumonía, estertores gruesos. Dificultad para arrojar la mucha cantidad de mucosidades. Esputos consistentes en una substancia acuosa. Las mucosidades se deslizan por la faringe y son tragadas generalmente; tos dura y ronca como la del crup. Sensación de molestia en la faringe. ESTERTORES GRUESOS EN EL PECHO, RUIDO DE MUCOSIDADES CON LA TOS. Tercer período de la tos catarral con expectoración fácil y amarillosa. Ronquera crupal, ocasionada por el frío, fatiga al hablar. Tos convulsiva

con expectoración amarilla y viscosa. Neumonía con respiración jadeante, ruido de flemas al expectorar, tos floja, expulsando una materia amarilla ó acuosa. Sensación de sofocación en una atmósfera caliente; deseo de aire frío.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Pulso desigualmente acelerado, palpitante, dolor taladrante sobre la cresta del ilíaco. Pulso apenas perceptible.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Neuralgía ó dolores reumáticos en la espalda, la nuca ó en los miembros; cuando son periódicos, se agravan al anochecer ó en una habitación caliente; si son constantes, se mejoran en una atmósfera fría y al aire libre. Dolores reumáticos en las articulaciones ó en cualquiera parte del cuerpo, cuando son de un CARÁCTER PASAJERO, AMBULANTE y ERRANTE, localizándose en un lugar, después en otro, con las modalidades características. Inflamación fungoide de las coyunturas. Calambres en las extremidades superiores é inferiores. Erupciones escamosas, por lo común sobre los brazos, mejoradas por la aplicación de agua caliente.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Dolores neurálgicos en diferentes partes del cuerpo, con tendencia á mudar de localidad. Corea.

SUEÑO.—Sueños muy vivos.

SÍNTOMAS FEBRILES.—La temperatura sube desde al obscurecer hasta la media noche y luego decrece. Si se trata de promover la perspiración se dará el remedio frecuentemente, ayudado al mismo tiem-

po con la aplicación de ropas calientes. Fiebre intermitente con capa amarilla y viscosa de la lengua. Fiebres por envenenamiento de la sangre, como son: la gástrica, entérica y tifoidea; en la escarlatina para el período de descamación si hay sudores fríos.

Piel.—Función perezosa de la piel (administrar bebidas calientes al enfermo obligándolo á guardar cama y á estar abrigado). Cáncer epitelial, con secreción de una materia serosa, amarilla y delgada. Eczema, cuando la secreción es amarilla, verdiosa y acuosa, ó cuando se suprime rápidamente. Súbita retrocesión del sarpullido por un enfriamiento ú otra causa en cualquier enfermedad eruptiva, sarampión, escarlatina, eczema, etc., si la piel está áspera y seca. En la erisipela vesiculosa, para favorecer la caída de las costras. Ardor y comezón en la erupción papulosa. Condición enfermiza de las uñas, crecimiento interrumpido, etc. *(Silicea)*. La piel se descama fácilmente dejando una base pegajosa. Ulceras en la piel con secreción amarilla y acuosa, rodeadas por una epidermis desollada. Efectos producidos por el veneno de la hiedra, urticaria. En la viruela promueve la caída de las costras y la formación de una piel sana. Empeine escamoso en las palmas de las manos. Escaldaduras de los niños. Empeines antiguos. Ulceras tuberculosas con una filtración continua de pus amarillo y linfa.

Tejidos.—Inflamación con secreción purulenta, amarilla, acuosa y serosa. Exudaciones también serosas y acuosas. Adormecimiento, depresión de

la vitalidad y enfermedades que hacen rápido progreso. Pólipo blando. Epitelioma. Reumatismo articular ambulante.

MODALIDADES.—El gran característico del remedio es la AGRAVACIÓN VESPERTINA y la MEJORÍA POR EL FRÍO Y AL AIRE LIBRE. NOTABLE AGRAVACIÓN EN UNA HABITACIÓN CALIENTE; también la secreción característica marilla, viscosa y espesa de las membranas mucosas.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—No hay una experimentación regular, sino una colección compendiada de síntomas obtenidos con grandes dosis, recurso de la escuela antigua, cuya colección se encuentra en *Allen's Encyclopedia*, vol. V y X, y en el vol. VI de la *Guiding Simtoms*. Todos ellos han sido incluidos en los que dejamos mencionados.

ADMINISTRACIÓN.—Schüssler recomienda la 12 x y la 6 x; éstas dan los mejores resultados. En los estados febriles puede administrarse con frecuencia; está recomendada al exterior para la caspa y en las enfermedades del cuero cabelludo. Frecuentemente completa una curación comenzada por *Kali mur*.

RELACIONES.—El más próximo análogo de *Kali sulph* parece serlo *Pulsat*. Es interesante comparar estos dos remedios, pues tienen ambos muchos síntomas comunes. Así uno y otro tienen: agravación de los síntomas en un cuarto caliente. Mejoría por el frío y al aire libre. Las secreciones de las membranas mucosas son de carácter amarillo y purulento, algunas veces de color verde-amarilloso. Ca-

pa de la lengua amarilla y viscosa. Presión y sensación de plenitud en el estómago. Gonorrea con secreción blanda amarilla ó verde-amarillosa. Expectoración mucosa amarilla que se expulsa de los pulmones con la tos. Ronquera por un simple resfriado. Dolores en los miembros agravados en la noche y por el calor, mejorados por el frío y al aire libre. Palpitaciones del corazón. Dolores reumáticos ambulantes, errantes y que cambian de lugar. Un análisis químico de *Pulsat* pone de manifiesto que uno de sus constituyentes es *Kali sulph.*, otro es *Kali phos.*, y por último lo es *Calc. phos.* Sus síntomas de las membranas mucosas son probablemente debidos á la presencia de *Kali sulph.*, y los mentales y nerviosos á *Kali phos.*; pero, indudablemente, esto es pura hipótesis, y solamente son sugeridos por un prolijo estudio y observación. *Kali sulph.* frecuentemente sigue con ventaja á *Kali mur.* Remedios que le son compatibles en la picazón y enrojecimiento de la piel: *Acetic. acid.*, *Arsen.*, *Calc. carb.*, *Dolichos*, *Hepar*, *Puls.*, *Rhus*, *Sepia*, *Silicea*, *Sulphur* y *Urtica.*

Compárese con *Natr. mur.* en la sordera, dolor en el estómago, esterores gruesos y exudaciones profusas; pero estas son más acuosas en *Natr. mur.*

MAGNESIA PHOSPHORICA.

SINÓNIMOS.—**Magnesium Phosphoricum.**
NOMBRE COMÚN.—**Fosfato de Magnesia.**

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula, Mg. HPO_4, TH_2O. Se hace mezclando fosfato de soda con sulfato de magnesia. Los cristales que resultan son de seis lados, en forma de agujas. Tienen un sabor fresco y algo dulce. Son escasamente solubles en el agua; 322 partes de ésta disuelven sólo una parte al cabo de mucho tiempo. El agua hirviendo los descompone. Existe en los granos de los cereales, y puede descubrirse en considerable cantidad en la cerveza.

PREPARACIÓN.—La sal se tritura según la Clase VII, *American Homeopathic Pharmacopœia.*

DATOS QUÍMICOS FISIOLÓGICOS.—Es un constituyente inorgánico de los músculos, nervios, huesos, cerebro, dientes y corpúsculos de la sangre. Un desorden de su movimiento molecular causa calambres, dolores y parálisis. Schüssler dice que la acción de *Magnes. phos.* es el reverso de la del fierro. Con el desórden funcional de las moléculas del último se relajan las fibras musculares, y se contraen por medio del desorden funcional de las de magnesium; por consiguiente, es el remedio para los calambres, convulsiones y otros fenómenos nerviosos.

ACCIÓN GENERAL.—Las enfermedades que tengan su punto de partida en las celdillas de las fibras nerviosas ó en los bulbos terminales de los nervios, en los músculos ó en el tejido muscular mismo, son curados por este remedio. Los dolores para los que conviene son lancinantes y de carácter espasmódico, taladrantes, como relámpagos, acompañados con

una sensación constrictiva. Con frecuencia cambian de localidad y se ALIVIAN POR EL CALOR Y LA PRESIÓN. Es puramente ANTIESPAMÓDICO, y por esto es curativo en los calambres, espasmo de la glotis, tétano, epilepsía, retención espasmódica de la orina, parálisis agitante, etc. Es el que se adapta MEJOR á las personas extenuadas, flacas, delgadas, de una organización sumamente nerviosa, y prefiere una complexión ligera y el lado derecho del cuerpo. El frío en general favorece excesivamente su acción; el calor y la presión se oponen por el contrario á ella, de aquí resulta que el paciente se alivie por ellas. Los ataques son frecuentemente acompañados de gran postración y algunas veces con sudor profuso. El paciente de *Magnes. phos.* está lánguido, cansado, exhausto, incapaz de levantarse, ya sea que sufra de afecciones crónicas ó agudas.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Ilusiones de los sentidos, falta de memoria, torpeza é incapacidad para pensar claramente, indisposición para los esfuerzos mentales. Sollozos y lamentaciones que duran todo el tiempo del dolor y se acompañan con hipo. Se habla constantemente á sí misma ó permanece sentada, inmóvil y en obstinado silencio. Lleva las cosas de un lugar á otro.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Trastornos cerebrales en los niños con pérdida del conocimiento y síntomas convulsivos. Cefalalgia, los dolores son de carácter agudo, lancinante, incisivo, ambulante, intermitente, espasmódico, paroxísmicos y neurálgicos, SIEMPRE ALIVIADOS POR LA APLICACIÓN DEL CALOR. Dolor de cabeza nervioso con chispas ante los ojos. Dolores muy agudos en la misma, con mayor intensidad en las personas jóvenes y fuertes, constantes mientras asisten á la escuela ó DESPUÉS DE UN TRABAJO MENTAL, ó por cualquier estímulo mecánico. Dolor en el vértice y la nuca que se extiende á la espina, más intenso entre los hombros. Dolor de cabeza que del occipucio se extiende á toda ella, con náusea y CALOFRÍO. La piel del cráneo se siente áspera; mucha caspa; pústulas.

OJOS.—Visión afectada; se ven colores delante de los ojos (cromatopsia), chispas, sensibilidad á la luz, fotofobia, diplopia, pupilas contraídas, torpeza de la visión por debilidad del nervio óptico ó de la retina. Manchas obscuras flotan ante los ojos. Nistagmus, estrabismo espasmódico, ptosis ó languidez de los párpados, temblor de los mismos. NEURALGIAS ORBITALES Y SUPRA-ORBITALES, PEORES SOBRE EL LADO DERECHO Y ALIVIADAS POR EL CALOR aplicado exteriormente, sensibilidad exquisita al tacto. El lagrimeo aumenta con el dolor, comezón de los párpados. "Retinitis Pimentosa." (R. S. C.)

OÍDOS.—La debilidad de las fibras nerviosas del oído causa sordera. Otalgia de carácter puramente

nervioso, mejorada por el calor. Dolor neurálgico, peor tras el oído derecho, que se agrava en el aire frío y por LAVARSE LA CARA Y CUELLO CON AGUA FRÍA. "Un remedio que se debe tener en cuenta en todas las afecciones del oído interno." (Copeland).

NARIZ.—Pérdida ó perversión del sentido del olfato, aun sin trastornos catarrales. Obstrucción que alterna con secreción profusa. Escozor y escoriaciones, peor en el lado izquierdo. Coriza alternativamente seco y húmedo.

CARA.—Neuralgia supra é infra-orbital. Prosopalgia, dolores intermitentes y como relámpago, siempre se mejoran con el calor; agravados por el tacto, la presión, el frío y sobre el lado derecho, á las 2 p. m. y en la cama. Dolores neurálgicos del lado derecho, desde el agujero infra-orbital á los dientes incisivos, gradualmente irradian sobre todo el lado derecho de la cara, empeoran por el tacto, al abrir la boca, al aire frío y por un enfriamiento, por lavarse ó permanecer en el agua fría y por la exposición á un viento fuerte del norte.

BOCA.—Sacudimientos convulsivos de los ángulos de la boca. Sensación de contracción dolorosa en la articulación del maxilar inferior, con saltos hacia atrás. Tartamudeo espasmódico. Trismo, contracción violenta de las mandíbulas.

LENGUA.—Generalmente limpia con dolor en el estómago; saburra blanca con diarrea; roja brillante con ulceraciones en la boca y el lado izquierdo

dolorido; escozor como de úlcera cancerosa; dolorosa al comer como si estuviese escaldada.

DIENTES.—Muy sensibles al tacto ó al aire frío; no puede lavarse los dientes con agua fría. Dolor de muelas agravado después de acostarse, cambia de lugar rápidamente; se empeora más al lavarse y aplicarse cosas frías; SE MEJORA POR EL CALOR Y CON LÍQUIDOS CALIENTES (si lo fuese por los fríos, *Ferr. phos.*, *Bry.*, *Coff.*) DOLORES INTENSOS EN LOS DIENTES CARIADOS Ú OBTURADOS; caries de los dientes con hinchazón de las glándulas de la cara, garganta y cuello É HINCHAZÓN también de la lengua. PADECIMIENTO EN LA DENTICIÓN DE LOS NIÑOS. ESPASMOS sin síntomas febriles.

GARGANTA.—Dolencia y rigidez, especialmente del lado derecho; las partes parecen hinchadas, CON CALOFRÍO y dolor en toda la garganta; deglución dolorosa con dolor en la nuca; necesidad de tragar. Destilamiento de las fosas nasales posteriores, con estornudos y aspereza de la garganta; espasmos de la glotis, constricción espasmódica de la garganta al intentar la deglución de los líquidos, con sensación de ahogo.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Sensibilidad para los ácidos y aversión para el café. Deseo inmoderado del azúcar. HIPO con náuseas día y noche; la obstinación de este hipo causa una dolencia de larga duración. Regurgitación del alimento. Eructos quemantes, insípidos, que se mejoran bebiendo agua caliente, car-

dialgia; Gastralgia con lengua limpia, aliviada por el calor y por encorvarse: el dolor empeora al tocar el epigastrio y se renueva por beber agua fría. Espasmos ó calambres en el estómago, dolor como si una faja estuviese bien apretada alrededor del cuerpo. Dilatación flatulenta del estómago con dolor constrictivo, dispepsia flatulenta, náusea y vómito.

ABDOMEN.—ENTERALGÍA, CÓLICO FLATULENTO QUE OBLIGA AL ENFERMO Á DOBLEGARSE Y ENCORVARSE, ALIVIADO POR LA FROTACIÓN, EL CALOR, LA PRESIÓN, ACOMPAÑADO POR ERUCTOS GASEOSOS QUE NO PRODUCEN CONSUELO. Flatulencia en las circunvoluciones intestinales; borborigmos y eructos. CÓLICO FLATULENTO DE LOS NIÑOS Y DE LOS RECIÉN NACIDOS. Dolores abdominales que causan gran desasosiego, irradian desde el ombligo y con frecuencia se acompañan con diarrea acuosa; no se puede estar acostado sobre el dorso y extendido, tiene que permanecerse encogido. SENSACIÓN EN EL ABDOMEN, DE PLENITUD Y TURGENCIA; NECESITA AFLOJARSE LOS VESTIDOS Y ANDAR, y expulsar gases constantemente.

DEPOSICIONES, diarrea ACUOSA, con vómito y calambres en las pantorrillas; calofrío y dolor en el estómago. Las evacuaciones se expelen con fuerza. Disentería con dolores como de calambre, retención espasmódica de la orina; dolores incisivos como relámpago en las hemorroides, tan intensos que causan desmayo; más agudos en el recto y el abdomen. Cada deposición se acompaña de dolor en el recto; dolor como espasmo prolongado de los músculos

abdominales; constipación de los niños con dolor espasmódico á cada tentativa para evacuar, indicado por los gritos agudos y penetrantes; mucho gas, borborigmos y cólico flatulento.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Urgencia constante para orinar cuando anda ó permanece de pie. Espasmo de la vejiga; los niños pequeños expulsan grandes cantidades de orina; padecimientos espasmódicos urinarios; retención espasmódica; espasmo del cuello de la vejiga, urgencia dolorosa. Enuresis nocturna por irritación nerviosa. Neuralgía vesical después del uso del cateter. Deficiencia ó exceso de fosfatos en la orina. Mal de piedra. Deseo sexual aumentado.

ORGANOS FEMENINOS—CÓLICO MENSTRUAL; el dolor precede al flujo; intermitente, peor sobre el lado derecho, notable alivio por el calor. La neuralgía del ovario es peor sobre el lado derecho. Vaginismo. Ovaritis. DISMENORREA MEMBRANOSA. (Ha curado una multitud de casos). Menstruación demasiado temprana con flujo obscuro, fibrosa; hinchazón de las partes externas.

EMBARAZO.—Dolores espasmódicos de parto con calambres en las piernas, excesivos esfuerzos de expulsión y dolores calambroideos. Convulsiones puerperales (intercurrente). Utero relajado y contraído. Retención de la placenta.

SISTEMA RESPIRATORIO.—En el asma, cuando la flatulencia es penosa; estrechez espasmódica de la tráquea con voz precipitada y penetrante, constric-

ción del pecho. Tos persistente semi-crónica de un carácter nervioso y pseudo-catarral. Verdadera tos espasmódica, viene en paroxismos sin expectoración; accesos convulsivos de tos nerviosa terminados con un grito; coqueluche; tos espasmódica en la noche con dificultad para acostarse. Dolores lancinantes en el pecho, más sobre el lado derecho, que irradian hacia los intestinos, opresión del pecho, respiración dificultosa. Constricción del pecho y garganta con tos de cosquilleo, seca y espasmódica.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Angina pectoris, espasmos neurálgicos (obra mejor dándola en agua caliente); en la palpitación nerviosa del corazón cuando es de origen espasmódico.

CUELLO Y ESPALDA.—Dolor violento en la parte inferior del dorso, en el cuello y en la espalda. Dolores neurálgicos agudos, taladrantes, lancinantes, en cualquier parte del dorso. Dolores ambulantes; neuralgía intercostal. La espina dorsal está muy dolorosa y sensible al tacto.

EXTREMIDADES.—Dolores lancinantes en los hombros y brazos, peores en el lado derecho. Articulaciones dolorosas. Temblor involuntario de las manos. Parálisis agitante. Sensación de latido. Neuralgía en los miembros inferiores por la noche, ordinariamente con contracciones espasmódicas de los músculos; las piernas duelen después de recogerse en la cama. Sensación en las extremidades como de un choque eléctrico, seguida de dolencia muscular. Calambres en las pantorrillas. Ciática

con dolores atormentadores y espasmódicos. Dolores violentos en el reumatismo agudo de las articulaciones (como intercurrente en la fiebre reumática). Falta de poder locomotivo. Pies muy delicados.

SÍNTOMAS NERVIOSOS:—Es el remedio nutritivo y funcional para los tejidos nerviosos. LÁNGUIDO, CANSADO, EXHAUSTO, incapaz de ponerse en pie. Alcoholismo. Neuralgías nocturnas con contracciones musculares espasmódicas. Espasmos en las afecciones idiopáticas de los tejidos de los nervios motores. Tirantez dolorosa en todo el cuerpo durante las horas de vigilia. Dolores como relámpago; convulsiones con rigidez de los miembros ó del cuerpo, los dedos cerrados y los pulgares encarcelados. Hipo, *Corea*, movimientos involuntarios y contorsiones de los miembros. Epilepsía que proviene de costumbres viciosas, espasmos, rigidez de las extremidades, los puños cerrados y los dientes apretados. Parálisis agitante, temblor de las manos, sacudimiento de los miembros superiores al llevarlos á la cabeza. Parálisis de las fibras nerviosas. Calambre de los escribanos y de los tocadores de piano ó de violín. Espasmos tetánicos, trismus (rechinido de dientes). Sollozos convulsivos.

SUEÑO.—Bostezo espasmódico. Insomnio por agotamiento, ó falta de nutrición cerebral. Somnolencia. Sueño turbado por desvaríos penosos, por dolor en el occipucio y en la nuca.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Fiebre intermitente con calambres en las pantorrillas. *Calofrío* después de la

comida, al anochecer, cosa de las 7 p. m. *El calofrío recorre la espalda y causa horripilación*, seguida por una sensación sofocativa. Calofríos intensos cerca de las 9 a. m. Fiebre biliosa, sudor profuso.

PIEL.—Dolor con ardor y punzada en los juanetes y callos. Comezón por afeitarse. Erupción herpética con escamas blancas. Tumores. Sarpullido como picaduras de insectos; peor cerca de las rodillas, tobillos y codos.

TEJIDOS.—Espasmos y neuralgías. Asma nerviosa, Espasmo de la glotis, Corea, Tétano, Malos efectos ocasionados por estimulantes dañosos.

MODALIDADES.—Todos los dolores de este remedio son característicamente *peores del lado derecho y por el frío,* por exponerse á un viento helado, por *lavarse* con agua fría y por el tacto. Siempre *se alivian por las aplicaciones calientes, por el calor*, la presión, por *encorvarse* y por la fricción.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—Este magnífico remedio desde su introducción por Schüssler, ha sido experimentado por los Dres. W. P. Wesselhœft, J. A. Gann y otros miembros del I. H. A., por quienes fueron comprobadas las principales indicaciones del mismo Schüssler y añadidas otras, dándonos de este modo un policresto de la más alta importancia. Todos los experimentos han sido arreglados sistemáticamente por el Dr. H. C. Allen, y publicados en el "Médical Advance," de Diciembre de 1889. La sintomatología precedente contiene todo lo que nos parece digno de confianza y que merece conservar-

se. Un resumen de sus síntomas se ha publicado también en la "Guiding Symptoms" de Hering, vol. VII.

ADMINISTRACIÓN.—Schüssler recomienda la 6x trituración, y añade que obra mejor cuando se administra en agua caliente. Muchos prácticos han justificado este precioso dato, y encuentran también que en caso de fallar con esta preparación, las potencias más bajas, como la primera ó la segunda, podían curar. En el cólico, el Dr. J. C. Morgan, aconseja la 30x en agua, y en dosis frecuentes; pero en vista de los resultados verdaderamente maravillosos, y al parecer enteramente dignos de crédito, obtenidos por los experimentadores con las más altas y elevadas potencias, podemos recomendar éstas siempre que fallen las más bajas.

RELACIONES.—*Magnes phos.* ha conquistado sus más grandes laureles en el tratamiento de las afecciones nerviosas, especialmente en las neuralgías. De un modo general, se encuentra otro remedio de los tejidos con el que comparte los honores; este es *Kali phos.*, el que de una manera más exacta podemos llamar el remedio *nutritivo* del cerebro, y el que clínicamente corresponde más á las afecciones paralíticas, en tanto que *Magnes. phos.* tiene más acción sobre las espasmódicas. La modalidad general difiere demasiado, pues *Kali phos.* tiene mejoría por las aplicaciones frías. Estudiando la acción de esta droga, encontramos la más sorprendente semejanza en el cólico y otros síntomas neurálgicos con

Colocynth., y es un hecho ciertamente interesante y sugestivo el que este remedio contiene 3 por ciento de *Magnes. phos.* El cólico flatulento trae también á la memoria la *Dioscorea.* Otro que se le acerca en relación es *Gelsem.* Las experimentaciones de ambos ponen de manifiesto una estrecha correspondencia en la mezcla de síntomas espasmódicos y paréticos, de aquí su feliz empleo en la histeria, hipocondríasis é irritación espinal. El calofrío que recorre la espalda es común á uno y otro. Bastante natural es que en este grupo fisiológico encuentren lugar *Ignat.* y *Nux. mosch.*, los que especialmente se semejan por los síntomas flatulentos de ambos y por los espasmódicos de *Ignat.* En los espasmos, *Magnes. phos.* es semejante á *Bellad.*, y la sucede con frecuencia si falla, y el enfermo presenta las pupilas dilatadas, ojos fijos y sobresaltos al más liligero ruido. En el estrabismo, si es causado por lombrices, compárese con *Natrum phos.*; en las secreciones acuosas, diarrea, etc., con *Natrum mur.*; en la epilepsía con *Kali mur.*, *Calc. phos.* y *Silicea;* en las afecciones del lado derecho del cuerpo, con *Bellad.*, *Bryon.*, *Chelid.*, *Kali carb.*, *Licop.*, y *Podoph.* Los dolores violentos traen á la memoria á *Bellad.* y *Stramon.;* los ambulantes, que cambian rápidamente de lugar, á *Puls.*, *Kali sulph.* y *Lac. can.;* tiene la compresión y sensación constrictiva de *Cactus.*, *Calc.*, *Iod.* y *Sulph.* En la menstruación y los dolores de parto se parece á *Viburn.*, también á *Pulsat.*, pero á diferencia de ésta, se mejoran por

el calor. *Cimicif.* tiene aquí mucha semejanza, pero sus dolores son más firmes y los de *Magnes. phos.* más espasmódicos. Además, los dolores de *Magnes. phos.* parecen tener asiento en sitios más profundos, ovarios, fondo de la matriz; y los de *Cimicif.* más en los ligamentos (A. P. Davis). En la dismenorrea membranosa, recuérdese *Borax.*, *Acetic. acid.* y *Viburn. op.* Entre las plantas que contienen *Magnes. phos.*, pueden mencionarse *Lobelia*, *Symphytum*, *Stramon.* y *Viburns.*, lo que explica probablemente la presencia de síntomas semejantes. En los dolores neurálgicos nocturnos, aliviados por el calor, compárese también con *Arsen.*, y en su acción sobre el sistema nervioso en general, compárese con *Zinc.*

ANTÍDOTOS.—*Bellad.*, *Gelsem.* y *Laches.*

NATRUM MURIATICUM.

SINÓNIMOS.—Sodium Chloride. Chloruretum Sodicum. Natrium Chloratum Purum. Sodii Chloridum. Chloruro de Sodium.

NOMBRE COMÚN.—Sal común. Sal de mesa.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula, Na-Cl. Se presenta abundantemente en la naturaleza, casi en todas partes. Cristaliza en solución acuosa, incolora, transparente y en cubos anhidros, es soluble en tres partes de agua fría, con más dificultad en el agua hirviendo; es insoluble en el alcohol absoluto. Sus soluciones acuosas disuelven varios cuerpos que son insolubles en el agua, *v. g.*, *Calc. phos.*, etc.

PREPARACIÓN.—Una parte por peso del Chloruro de Sodium puro se disuelve en nueve partes, siempre según el peso, de agua destilada. Cantidad de la potencia de la droga, un décimo. Las diluciones y las trituraciones se preparan conforme á los métodos de Hahnemann.

DATOS QUÍMICOS FISIOLÓGICOS.—Esta sal es un constituyente de cada una de las partes líquidas y sólidas del cuerpo. Su acción funcional es la de regularizar el grado de humedad interior de las celdillas. Esta función de la sal para regularizar el grado de humedad interior de las celdillas, se verifica en virtud de su propiedad de atraer el agua que se ingiere como bebida ó en el alimento, y con la cual penetra en la sangre á través de las celdillas epiteliales de las membranas mucosas, desde donde puede finalmente llegar á las diferentes celdillas, dándoles el grado indispensable de humedad. Cada celdilla contiene Soda en combinación con el Chloruro naciente, que se forma por la repartición del Chloruro de Sodium contenido en los fluidos intercelulares. Este Chloruro de Sodium producido de este modo dentro de la celdilla, tiene la propiedad de atraer el agua; en consecuencia de lo cual la celdilla aumenta de volumen y es dividida. Solamente en este sentido se hace la división de las celdillas para lograr el objeto, que es efectuar la multiplicación de las mismas.

Si el Chloruro de Sodium no se forma dentro de las celdillas, es retenida en los fluidos intercelulares el agua destinada para suplir su humedad y resulta

la *hidroemia.* El paciente, entonces, muestra una apariencia de hinchazón acuosa, está lánguido, soñoliento, lacrimoso, friolento, especialmente á lo largo de la espina y extremidades. Tiene necesidad de la sal; sin embargo de que pueda ofrecérsele en el alimento un abundante suplemento de ella, la condición enfermiza no disminuye, simplemente porque las celdillas no pueden llenar el vacío de las partículas de sal, á menos que se les proporcione en una solución muy diluida. Una superabundancia de sal en el interior de los fluidos intercelulares, ocasiona con frecuencia un gusto salado, debido á la irritación de los nervios *gloso-faríngeo y lingual;* tal condición causa también acritud de las secreciones de las membranas mucosas ó de las heridas abiertas.

El Chloruro de Sodium contenido en las celdillas sanas del epitelio de las membranas serosas, regula la osmosis de agua de la sangre arterial para los diversos receptáculos serosos. Un desorden funcional de las moléculas de esta sal, es seguido por una exudación acuosa dentro del receptáculo seroso. Por la aplicación terapéutica de pequeñas dosis de *Natrum-mur.*, las células se ponen en aptitud de reabsorber la exudación.

Un desorden del movimiento molecular de esta sal en el epitelio de las glándulas lacrimales ó en las salivares, es seguido por lagrimeo y ptialismo.

Si está irritada la rama dental del quinto nervio y el desorden llega á las glándulas lacrimales, lo que se verifica por medio de las fibras secretoras del sim-

pático, y de lo cual resulta un desorden funcional de las moléculas de sal en estas celdillas, tenemos una odontalgia acompañada por abundante flujo de saliva.

Las celdillas epiteliales de la membrana mucosa intestinal transportan, por medio de su sal, el agua tomada con el alimento al interior de la sangre contenida en las ramas de la vena porta. Un desorden de sus funciones, ocasionado por cualquier irritación, da por resultado un flujo opuesto. El suero penetra en el canal intestinal, y de ello resulta, como consecuencia, una diarrea acuosa, y si la irritación alcanza las celdillas mucosas del intestino, la diarrea consiguiente, además de acuosa, será mucosa. La mucina de las celdillas mucosas aparece sobre la superficie como un moco-transparente y viscoso; la secreción normal del moco se aumenta si las celdillas mucosas contienen sal y mucina en cantidad demasiado pequeña.

El Chloruro de Sodium es el que particularmente regulariza la cantidad de agua que entra en la composición de los corpúsculos de la sangre, conservando, por este medio, su forma y consistencia, y parece desempeñar un oficio análogo con respecto á los otros semi-sólidos del cuerpo. (Dalton).

Las moléculas de *Natrum-mur.*, contenidas en las celdillas epiteliales de las glándulas pépticas, llegan á ser divididas por la acción suave del ácido carbónico de la sangre, se separa su clorina, y la Soda li-

bre se une con el ácido carbónico; esta combinación llega á la sangre mientras la clorina, unida al hidrógeno y disuelta en el agua, llega al estómago como ácido hidroclórico. Si á causa de la falta de sal en las celdillas epiteliales de las glándulas pépticas no puede formarse HCl., se origina un aumento en la exudación del moco alcalino de la superficie epitelial de la membrana mucosa del estómago. Es un procedimiento paliativo administrar el Acido Hidroclórico diluido con objeto de reducir la secreción de la superficie epitelial de la célula, á una cantidad conveniente; puede efectuarse una curación racional, restableciendo el movimiento desordenado de las moléculas del Na. Cl. que se encuentran en el fluido nutricio de las celdillas epiteliales de las glándulas pépticas, por medio de la administración de moléculas homogéneas.

Este es también el remedio funcional de la mucina que está contenida en las celdillas epiteliales de todas las membranas mucosas. Cura los catarros de éstas cuando se presenta su exudación característica; así como el Acido Hidroclórico, formado en las celdillas epiteliales de las glándulas pépticas, reduce la exudación mucosa alcalina del epitelio superficial á la justa cantidad, así el Acido Hidroclórico que se forma puede limitar la secreción de moco en su forma naciente, separando el Chloruro de Sodio de la mucina de todas las membranas mucosas.

Es un hecho que el Acido Hidroclórico se obtiene de la sal *(Natr. mur.)*, no sólo por medio del Acido

Carbónico, obrando sobre la sal en masa, sino también por medio de la acción del agua.

En el primer caso, el Acido Carbónico se une con el Sodio que ha perdido su Chlorina, llegando en este estado de combinación á la sangre; en el segundo, resulta el Hidróxido de Sodio que disuelve la mucina y aumenta la secreción de moco. Esto explica el origen del catarro en las atmósferas húmedas.

A consecuencia de un desorden marcado de la función de la sal, el suero de la sangre puede trasudarse en el interior del estómago y resultará el vómito de una secreción acuosa (pirosis). Si se carece de sal en una porción de las celdillas *debajo* de la epidermis, no pueden recibir su cantidad de agua conveniente, y la epidermis se levanta en vesículas con un contenido claro y acuoso. Vesículas semejantes, debidas al correspondiente desorden, pueden presentarse en la conjuntiva.

Como consecuencia de un trastorno funcional de la sal, podemos hallar al mismo tiempo, aunque en diferentes sitios, secreciones ya aumentadas ó disminuidas; por ejemplo, puede existir un catarro gástrico con vómitos de agua ó moco, juntamente con un estado de constipación causada por una diminución de la secreción de moco en el colon.

Acción general.—El *Natr. mur.* promueve la actividad del cambio de tejido y aumenta la secreción de la urea, por esto se usa en los padecimientos de la escrofulosis crónica que afectan las glándulas, los

intestinos y la piel. Obra sobre la sangre, el sistema linfático, la membrana mucosa del tubo digestivo, el hígado y el bazo. Causa un deterioro de la sangre y de los otros fluidos vitales, participando de la naturaleza escorbútica, dando lugar á la inflamación que llega á la ulceración y produciendo distintas discrasias. También produce, y en consecuencia cura, una caquexia como la que resulta en la intermitente por el abuso de la quinina. *Nutrición defectuosa* y *extenuación*, *anemia*, leucoemia, hidroemia, clorosis y escorbuto. Una secreción serosa es la guía para el uso de esta droga. Causa dolores en cualquier parte del cuerpo cuando se acompañan de salivación, aumento de lágrimas ó vómitos acuosos ó de moco. Por todas partes son afectadas las membranas mucosas, produciendo blandura esponjosa é hinchazón con hiperemia venosa, flujo de sangre y aumento de la secreción mucosa; de aquí que cure los catarros de todas las membranas mucosas con secreción de *moco-transparente, acuoso, en grumos, espumoso.* Vesículas con contenido acuoso que revientan y dejan una costra delgada. Vómitos acuosos, aumento de acuosidad de alguna de las partes del cuerpo, hidrocéfalo, etc. *La lengua tiene una apariencia limpia y lustrosa ó se extienden burbujas de una saliva espumosa á lo largo de sus bordes, ó bien está ancha, descolorida, hinchada, con una capa pastosa.*

Diminución de las secreciones de alguna parte del cuerpo, sabor salado.

El Dr. León Rosenbusch, de Lernburg, refiere un experimento de lo más favorable para el uso de *Natr. mur.* en inyecciones subcutáneas en los casos en que hay peligro manifiesto por falta de circulación. El autor ha reasumido del modo siguiente las indicaciones para las inyecciones y las cantidades que deban usarse:

1. Colapso inesperado (de cinco á ocho dracmas de una solución al seis por ciento).

2. Paresis de los músculos del corazón por alguna enfermedad aguda (de cinco á ocho dracmas de una vez, y en seguida una ó dos dracmas diariamente).

3. Gastro-enteritis aguda, gran debilidad después de vómitos intensos y diarrea (de ocho á veinte onzas de una solución tibia al seis por mil).

4. Hemorragia de los pulmones, estómago é intestinos (cinco dracmas; después una y media dracmas diariamente).

5. Debilidad cardiaca á consecuencia de enfermedad crónica y de un estado caquéctico (una y media dracmas diariamente por varios días).

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Se siente sin esperanza acerca del porvenir, abatimiento de espíritu agravado por el consuelo, seguido de agitación del corazón. Delirio con sobresalto y extravío acompañado de la

apariencia espumosa de la lengua. *Genio hipocondríaco* con constipación. Excesivamente jovial, excitado con inclinación á bailar y á cantar; irritabilidad colérica con transportes arrebatados. Delirium tremens; los más de los casos se curarán con este remedio. *Melancolía en la época de la pubertad. Desfallecimiento cerebral.*

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Dolor de cabeza obtuso y pesado, con profusión de lágrimas, somnolencia, sueño no reparador. La cabeza se inclina adelante involuntariamente por debilidad de los músculos del cuello. Cefalalgia con constipación, por entorpecimiento y sequedad de una porción del trayecto de la mucosa intestinal, cuando la lengua está limpia ó cubierta con burbujas de saliva espumosa. Dolor de cabeza con vómitos de flema transparente ó acuosa; también en la cefalalgia acompañada de náusea con los síntomas anteriores *(Calc. phos.)*. Hemicránea, pérdida del conocimiento y sacudidas de los miembros; *dolor de cabeza como martilleo, generalmente peor en la mañana.* Dolor de cabeza en las jóvenes educandas, durante la menstruación, con sensación de quemadura en el vértice. Es el principal remedio en la insolación. Plenitud en los senos venosos con tendencia á la extravasación; congestión cerebral momentánea. *Erupción con picazón en el nacimiento del pelo, en la parte que corresponde á la nuca*, acompañada de humedad glutinosa. Caspa, escamas blancas sobre el cráneo, co-existentes algunas veces, con secreciones

acuosas de la boca, nariz y ojos. Caída de los cabellos.

Ojos.—Ceguera. Vesículas sobre la córnea, manchas blancas en la misma. Obra especialmente sobre el humor vítreo. Gasa delante de los ojos; las letras parece que corren cuando se lee. Ulceras escrofulosas de la córnea con fotofobia, especialmente en los pacientes escrofulosos ó tuberculosos. Secreción de moco claro de los ojos, ó flujo de lágrimas con obstrucción del conducto lacrimal, peor después del uso del nitrato de plata. Conjuntivitis con secreción blanca mucosa y lagrimeo acre. Granulación de los párpados con ó sin secreción de lágrimas; tarso muy rojo y engrosado. Es útil en *la blefaritis;* se siente escozor y ardor en los párpados, que están gruesos é inflamados, con lagrimeo acre. Lagrimeo con erupciones de vesiculitas que causan escaldadura de las partes. Para la astenopia muscular no tenemos mejor remedio. Dolores neurálgicos en los ojos, periódicos, con flujo de lágrimas y conjuntiva enrojecida. Neuralgía ciliar, que viene y desapárece con el sol. Estrechez de las vías lacrimales.

Oídos.—Sordera por hinchazón de la cavidad del tímpano, con el estado característico de la lengua. Catarro del tímpano y de la trompa de Eustaquio *(Kali sulph.)*. Ruido como de bramido en los oídos. Secreción purulenta de los mismos. *Chasquidos cuando se mastica.* Comezón y ardor en el oído con punzadas.

Nariz.—Catarro antiguo nasal y faríngeo con *pér-*

dida del olfato y del gusto. El frío es causa de erupciones vesiculares con líquido acuoso, las que revientan y dejan costras ó escaras delgadas; se forman costras en la nariz. Influenza, fiebre de heno, catarro crónico en los pacientes faltos de sangre, el moco tiene un gusto salado. Coriza con secreción clara y acuosa ó alternando con sequedad, *acompañado de falta de olfato y gusto*, la parte posterior de las fosas nasales se siente seca. Epistaxis al inclinarse y al toser. La agravación de los catarros se presenta generalmente en la mañana. Enrojecimiento de la nariz con granos, vesículas y nodulos dolorosos. Un lado de la nariz se siente adormecido. El resfrío comienza con estornudos.

CARA.—Aspecto lívido y plomizo, dolor de la cara acompañado de constipación y con los síntomas característicos de la lengua, ó vómitos de agua clara. Neuralgía periódica después del uso de la quinina, con lagrimeo. Apariencia grasosa de la piel. Sudor mientras se come. Sicosis, caída del bigote con mucha comezón, vesículas acuosas. Erupción, pústulas en la frente.

BOCA.—Ampollas como perlas alrededor de la boca, úlceras húmedas en las comisuras. Aftas con salivación. Ardor y dolor en las grietas de los labios. Relajación de la úvula. Catarro folicular de la faringe. Labios hinchados. Erupción sobre la barba.

LENGUA.—Capa viscosa, clara, acuosa y seromucosa, y cuando está cubierta en los lados con pequeñas burbujas de saliva espumosa. Pérdida del gusto. Ve-

sículas en la punta de la lengua. Aspecto mapeado de la misma. Adormecida, tiesa. Los niños son tardíos para aprender á hablar. Sensación de un cabello sobre la lengua. Excesiva sequedad en ella y en la boca.

DIENTES.—Sensibilidad en los dientes, sangran fácilmente las encías ulceradas. Dolor de muelas con flujo involuntario de lágrimas, salivación. Caída de los dientes. Ránula, inflamación crónica de las glándulas salivares. En la dentición la saliva cae gota á gota. Postemillas con dolores latentes y taladrantes.

GARGANTA.—Cuello enflaquecido. Difteria, si la cara está como inflada y pálida, con somnolencia, deposiciones acuosas, flujo de saliva ó vómitos líquidos de agua. Parálisis post-diftérica cuando parece que el alimento se desliza por una falsa vía y solamente se pueden tragar los líquidos. Garganta dolorida con mucosidad transparente que cubre las amígdalas. Uvula relajada, mal crónico de garganta con sensación de *tapón* ó de *masa pequeña*, y grande sequedad de la *garganta*. Constricción y punzadas en la misma. Faringitis folicular, especialmente en los fumadores y después del tratamiento por el *Nitrato de plata*. Hinchazón de las glándulas cervicales y sub-maxilares, de los labios y amígdalas. Bócio con secreciones acuosas (el principal remedio es *Calc. phos.*). Masticación con salivación y expectoración frecuente de moco, gusto salado. Inflamación y prolongación de la úvula. Aliento fétido.

Síntomas gástricos.—Indigestión con vómito de agua clara y espumosa ó de saliva fibrosa ó acompañada de dolor y salivación. Mal olor del aliento. Dolor de estómago con los síntomas mencionados, pesadez y plenitud. *Pirosis;* el agua sube hasta la garganta, pero sin acidez. Presión y distensión del estómago con antojo de alimentos *salados.* Deseo vehemente por las cosas de un gusto salado ó amargo. *Sed violenta, hambre voraz.* Cardialgía después de comer. Gusto ácido. *Repugnancia para el pan.* Poca inclinación á fumar. Icteria con somnolencia. Sensación de mucha debilidad y hundimiento en el estómago. Manchas rojas en la boca del estómago.

Abdomen y evacuaciones.—Cuando la constipación tiene lugar por la falta de humedad; sequedad de las membranas mucosas con secreciones acuosas; algunas veces hay vómitos también acuosos, ojos lacrimosos, salivación, etc. Dolor en la región del hígado y del bazo. Constipación hemorroidal. Constipación acompañándose con mucha debilidad de los intestinos. Gran entorpecimiento, pero sin dolor. *Excrementos secos* que producen dolor ardiente y fisura en el recto. Punzadas en las hemorroides. Erupción herpética alrededor del ano. *Flujo de sangre, sensación de escozor y laceración después de la defecación, que es dura, difícil y desmenuzada, con punzadas en el recto.* Proctalgia. Dolor en las circunvoluciones abdominales. Diarrea con deposiciones acuosas y espumosas. Diarrea alternando con constipación. Diarrea acuosa escoriante, in-

voluntaria, no sabe distinguir si arroja gases ó materias fecales. Gran debilidad de las vísceras y músculos abdominales.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Poliuria, especialmente si se acompaña con pirosis y mucha extenuación, hematuria por escorbuto, picazón y ardor después de orinar, los cordones espermáticos y los testículos están dolorosos, hinchados é infiltrados; catarro de la vejiga con la secreción característica, orina involuntaria mientras tose, pasea, etc. Gonorrea que produce escaldadura, ó si hay comezón intensa en la gonorrea crónica y el flujo es transparente como agua viscosa; la uretra está muy dolorosa á la presión con dolor incisivo después de orinar. Sífilis crónica, exudación serosa, pérdida del pelo del pubis, emisiones seminales seguidas de calofrío y lasitud con aumento de los deseos sexuales, edema escrotal, impotencia, secreción de licor prostático; dolencia y ardor de la vagina después de la micción, incontinencia de orina, menstruación con secreción sanguinolenta, acuosa y delgada; menstruación retardada con dolor de cabeza, prurito en la vulva; dolor en los testículos, comezón violenta en el escroto, pérdida del pelo del pubis; tristeza desmedida durante el período menstrual, leucorrea acuosa, abundante flujo catamenial con leucorrea viscosa y corrosiva, secreción acuosa y escozor después ó en el intervalo de los períodos, las secreciones son irritantes, escaldan, producen comezón y la caída del vello del pubis; tristeza y melancolía an-

tes de la menstruación, cefalalgia durante y después del período; prolapso uterino, necesita sentarse para impedirlo, gran sequedad de la vagina, clorosis, aspecto manchado de la piel con palpitación del corazón, flujo catamenial retrasado. *Trastornos uterinos aliviados por echarse de espaldas sobre una almohada;* presión y punzada en los órganos genitales por la mañana.

EMBARAZO.—Mal estar por las mañanas con vómito de flemas acuosas y espumosas. Pérdida del cabello durante el puerperio y la lactancia.

SISTEMA RESPIRATORIO.—Inflamación aguda de la tráquea, con flema acuosa, clara, espumosa, estertores flojos, algunas veces se expectora con dificultad. Tos corta y seca día y noche por irritación en la boca del estómago. Bronquitis con tos provocada por cosquilleo detrás del esternón, la tos causa dolor de cabeza como si estallase, micción involuntaria, dolor en el anillo abdominal y en los cordones espermáticos, lagrimeo, palpitación y punzadas en el pecho. Catarro bronquial crónico, "tos de invierno," tos con dolor de cabeza como si ésta se abriese, las lágrimas corren por las mejillas, y hay orina involuntaria. Asma con abundante moco acuoso. Tos convulsiva con los mismos caracteres, inflamación de los pulmones con mucho estertor de flema serosa y espumosa, expectorada con dificultad. Pleuresía cuando ha tenido ya verificativo el exudado seroso. Edema pulmonar con la expectoración característica. Ronquera, dolor, disnea.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Pulso rápido é intermitente, peor acostándose sobre el lado izquierdo, se siente en todo el cuerpo, especialmente en el epigastrio, en los estados de hiperemia y escorbuto. Movimiento agitado del corazón. Sensación de constricción. Palpitación con ansiedad y tristeza en los estados anémicos. Hipertrofia del corazón, necesidad de acostarse frecuentemente, tiene las manos frías y las extremidades adormecidas.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Enflaquecimiento del cuello en los niños. *Dolor de espalda aliviado por acostarse sobre alguna cosa dura*, la espina y las extremidades están muy sensibles. Sensación de frialdad en la espalda. Ataques periódicos de gota. Lasitud y gran debilidad. Reumatismo crónico de las articulaciones; se siente en éstas crujido; reumatismo, dolores gotosos, sacudidas involuntarias de las piernas, movimientos continuos ó sacudimientos durante el sueño. Rigidez é hinchazones artríticas, los maleolos débiles. Dolor en la parte inferior del dorso al levantarse. Ampollas enconadas en los dedos, conteniendo un fluido acuoso. Padrastros, la piel de las manos, especialmente cerca de las uñas, está seca y rajada. Verrugas en las palmas de las manos. Dolor en la cadera; coxalgia, ciática,—contracción dolorosa de los tendones de las corvas; sacudidas involuntarias de las piernas; debilidad en las rodillas y pantorrillas, chasquidos de las articulaciones al moverse; sinovitis—herpes en el pliegue de las rodillas, urticaria alrededor de las articula-

ciones, grietas entre los dedos de los pies. Frecuentemente se quedan dormidas las piernas y los pies, con debilidad de las articulaciones del tobillo.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Sensación de entorpecimiento en las partes afectadas, debilidad parética en varios grupos musculares del tronco y los miembros. La espina está sumamente sensible al tacto ó la presión. Irritación espinal. Inquietud y sacudimiento de los músculos. Dolor paralítico en la extremidad del dorso, parálisis, dolores neurálgicos infra-orbitales, especialmente en los órganos biliares, que vuelven en determinado tiempo, con flujo de lágrimas ó de saliva. Dolor vivo á lo largo de la fibra nerviosa con los síntomas acuosos mencionados. Corea, debilidad histérica, agravada en la mañana. Espasmos histéricos y debilidad. Propensión á resfriarse y fatigarse. Hipo *(Magnes phos.)*.

SUEÑO.—Sueño excesivo si hay síntomas de humedad en el cerebro. La duración natural del sueño no es reparadora y se siente cansancio al despertar, deseo constante y excesivo de dormir, sueña con ladrones en la casa. Durante el sueño, estremecimientos frecuentes; sueño muy inquieto y que se tranquiliza ya tarde. Insomnio con extraordinaria animación general.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Fiebre escarlata con somnolencia, sacudimientos, vómitos de líquido acuoso. Sudores nocturnos abundantes. Es el segundo remedio para la fiebre reumática con calofríos y los síntomas que le son característicos. Fiebre de heno

con secreciones acuosas de los ojos y de la nariz. En el tifo, cuando es muy grande el estupor y adormecimiento. *Fiebre intermitente después del abuso de la quinina, viviendo en regiones húmedas,* ó volviendo á esos lugares. El frío dura desde la mañana hasta el medio día, cerca de las 10 a.m., precedido por calor é intensa comezón con cefalalgia creciente y sed, sudor ácido y debilidad, mucho dolor en la espalda y latidos dolorosos en la cabeza, gran desfallecimiento, extenuación, aspecto lívido y vesículas febriles en los labios. Fiebre tifoidea cuando se acompaña de síntomas malignos, tales como sacudimientos, somnolencia y vómitos acuosos.

PIEL.—Enfermedades crónicas de la piel, erupciones urticarias y miliares, eczema, escamas finas ó erupciones con contenido acuoso; erupciones herpéticas que se presentan en el curso de una enfermedad, ampollas, vejigas y vesículas acuosas sobre la piel. Herpes en el pliegue de las rodillas y codos. Vesículas incoloras y acuosas que forman cortezas ó costras delgadas, las que se caen y se forman otra vez. Intértrigo, dolencia de la piel en los niños con síntomas acuosos. Verrugas en las palmas de las manos. Escamas blancas sobre la piel del cráneo, intértrigo entre los muslos y el escroto, con secreción acre y escoriante. Pénfigo, vejigas llenas de agua. Sarpullido ó hesper zoster con los síntomas característicos. Herpes circinatus, rupia, ampollas, sin contenido pustuloso. Sicosis, si los síntomas acuosos se corresponden, caída del pelo de la bar-

ba, caspa. *Efectos ocasionados por la picadura de insectos.* Urticaria; después de un ejercicio corporal se presenta una violenta comezón, sarpullido en los pliegues de las coyunturas, del que mana una substancia acre.

Comunmente es el segundo remedio para el herpes zoster, eczema por comer mucha cantidad de sal. Fungus hematoides. Aspecto grasoso de la piel. Eczema de las cejas y detrás de las orejas. Verrugas en las palmas de las manos, urticaria en la fiebre intermitente. Padrastros.

TEJIDOS.—Anasarca, acumulación de suero en los tejidos aereolares. Hidropesía ó hinchazón hidrópica, tejidos como inflados. Exudaciones acuosas y secreciones serosas. Estado anémico con sangre acuosa y delgada, discrasia clorótica, clorosis. Anemia debida al abuso de la sal; enflaquecimiento y palidez, con la piel adormecida, flácida y manchada; hidroemia, estado de adinamia, varices. Enfermedades de Basedow y de Addison. La sequedad de las membranas mucosas conduce á un estado de erosión en las mismas. *Extenuación, no obstante la buena vida;* enflaquecimiento, especialmente del cuello. Caquexia por abuso de la quinina en las intermitentes, hinchazón crónica de las glándulas linfáticas y sebáceas. Gota. Obra sobre los cartílagos, los folículos mucosos y las glándulas salivares y mesentéricas. Catarros de todas las superficies mucosas, todas las exudaciones y secreciones son transparentes, viscosas, como almidón cocido.

MODALIDADES.—Agravación periódica, generalmente en la mañana, en la orilla del mar y en la estación del frío. Dolor de la espalda que se alivia acostándose sobre un objeto duro; padecimientos después de orinar, lo mismo que después del abuso del nitrato de plata ó de la quinina.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—Esta droga fué primero experimentada por Hahenemann, como aparece en el vol. IV de las *Enfermedades Crónicas.*

Fué de nuevo examinada por la Sociedad Austriaca de experimentadores; sus efectos patogenésicos recopilados por Hahenemann y los resultados terapéuticos obtenidos con el uso de la 30ª potencia, fueron brillantemente comprobados. Su patogenesia se encuentra completa en las *Enfermedades Crónicas;* sin embargo de estar selectamente reasumida, se le han añadido á las experiencias clínicas que después de aquella publicación se ha podido hallar en la *Guiding Symptoms* de Hering, vol. VII, y en el *Handbook of Materia Medica* de Allen.

Un librito útil é insinuante acerca de *Natrum muriaticum* como un texto de la doctrina de "*Drug Dinamization,*" por el Dr. Jas. C. Burnett, es digno también de mención especial, ha sido publicado por E. Gould & Son de Londres.

ADMINISTRACIÓN —Schüssler recomienda la 6ª potencia. La experiencia general de la escuela homeopática parece estar á favor de las potencias más elevadas; así el Dr. H. C. Allen dice que curará con más presteza empleando una dinamización superior á la

30ª que con las más bajas. Schüssler recomienda también su aplicación externa en enfermedades tales como las picaduras de insectos; asimismo lo emplea en gargarismos ó pulverizaciones en las afecciones catarrales.

RELACIONES.—Compárese con *Kali sulph.* y *Kali mur.* en los catarros de las trompas de Eustaquio y en la membrana del tímpano. En la gastritis y afecciones intestinales con *Natrum sulph.* En la cefalalgia de las jóvenes escolares durante la menstruación, compárese con *Calc. phos.* y *Ferr. phos.* En el dolor de cabeza durante el flujo catamenial, con *Kali sulph.* cuando la metrorragia es el síntoma preponderante. Cuando es escasa la menstruación, conviene *Natr. mur.* En las picaduras de los insectos el que más se le aproxima es *Ledum;* sin embargo, han sido empleados satisfactoriamente *Ferr. phos.* y *Kali phos. Natr. mur.* tiene como un estrecho aliado á *Lycop.*, el que con frecuencia es necesario para suplir su acción. *Natr. mur.* regulariza la exudación húmeda de la ciculación, especialmente cuando tiene lugar en el sistema arterial, mientras que el *Natr. sulph.* está más indicado cuando lo es en el sistema venoso. Los remedios complementarios son: *Apis* y *Arg. nitr. Natr. mur.* precede con frecuencia á *Sepia* y *Sulph.* en las enfermedades crónicas. Para el excesivo uso de la sal en los alimentos se da *Phosph.* En los malos efectos producidos por los baños de mar, conviene *Ars.* Para los resultados desagradables de la cauterización de cualquiera de las super-

ficies mucosas, con el nitrato de plata, es *Natrum* el antídoto. En la sequedad de las membranas mucosas compárese con *Graphites*, *Alumina*, *Bryonia*. En la ránula con *Ambra*.

NATRUM PHOSPHORICUM.

SINÓNIMOS.—Sodium phosphate. Natri phosphas. Phosphas Natricus. Sodæ Phosphas. Sodii Phosphas.

NOMBRE COMÚN.—Phosphato de soda.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula, $Na_2 HPO_4$, 12 H_2O. S_p. gravedad 1.55. Se prepara neutralizando el ácido ortofosfórico con el carbonato de sodio y también se obtiene de la ceniza de los huesos. Cristaliza en prismas monoclínicos, gruesos y transparentes que contienen doce moléculas de agua de cristalización. Tiene un sabor salino, fresco y moderado, es soluble en dos partes de agua caliente y en seis de fría, insoluble en el alcohol; las soluciones son ligeramente alcalinas.

PREPARACIÓN.—El fosfato puro de soda es triturado como se indica en la Clase VII *American Homœopathie Pharmacopœia*. (Guárdese bien tapado con corcho).

DATOS QUÍMICOS FISIOLÓGICOS.—Esta sal se encuentra en la sangre, músculos, nervios y celdillas cerebrales, lo mismo que en los fluidos intercelulares. Por la presencia de esta sal, el ácido láctico es descompuesto en ácido carbónico y agua. Absorbe el

ácido carbónico, tomando dos moléculas de éste por cada una de las de él mismo, y es llevado á los pulmones, donde el oxígeno del aire fija el ácido carbónico libre transformándolo en oxígeno, el que posteriormente es tomado por el hierro contenido en los corpúsculos sanguíneos. El *Natrum phos.* es el remedio para los trastornos ocasionados por el exceso de ácido láctico. Se opone á la condensación de la bilis y del moco con cristalización de colesterina en el conducto de la hiel y de este modo alejará la causa de muchos casos de icteria, cólico hepático, cefalalgias biliosas y asimilación imperfecta de las grasas por la falta de bilis. Es útil en la podagra, gota, lo mismo que en el reumatismo articular, agudo y crónico, siendo así un remedio para la llamada diátesis ácida.

El papel de esta sal en la economía normal, según Moleschott y Schüssler, consiste generalmente en la catalisis del ácido láctico en la sangre, purificando de este modo aquel fluido orgánico de los productos gastados por la función muscular, el cual transforma la glicógena acumulada en el ácido. El HÍGADO es el primero y superior laboratorio del cuerpo animal. Es esencial para la transformación de los nitrógenos y de los hidro-carbonados, para la renoovación y la depuración de la sangre, para la producción de glicógena y azúcar de uva tomada del almidón y de los alimentos sacarinos para la mayor oxidación del ácido úrico, para la conservación de los elementos tejidos gastados, en urea, pronta á ser

eliminada por los riñones, y contribuir por medio de la formación de la bilis al trabajo intestinal. Cuando este órgano cae en estado de inercia no llega á desempeñar de una manera extensiva sus funciones; cuando excede en sobre-actividad, aparece un aumento de producción con efectos sintomáticos. Estas funciones son principalmente debidas á la acción de la célula.

Hay dos clases de células funcionales ó parenquimatosas, á saber: las biliares se extienden como epitelio en las ramas capilares de los canales, en relación íntima con los vasos del hígado y también con las celdillas funcionales que permanecen fijas; las de los acini hepáticos, yacen asimismo en relación íntima con su epitelio glandular por medio de los vasos sanguíneos y los capilares biliares. Este doble trabajo pertenece á las grandes células del acini, es decir, á la formación de la glicógena y á la del ácido úrico; en suma, los glóbulos gastados de la sangre roja quedan en el hígado, pero en el sistema de la vena porta pasan á ser ahora capilares en los acini, para ser finalmente segregados y contribuir á la nueva formación de los glóbulos perfectos. Separadas y variadas como son todas estas funciones, indudablemente se ayudan unas á otras, suministrando necesariamente los cambios químicos, etc. Se cree que la glicógena es llevada principalmente á la corriente sanguínea para ser acumulada en el tejido muscular, proveyendo de este modo á la energía motriz y dividiéndose químicamen-

te en dos partes de ácido láctico. Este ácido ayuda más tarde á las funciones vitales del cuerpo, y es al fin transformado en ácido carbónico y agua, mientras circula en la sangre. Esta transformación tiene lugar por la presencia de la sangre del fosfato de soda—*Natr. phos.*—y por una acción catalítica de esta sal. Cualquiera deficiencia que impida este cambio químico es causa de que el ácido láctico quede como tal; predomina entonces un estado ácido del sistema, sucediéndose el reumatismo, la dispepsia, los trastornos intestinales, etc. Según Schüssler, por la administración de dosis moleculares de esta droga la acción catalítica se restablece de una vez, cesa el estado ácido y desaparecen el reumatismo y los otros síntomas que eran su consecuencia. (J. C. Morgan. M. D.)

El Acido Urico se mantiene soluble en la sangre por la presencia del Fosfato de Soda y la temperatura natural de la misma sangre. Siempre que hay una dificiencia de esta sal, el Acido Urico se combina con la Soda, formando el Urato de Soda, una sal insoluble que se deposita cerca de los lugares en que se producen la gota y el reumatismo agudo inflamatorio. Durante un ataque agudo de gota, hallamos que la excreción de Acido Urico está disminuida en proporción á la cantidad del depósito de Urato de Soda que rodea los puntos enfermos.

El *Natrum phosph.* sirve para emulsionar los ácidos grasosos; por esta razón, es un remedio para todos los estados dispépticos que la grasa deja como hue-

lla, ó en los que se han agravado por su uso. Por otra parte, combinándose el fosfato de soda con estos ácidos, se apodera de las moléculas de albúmina, las que obran bio-químicamente á semejanza de un ácido.

Los corpúsculos blancos de la sangre, leucocitos ó corpúsculos linfáticos, contienen moléculas de grasa y peptonas, las que por último son albuminoides modificados, que desde las paredes intestinales van á la sangre y de allí á los tejidos. Esto se hace en virtud de su movimiento de actividad. Desde las paredes de la región intestinal, el paso de los leucocitos, cargados ahora con peptonas, sigue una vía directa mientras aquellos que conducen las moléculas de GRASA llegan á su término de un modo indirecto, especialmente por el conducto toráxico, llegando finalmente á los tejidos por las paredes de los capilares. Aquí son nuevamente transformadas las peptonas en albuminoides, se depositan y llegan á ser material para el crecimiento de las celdillas jóvenes que son formadas por división.

Si es detenida en su curso la corriente de los leucocitos que conducen las moléculas de grasa á través de las glándulas linfáticas en la piel, los huesos ó los pulmones, tienen lugar las hinchazones é inflamaciones glandulares y flegmonosas, como asimismo los estados tuberculosos de estos órganos y tejidos. Puesto que estos leucocitos detenidos ó estancados contienen albúmina y grasa, su degeneración grasosa se hace posible. En tanto que esto no

tenga realmente verificativo, el Natrum phosph. posee el poder de dejar libre paso á los leucocitos, y de este modo vuelven de nuevo á estar hábiles para continuar sus funciones específicas. Esto se lleva á cabo por sus dos propiedades, la de emulsionar las grasas, aunque se presente un vestigio de ácido craso, y su poder para recoger las moléculas peptónicas.

Acción general.—En las enfermedades que sufren los niños por exceso de ácido láctico, resultado debido á la abundante alimentación de leche y azúcar. Padecimientos en los que se presenta un exceso de acidez. *Capa húmeda y delgada sobre la lengua. La parte blanda del paladar también tiene un aspecto de crema amarillosa. Eructos y vómitos agrios, diarrea verdosa*, dolores, espasmos y fiebre acompañada de síntomas ácidos, etc. Obra también sobre los huesos y las glándulas, en los pulmones y los órganos abdominales. El conocimiento de su esfera de acción ha sido muy amplificada por Schüssler el año pasado.

Las pequeñas dosis de Natrum phos. en inyecciones subcutáneas han sido empleadas como antídoto al deseo de la morfina, y de este modo se ha logrado extirpar esa costumbre.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

Síntomas mentales.—Ansioso y aprehensivo. Temor como si alguna cosa aconteciera. Triste y con

falta de ambición. Al despertar por la noche, se imagina que son personas los muebles, que oye pasos en el cuarto inmediato. Nervioso, irritable, se enfada por bagatelas.

Cabeza y cuero cabelludo.—Dolor de cabeza en la coronilla; se despierta por la mañana con apariencia cremosa en la parte posterior del paladar, lengua húmeda y amarilla. Dolor intenso en la cabeza, frontal ú occipital, como si el cráneo estuviese demasiado lleno, con náusea ó algún vómito viscoso. Presión y calor intensos en el vértice, como si la cabeza se abriese. Vahidos, vértigo con desarreglos gástricos. Cefalalgia con vómitos, expulsión de espuma agria.

Ojos.—Los ojos secretan una materia cremosa ó de un color amarillo brillante. Oftalmía con conjuntivitis, secreción de materia cremosa y amarilla, aglutinación de los parpados en la mañana. Hipopión. Lagrimeo ardiente. Se ven chispas delante de los ojos. Estrabismo, que proviene de la irritación intestinal causada por lombrices. Conjuntivitis granular, cuando las granulaciones tienen un aspecto como de pequeñas ampollas. Oftalmía escrofulosa, dolor sobre los ojos. Opacidad de la vista como si un velo fuese interpuesto ante los ojos.

Oídos.—Dolor del oído exteriormente con ardor y comezón. Una oreja está caliente y roja, con frecuente picazón y acompañado el padecimiento de acidez y desarreglos gástricos.

Nariz.—Picazón en la nariz asociada con síntomas de acidez del estómago y vermes intestinales.

Dolor agudo que repite de cuando en cuando en la parte posterior de las fosas nasales. Mal olor de la nariz y comezón.

CARA.—Cara roja y pustulosa; sin embargo de no existir un estado febril, se conserva blanca cerca de la nariz ó de la boca, síntomas de acidez, etc. Neuralgía facial, dolor lancinante y punzante. Dolencia en el lado derecho del maxilar inferior. Palidez ó cianosis, apariencia floreciente de la cara, eructos ácidos, etc.

BOCA.—*Capa cremosa y amarilla en la parte posterior del paladar.* Gusto ácido ó como de cobre.

LENGUA.—El gran característico de este remedio es la cubierta *húmeda, cremosa ó amarillo-brillante de la parte posterior de la lengua.* Ampollas y sensación de cabellos en la punta de la lengua. Dificultad para hablar.

DIENTES.—Rechinido de dientes en los niños durante el sueño.

GARGANTA.—La misma humedad; la capa cremosa ó amarillo-brillante que se encuentra en la base de la lengua, también se halla sobre la parte blanda del paladar; amígdalas y úvula. La inflamación de cualquiera parte de la garganta que se acompaña con estos síntomas, exige *Natr. phos.* También va acompañada con un estado ácido del estómago. Garganta diftérica, llamada así impropiamente. Sensación de una masa pequeña en la garganta, que empeora con la deglución de tragar los líquidos. Escurrimiento de mucus espeso y amarillo de la

parte posterior de las fosas nasales, que aumenta por la noche. Catarro naso-faríngeo.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—Acidez; agrio que sube del estómago debido á un exceso de ácido láctico. Erosiones y ulceraciones gástricas; dolor en un lugar fijo después de tomar alimento. Vómito de líquidos ácidos ó de una substancia obscura como asientos de café, agrios del estómago, pérdida del apetito. Dispepsia con los eructos y el aspecto de la lengua característicos, sabor agrio en la boca. Algunas veces el dolor se presenta dos horas después de haber comido. Náusea y vómito de líquidos ácidos y masas coaguladas (no de alimentos). Pirosis con acidez. Flatulencia con agrios del estómago. Cólico en los niños con síntomas de acidez, tales como deposiciones verdes, de olor agrio, vómitos de leche coagulada, etc. Dolor de estómago por la presencia de lombrices. Vacuidad y desfallecimiento en el estómago, con sensación de peso encima del cartílago ensiforme, asimilación imperfecta de las grasas por falta de bilis.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES.—Constipación habitual y á veces ataques de diarrea en los niños. Esclerosis del hígado. Obra sobre los órganos glandulares del trayecto intestinal. Diarrea causada por el exceso de acidez, las deposiciones tienen un olor agrio, verde, en masas de mucus como gelatina, dolorosas, con retortijón, de caseína coagulada, escasas y frecuentes. Esfuerzo violento, dificultad para detener la evacuación, dolor al través de la ingle dere-

cha, lombrices intestinales, largas ó filiformes, con los síntomas característicos de acidez ó picazón de la nariz, en ocasiones se presenta estrabismo, dolor en los intestinos, sueño inquieto, etc. Comezón en el ano por los vermes, especialmente en la noche y por el calor de la cama (inyecciones del mismo remedio). Evacuaciones blancas ó verdes, con diarrea y algunas veces icteria debida á deficiencia de bilis. Cólico flatulento. Obstinada constipación. Ulceración del ano con dolor y comezón.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Diabetes de forma hepática. Urgencia constante para orinar, micción intermitente, necesidad exagerada. Incontinencia de orina con acidez en los niños; orina roja-obscura con artritis. Micción frecuente. Atonía de la vejiga. Emisiones seminales sin ensueños eróticos. Semen acuoso y delgado. Deseo sexual extinguido ó aumentado con erecciones. Tirantez en los testículos y cordones espermáticos. Menstruación demasiado anticipada, descolorida; cefalalgia supra-orbitaria después de medio día, agravada al cesar el período, con sensación en las rodillas, como si estuviesen encogidas las cuerdas. Debilidad y molestia en la región uterina, prolapso con debilidad y pérdida de las fuerzas después de la defecación. Dislocación uterina con dolores reumáticos. Esterilidad con secreciones ácidas de la vagina. Leucorrea, secreción cremosa ó del color de la miel, ácida y acuosa. Olor agrio de las secreciones del útero. Excitación con falta de sueño antes del período.

EMBARAZO.—Indisposición por la mañana con vómito de masas ó líquidos agrios.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.—Es un remedio útil como intercurrente en los trastornos catarrales que se presentan con acidez. Tisis florida en las personas jóvenes, con tendencia hereditaria á suspirar, especialmente durante la menstruación. Consunción. Dolencia de los músculos intercostales y de la parte inferior del esternón. Dolor en el pecho, aumentado por la presión y por la inspiración profunda.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Temblor en la región del corazón. Los dolores de la base del corazón son aliviados por los que afectan los miembros y el dedo gordo del pie. Palpitación, el pulso se siente en diferentes partes del cuerpo. Sensación como si un proyectil fuera rodando á través de las arterias.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Tortícolis. Hinchazón de las glándulas del cuello. Bocio, sensación de debilidad en la espalda y miembros, flaquean las piernas al andar, paso vacilante. Anemia espinal, debilidad paralítica de las extremidades inferiores; encogimiento de la parte interior de los muslos, dolencia en los tendones de la corva, dolor en las rodillas, maleolos y espinillas, en la parte cóncava del pie y en los juanetes. Crepitación sinovial. Cansancio de los brazos, contracción de los músculos extensores de la parte posterior del brazo, dolor en las muñecas ó puños, calambre doloroso en las manos cuando se escribe, sensación de dolencia en las coyunturas. Artritis reumática, especialmente en las

articulaciones de los dedos, los dolores van repentinamente al corazón.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Irritación de los intestinos por efecto de lombrices, algunas veces se presenta estrabismo y sacudidas en los músculos faciales; nerviosidad, sensación de cansancio con desfallecimiento de estómago, tortícolis, temblor y palpitación. Pesadez como si existiese parálisis, postración.

SUEÑO.—Sueño inquieto por trastornos ocasionados por las lombrices, mucha soñolencia, se queda dormido mientras está sentado; falta de sueño por picazón; despierta con facilidad; ensueños sexuales.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Fiebre intermitente con vómito de masas ácidas y agrias, estado de acidez. La transpiración tiene un olor sumamente agrio. Los pies fríos como el hielo durante el día, ardorosos por la noche. Bocanadas de calor y dolor de cabeza siempre después del medio día.

PIEL.—Acaloramiento de la piel. Eczema con síntomas de acidez, secreción cremosa color de miel. Eritema, "roseola," costras de un amarillo-brillante. Secreciones amarillas, semejantes á la miel, y que causan molestia dolorosa en la piel. Crusta láctea. Viruelas locas, *comezón sobre todo el cuerpo*, como picaduras de insectos. Mucha comezón en las articulaciones del tobillo con erupción eczematosa.

TEJIDOS.—Exudaciones y secreciones amarillas, como de color de miel. Leucoemia. Hinchazón de las glándulas linfáticas antes de su endurecimiento. Marasmo de los niños. En las enfermedades de los

huesos favorece el depósito de fosfato de cal. Escrófula, su acción específica sobre las glándulas tiende á disolver la formación de productos morbosos. Leucosicosis. Artritis reumática.

MODALIDADES.—Algunos de los dolores de este remedio fueron agravados durante una temporada; muchos síntomas tienen agravación después del medio día y al anochecer durante la menstruación.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—Experimentada bajo la inspección del Dr. E. A. Farrington. La historia de la experimentación se encuentra en la Encyclopedia de Allen, vol. X, publicada primero en el Hahnemannian Monthly, vol. XII. Una excelente sintomatología de la droga se encuentra en el Handbook de Allen y en la Guiding Symptoms de Hering, vol. VIII.

ADMINISTRACIÓN.—Schüssler recomienda la 6 x, ya sea en trituración ó en dilución.

Puede también usarse como inyección en los trastornos causados por las lombrices; el Dr. Morgan prefiere dosis no frecuentes de la 30ª potencia. Las altas y muy elevadas potencias han sido también empleadas con éxito satisfactorio.

RELACIONES.—Como remedio para la escrofulosis con los síntomas "ácidos," compárese con *Calc. carb.* En el padecimiento de la gastritis catarral es comparado con *Calc.*, *Kali carb.*, *Nux.*, *Coccul.*, *Carbo*, *Carbol. ac.* Como un agente curativo en los niños, para quienes *Natr. phos.* es el remedio prominente, en los que son frecuentes estos estados ácidos

del estómago é intestinos, compárese con *Rheum*, en el que todo el cuerpo tiene un olor agrio, pero con especialidad la evacuación del enfermito. Es interesante notar la asociación peculiar de los síntomas gástricos de *Natr. phos.*, tan frecuentemente verificados en la clínica, y los síntomas de la gota desarrollada en los experimentadores. Recordando la dispepsia gotosa peculiar, tenemos en *Natr. phos.* uno de los más útiles remedios. Compárese aquí con *Colchic.*, *Benz. ac.*, *Guaiac.*, *Lycop.* y *Sulphur*. En la comezón, sobre todo, compárese con *Dolichos*, *Urtica*, *Sulphur*, etc.

NATRUM SULPHURICUM.

SINÓNIMOS.—Sodium Sulphate. Sodæ Sulphas. Sodii Sulphas.

NOMBRE COMÚN.—Sal de Glauber. Sulfato de Soda.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula $Na_2 SO_4$, 10 H_2O. Se encuentra con abundancia en la naturaleza; en el agua del mar, en los manantiales salinos, en los lagos salados de Rusia, etc.

Se prepara por la acción del ácido sulfúrico sobre la sal común y se purifica por la recristalización. Forma prismas rómbicos de seis lados, grandes, incoloros, transparentes y oblicuos, teniendo un gusto refrigerante, amargo y salino. Se disuelve en el aire caliente á los 30° C. Se liquida en su propia agua de cristalización, liquidándose también libremente á los 33° C; siendo esa temperatura más ó menos baja, la solubilidad disminuye.

PREPARACIÓN.—El Sulfato puro de sodium es triturado como se indica en la Clase VII. *American Homeopathic Pharmacopœia.*

DATOS QUÍMICO-FISIOLÓGICOS —El ácido Sulfúrico, formado por la oxidación de los albuminoides, destruiría los tejidos si no estuviesen unidos en su estado naciente con carbonatos, por lo cual queda libre el ácido carbónico. Esta sal no aparece en las celdillas, solamente se encuentra en los fluidos intercelulares. Ayuda y regulariza la excreción del agua superflua, v. g., la que es producida por la descomposición del ácido Láctico con el fosfato de Sodium, edemas, etc. El desorden del movimiento molecular de esta sal impide la eliminación del agua de los tejidos, tal como la que es producida por la oxidación de las substancias orgánicas.

La acción de *Natrum sulph.* es opuesta á la de *Natrum mur.*; una y otra tienen la propiedad de atraer el agua, pero de distintos modos. *Natrum mur.* atrae el agua que ha sido usada en el organismo, en tanto que *Natrum sulph.* atrae el agua debido á la metamorfosis retrógrada y asegura su eliminación del organismo.

El *Natrum mur.* verifica la división de las celdillas con el objeto de aumentarlas; el *Natrum sulph.* separa el agua de los leucocitos gastados, y completa de este modo su desintegración, por esto es el remedio para la leucoemia. Irrita las celdillas epiteliales y los nervios, como podrá verse por los hechos siguientes: en consecuencia de la actividad de

las celdillas epiteliales que revisten los tubos uríníferos, producida por el *Natrum sulph.*, el agua sobrante mantiene en solución ó suspensión los productos de metamorfosis enviados á los riñones. Estos abandonan el organismo por la vía de los uréteres y la vejiga con la orina.

El *Natrum sulph.*, por la estimulación de las celdillas epiteliales de los conductos de la bilis, del páncreas y del canal intestinal, lleva á cabo la secreción normal de estos órganos. También tiene la facultad para estimular los nervios de estas partes.

Si los nervios del sensorio de la vejiga no son estimulados por *Natrum sulph.*, la sensación de orinar no es consciente y resulta la micción involuntaria—enuresis.—Si los nervios motores del depresor no son irritados, resulta la supresión de la orina.

Como consecuencia de una acción irregular de *Natrum sulph.* sobre los nervios encargados de suministrar la hiel al aparato biliar, tenemos aumento ó diminución de esa secreción.

Si una diabetes melitus es causada por un secreción escasa del fluido pancreático, *Natrum sulph.* puede ser el remedio necesario.

Si los nervios motores del colon no son influenciados suficientemente por la acción de *Natrum sulph.* resulta la constipación y el cólico flatulento.

Si á consecuencia de un trastorno del movimiento molecular de *Natrum sulph.*, se hace tardía la eliminación del agua superflua contenida en los espacios intercelulares, resulta la hidroemia.

La hidroemia y los desórdenes funcionales en el aparato secretor de la hiel son las condiciones que se requieren para el desarrollo de las siguientes enfermedades:

Fiebres intermitentes y biliosas, influenza, vómito de bilis, diarrea biliosa, edema, erisipelas edematosas, erupciones vesiculares llenas de suero amarillo; eczema húmedo, herpes, vegetaciones sicóticas, catarros con secreciones verdes ó verde-amarillosas.

Las personas que sufren de hidroemia se sienten peor en la estación húmeda, cerca del agua, en el encierro, en las habitaciones húmedas, en los sótanos, etc., y se mejoran bajo las condiciones opuestas.

Acción general.—Como otros sulfatos alcalinos es un activo catártico. Además, presenta una homogeneidad marcada para la diátesis única en general y es ciertamente un precioso remedio para combatir las numerosas fases de esa polimorfa enfermedad. (T. F. Allen). Los estados gástrico-biliosos, la acumulación de agua en los tejidos aereolares, las secreciones amarillas y acuosas sobre la piel, ó las escamas amarillosas que forman una erupción de vesículas, son indicaciones de este remedio, como también lo son: la excesiva secreción de la bilis, las afecciones del hígado, el mal de piedra, la presencia de arena en la orina, la diabetes, la gota, etc. Su indicación característica es una *capa sucia gris-verdosa ó moreno-verdosa, sobre la raíz de la lengua y la agravación por acostarse sobre el lado izquierdo. Natrum sulph.* participa, en cierto modo, de los maravi-

llosos efectos de *Natr. mur.* y de *Sulphur* en los climas occidentales como un agente activo de la malaria. Sus enfermedades son aquellas que se originan por vivir en casas húmedas, cuartos bajos y sótanos, y son peores con el tiempo húmedo correspondiente á la constitución hidrogenoide y á la discrasia sicótica, condiciones cuyo resultado constituye en los niños los catarros del pecho y los padecimientos asmáticos. (Kent). Las alteraciones morbosas causadas por *Natr. Sulph.* comienzan á ser notables cerca de la extremidad del ileum y en la parte más baja del colon; en éste aparecen los folículos hinchados, con un rojo brillante en la orilla de los capilares; la membrana mucosa comprendida entre ellos es, ó bien pálida, ó muestra una insignificante inyección dentrítica; en la parte inferior del ileum la membrana mucosa muestra una saturación de un colorido rojo brillante, uniforme ordinariamente. Es el principal ingrediente en el agua de Carlsbad, tan ampliamente usada por su acción sobre el hígado; también lo contienen los manantiales fríos de la Isla de Wight, los de Püllna, Marienbad y Franzensbad.

El Sulfato de Sodium como un Hemostático.—Reverdin, en una memoria leída ante la Asociación Quirúrgica Francesa, sostiene el empleo del sulfato de sodium como un hemostático. Lo ha empleado una multitud de veces con felicidad; usándolo en pequeñas dosis (10 centigramos—$1^1/_2$ gr.) cada hora, en las hemorragias capilares peligrosas, ya sean

de origen espontáneo ó traumático. Cita un ejemplo: hemorragia seguida después de la separación de un tumor benigno subcutáneo, la que resistió toda clase de tratamiento por ocho semanas.

Tan verídico como éste hay otros casos de origen traumático, y también de menorragia.

Este remedio fué usado por Kussmaul, y es popular evidentemente en el Norte de Alemania en los casos de hemofilia.

Por medio de la observación clínica y experimental, el autor establece que esta droga solamente se administra por la boca, pues es incapaz de producir el efecto deseado cuando se usa en inyecciones subcutáneas.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Tendencia al suicidio, *tiene necesidad de reprimirse;* este síntoma se acompaña de un estado huraño é irritable; irritabilidad debida al estado bilioso; delirio. La música, especialmente los aires melancólicos, agravan los síntomas; son peores en la mañana. Desaliento. *Trastornos mentales ocasionados por una caída ú otros traumatismos de la cabeza.*

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Dolor de cabeza violento y pulsativo, se siente peor sobre el vértice; vértigo, desvanecimientos por desarreglos gástricos ó exceso de bilis con capa biliosa sobre la lengua, ó sabor amargo en la boca. Cefalalgia con náuseas y

diarrea biliosa ó vómito de bilis, sabor amargo, dolor cólico; dolor de cabeza con vahidos; cefalalgia occipital; malos resultados de las caídas y traumatismos en la cabeza, y *trastornos mentales que se ocasionan de aquellos*; congestión de sangre á la cabeza; dolores violentos en la base del cerebro como si apretasen con un torno ó alguna cosa royera ese lugar; delirio. Ardor en el vértice. El cerebro se siente como suelto. Sensibilidad de los tegumentos del cráneo; el cabello está doloroso al peinarlo.

Ojos.—Amarillez de la conjuntiva. Granulaciones abultadas como ampollas acompañadas de ardiente lagrimeo; ardor en los bordes de los párpados. Conjuntivitis crónica con granulación de los párpados, pus verde, terrible fotofobia. Aglutinación de los párpados en la mañana acompañada de fotofobia. Manchas en la córnea.

Oídos.—Dolor en el oído como si alguna cosa quisiera salir, peor con el tiempo húmedo. Sonidos como de campanas. Dolor punzante como relámpago de parte á parte de los oídos.

Nariz.—Epistaxis durante la menstruación. Ozena sifilítico, peor cuando cambia la estación seca á la húmeda. Obstrucción de la nariz. Grande sequedad y ardor, comezón de las alas de la nariz; el pus se pone verde por la exposición á la luz. Catarro nasal; el moco que se expectora es salado.

Cara.—Color amarillo ó ictérico con estado bilioso, dolor en el hueso cigomático, granos y vesículas en la cara.

Boca.—Sabor amargo, boca llena de una substancia viscosa, *blanca, espesa y tenaz*, necesita gargajear constantemente para limpiar el esófago, tráquea y estómago. "Lo que sale del estómago por la expectoración es siempre turbio y pegajoso." Ardor en la boca. Mal gusto, siempre está llena de una substancia viscosa. La parte interior y superior de la boca está dolorosa al tacto y muy sensible el paladar; se siente alivio tomando cosas frías. Erupciones vesiculosas al derredor de la boca y en la barba.

Lengua.—Capa sucia verde-morena ó verde-pardusca. Paladar muy sensible, con mejoría tomando cosas frías. Sabor amargo, lengua pegajosa. Vejigas ardientes en la punta; lengua roja.

Dientes.—Dolor de muelas que se mejora con fumar y con el aire frío, también manteniendo un buche de agua fría en la boca *(Coffea)*. Vejigas y ardor en las encías.

Garganta.—En la difteria como intercurrente cuando se presentan vómitos verdes. Garganta dolorida; sensación de una masa pequeña al tragar; garganta seca. Ulceración dolorosa, catarro faríngeo, profusión de moco blanco, espeso y tenaz; gargajeo de moco salado en la mañana.

Síntomas gástricos.—Sed al anochecer. El estómago se siente distendido y pesado; náusea constante. Vómito de bilis con gusto agrio y amargo, vértigos y dolor de cabeza. Vómito de agua verdosa y salada. Estado bilioso, exceso de bilis, vómito de

líquidos amargos, lengua moreno-verdosa ó pardo-verdosa. Cólico bilioso con los síntomas indicados y evacuaciones obscuras. Icteria ocasionada por disgustos. Deposiciones verdes, piel cetrina, escleróticas amarillas. Cólico de plomo (se da en dosis frecuentes y bajas, 1 x, 2 x). Líquido agrio que sube del estómago, cardialgía y flatulencia. Cólico ventoso, peor en la Silíaca; agravación antes del almuerzo, cuando el estómago está desocupado. Dolores agudos é incisivos en la región del hígado. Hígado congestionado, *peor acostándose sobre el lado izquierdo.* Dolor en la región del hipocondrio izquierdo acompañado con frecuencia de una tos con expectoración purulenta. El estómago se siente distendido.

Abdomen y deposiciones.—Mucha flatulencia con dolores incisivos en el abdomen y congestión del hígado; no puede tener las ropas apretadas en la cintura. Timpanitis en las fiebres biliosas. *Cólico flatulento*, frecuentemente comienza en la región derecha inguinal y se extiende á todo el abdomen. Calor en la porción inferior dé los intestinos con secreciones biliosas verdes. Diarrea, deposiciones obscuras, biliosas ó de bilis verde. Tendencia hereditaria á la soltura intestinal en las mujeres ancianas. Comezón en el ano. Irritabilidad en el hígado, algunas veces después del estudio excesivo ó de un trabajo intelectual. Sensibilidad dolorosa del hígado al tacto, al choque, con dolores punzantes y agudos. Tiflitis. Evacuaciones sueltas en la mañana, particularmente después de un cambio al tiempo húmedo.

Erupciones verrugosas en el ano y entre los muslos, sicosis.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Orina cargada de bilis. Remedio principal en la diabetes. Nefritis crónica, secreción uretral verde-amarillosa. Depósitos líticos en la orina; orina con sedimentos latericios, frecuentemente asociado este estado con lá gota. Ardor durante la micción; gravela, sedimento arenoso en la orina. Poliuria simple, excesiva secreción urinaria, especialmente si existe diabetes; edema prepucial y del escroto, aumento de volumen de la próstata; pus y moco en la orina. Condilomas, excrecencias blandas y carnosas, de origen sifilítico, con secreción verdosa. Comezón en los órganos genitales. Gonorrea crónica. *Gonorrea y sicosis.* Gonorrea suprimida; inflamación de los órganos genitales femeninos, que están hinchados y cubiertos de vesículas, epistaxis antes del período menstrual. La menstruación es profusa, acre y corrosiva, con cólico y constipación, ó diarrea matinal y calofrío. Leucorrea acre, corrosiva; las partes están inflamadas.

EMBARAZO.—Vómitos del embarazo que tienen un sabor amargo. Flegmasía alba dolens. Vulvitis herpética.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.—Garraspera. *Asma*, cada vez que cambia el tiempo en húmedo. *Asma húmeda*, estertor mucoso. Asma desarrollada por catarro general de los bronquios. Sensación de desfallecimiento en el pecho. Tos con expectoración purulenta, espesa, glutinosa y verdosa; dolencia de

pecho, la que se mejora con la presión, por consiguiente el enfermo se oprime el pecho mientras tose. Dolores penetrantes, especialmente en el lado izquierdo del tórax, dispnea durante el tiempo húmedo. Catarro bronquial, la tos es peor en la mañana temprano. (*Kali carb.*)

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Presión y ansiedad en la región del corazón; necesita estar en el aire libre para sentir alivio.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Dolor como de magullamiento en la parte inferior de la espalda y en el sacro. Dolencia á lo largo de la espina y cuello. Es un remedio muy importante en la meningitis espinal con contractura del cuello hacia atrás y espasmos en la espalda. Hinchazón y supuración de las glándulas axilares. Panaricium. Dolor punzante en el lado izquierdo de la cadera, temblor de las manos, flojedad y edema de los pies. Inflamación flegmonosa de los dedos, inflamación y supuración alrededor de la raíz de la uña, dolor ulcerativo y latente debajo de las uñas, comezón de los dedos de los pies; ciática cuando se levanta al estar sentado ó al volverse en la cama, no se alivia en ninguna postura. Dolores de las caderas á las rodillas. Dolores reumáticos en los miembros si corresponden los síntomas gástricos. Crujido de las articulaciones. Ataxia locomotriz. Podagra, gota en los pies, casos agudos y crónicos; ardor en las plantas de los pies, extendiéndose á las rodillas. Artritis.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Postración; sensación de fa-

tiga y cansancio, especialmente cerca de las rodillas; deseo de moverse. Agotamiento con cólico. Corea con evacuaciones retardadas. Temblor de todo el cuerpo, sacudimiento de las manos y de los pies durante el sueño, las manos tiemblan al escribir.

SUEÑO.—Somnolencia que frecuentemente es precursora de la icteria, con síntomas biliosos que empeoran en la mañana y cuando se entrega á la lectura. Pesadez, ensueños ansiosos, despierta en la noche con un ataque de ásma. Mucho desvarío; poco después se queda dormido, estremeciéndose como asustado; despierta por dolores flatulentos.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Fiebre intermitente en todos sus períodos, vómitos biliosos. Fiebre remitente biliosa, fiebre amarilla, tomando la forma de fiebre biliosa remitente intensa; vómito de color amarillo-verdoso, moreno ó negro. Frialdad interna. Calofrío con frialdad como de hielo al anochecer. Sensación de calor en la coronilla. Sudor sin sed. "Dolencia en la región hepática, gases que mudan de lugar y tendencia á la diarrea." (J. W. Ward, M. D.)

PIEL.—Tendencia á la formación de verrugas alrededor de los ojos, cuero cabelludo, cara, pecho, ano, etc. Piel escaldada en los niños con síntomas biliosos. Eczema. Vesículas, erupciones con materia amarilla y secreción acuosa. Dedos de las manos hinchados y tiesos; la piel de las palmas de las manos desollada y dolorida, con exudado de un fluido acuoso. Erisipela lisa, roja, lustrosa, latidos ó hinchazón dolorosa de la piel. Pénfigo, ampollas ó ve-

sículas acuosas sobre el cuerpo, granos, conteniendo una secreción amarilla y acuosa. Después de la ruptura de vesículas ó ampollas, quedan sobre la piel escamas amarillas. Afecciones húmedas de la piel que se acompañan con síntomas biliosos. Inflamaciones edematosas de la piel. Color ictérico de la misma, comezón al desnudarse; excrecencias sicóticas; abscesos fistulosos de algunos años de duración, secretando pus acuoso, llenos de agujeros circundados por una línea ancha y azulada.

TEJIDOS.—Regulariza la capacidad acuosa del sistema venoso. Edema, hinchazón lisa. Infiltración. Hidropesía simple que invade los tejidos areolares del cuerpo. Las secreciones son amarillas, acuosas, etc. Sicosis y Leucoemia. *Constitución hidrogenoide.* Consunción. Piemia. Ciática.

MODALIDADES.—Siempre se siente peor en la humedad, con el tiempo húmedo; mejoría con el calor y el tiempo seco, lo mismo que al aire libre. Síntomas como los que se ocasionan por vivir en casas húmedas, cuartos bajos y sótanos, peores por el uso del agua en cualquiera forma. Padecimientos por comer plantas que crecen cerca del agua, pescados, etc. Los dolores hacen cambiar frecuentemente de posición. (*Rhus*). *Agravación general por acostarse sobre el lado izquierdo.*

DATOS HOMEOPÁTICOS.—Fué experimentada primero por Schretter en 1832 y por Neuning. El mejor arreglo de sus síntomas aparece en la *Materia Médica* de Hering, trasladado con algunas adiciones

á la *Encyclopedia de Allen;* pero la gloria de haber aumentado nuestra concepción filosófica y aplicación terapéutica de esta droga, pertenece á Grauvogl, quien puso de manifiesto la relación de ella con la constitución llamada hidrogenoide y para los efectos crónicos de la infección gonorréica. Sus observaciones han sido repetidamente justificadas.

ADMINISTRACIÓN.—Para el cólico de plomo dosis bajas frecuentes 1 x ó 2 x. Schüssler recomienda la 6 x trituración. Grauvogl usa principalmente la 2 x á la 6 x potencia, mientras que la 30ª y la 200ª han sido usadas por Hering y algunos otros.

RELACIONES.—*Natr sulph.* tiene muchos síntomas comunes con los *Natrums* y con *Sulphur.* Para los síntomas de los ojos compárese con *Graphit*, el que también tine la excesiva agravación por la luz en las afecciones crónicas de los ojos. En la tos *Bryon* corresponde á *Natr. sulph.* para la sensación de desfallecimiento, dolencia y necesidad de oprimirse el pecho, y el alivio consiguiente á la presión; pero *Natr. sulph.* tiene mucha más expectoración muco-purulenta, espesa, glutinosa y verde-amarillosa, por esto obra mejor en los últimos períodos, mientras que *Bryon* tiene acción en los primeros, cuando la tos es más irritable, con mucha dolencia, constricción, ardor y sensación lacerante en el pecho. En el asma compárese también *Silicea* como un remedio radical; en la gonorrea, *Natr. sulph.* compite con *Thuja* y con *Mercur.;* es indolente con *Natr sulph.*, y la secreción conserva el aspecto espe-

so y verde-amarillento. Es complementario á *Thuja* para las afecciones constitucionales de la sicosis profundamente localizada, ó en las que el estado de la sicosis está implantado sobre una base hidrogenoide. En la poliuria, *Ferrum. phosph.* y *Phosph. acid.*, lo preceden. Compárese con *Stillingia* en la enfermedad de la cadera.

SILICEA.

SINÓNIMOS.—Silicea. Silicea Tera. Silex. Guijarro blanco decarbonizado. Acidum Silicicum. El nombre propio es Oxido Silícico.

NOMBRE COMÚN.—Pedernal puro ó cuarzo. Tierra de sílice.

PROPIEDADES QUÍMICAS.—Fórmula SiO_2. Se prepara fundiendo la sílice y el carbonato de sodium; disolviendo el residuo filtrado y precipitado por el ácido hidroclórico, resulta un polvo blanco que no tiene olor ni sabor.

PREPARACIÓN.—La *Silicea* pura se tritura conforme á la clase VII. *American Homeopathie Pharmacopœia.* El Dr. P. Wilde usa preferentemente el silicato de soda conocido por «vidrio líquido,» el cual es francamente soluble en el agua. (Véase «administración.»)

DATOS QUÍMICO-FISIOLÓGICOS.—Aun cuando esta sal inorgánica se encuentra con mucha abundancia en todo el reino vegetal, con especialidad en las yerbas, semillas, palmas, etc., se halla comparativa-

mente en pequeña cantidad en el reino animal, como podemos notarlo en el orden más elevado, que son los vertèbrados. Vestigios de *Silicea* se encuentran, sin embargo, en la sangre, en la bilis ú orina, y en cantidades más grandes (7 por ciento) en la clara del huevo, y más aún en las cenizas de la epidermis, cabello y uñas. Se halla también en el tejido conectivo, y por consiguiente su acción sobre la médula espinal, cerebro y nervios puede reducirse á cubrir la membrana, el tejido conectivo de las fibras nerviosas. El trastorno funcional de las moléculas de la *Silicea* causa una turgencia de las células que envuelven los tejidos conectivos. Esta hinchazón puede permanecer estacionaria por un tiempo dado, luego desaparecer ú ocasionar supuración.

Acción general.—La *Silicea* obra más sobre las substancias orgánicas del cuerpo, envolviendo de modo pronunciado los huesos, las articulaciones, las glándulas, la piel y las superficies mucosas, produciendo la nutrición defectuosa y correspondiendo á la diátesis escrofulosa; su acción es profunda y de larga duración. Es adecuada especialmente á las constituciones nutridas imperfectamente, mostrando una asimilación deficiente.

Es el remedio para los padecimientos acompañados *de formación de pus*, y le conciernen estrechamente todos los trayectos fistulosos; siempre que el pus se forme en una parte inflamada de tejido conectivo ó de la piel, la *Silicea* puede ser usada. La

caquexia escrufulosa, profundamente situada y algunas formas sépticas de infección (vacuna) encuentran en dicha sal un remedio general. Como *Calc. Sulph.*, *Silicea* corresponde á los procesos de supuración, con los siguientes rasgos que á una y otra distinguen: *Silicea* madura los abscesos desde el momento EN QUE SE DESARROLLA LA SUPURACIÓN; *Calc. Sulph.*, por el contrario, CONTIENE EL PROCESO SUPURATIVO, curando las llagas supuradas. Mientras más extensa sea la infiltración, QUE SOLAMENTE PUEDA DESAPARECER POR SUPURACIÓN, más es la indicación de *Silicea* como remedio, y se continuará hasta que todas las partes infiltradas hayan desaparecido. Si ENTONCES la llaga no ha curado, se administra *Calc. sulph. Silicea* está indicada en las dolencias que afectan el periostio; en las supuraciones profundamente situadas, cuando el pus es espeso y amarillo; también en ciertas afecciones reflejas enlazadas con los nervios. Después de que la supuración ha cesado de ser activa, pero el proceso se suspende y el pus forma depósitos crónicos, pequeños ó grandes, fistulosos ó de otra naturaleza; también obra cuando el organismo general es irritable y débil al mismo tiempo; y si el sistema nervioso es llevado fácilmente al estado de completa agitación (que está indicado, como dice Dunhain, por el entorpecimiento *general* de los nervios), este es un remedio específico. En el agotamiento localizado, cuando los síntomas se asemejan á la parálisis—v. g.: distención rectal, corazón dilatado é irritable, gran debilidad ge-

neral, como después de una enfermedad prolongada—siempre se pensará en él. También en la hiperestesia general y en los reflejos exagerados.

Silicea tiene asimismo el poder de reabsorber el exudado sanguíneo ó sero-albuminoso, existente en los tejidos por medio de los linfánticos. Aquí con frecuencia es seguido de *Calc. phos.*

La *Silicea* cura las afecciones crónicas del reumatismo y la gota por medio de sus efectos estimulantes sobre la envoltura celular del tejido conectivo, obligando á éstos á abandonar los uratos acumulados por los linfáticos.

La *Silicea* puede restablecer la supresión del sudor de los pies, y en este sentido ser un remedio indirecto para las enfermedades que resultan de esta supresión, por ejemplo: ambliopía, catarata, parálisis, etc.

Si las células de cualquiera parte del tejido conectivo muestran una falta de las moléculas de *Silicea*, se atrofian por esta consecuencia.

GUÍA DE SÍNTOMAS É INDICACIONES CARACTERÍSTICAS.

SÍNTOMAS MENTALES.—Dificultad para fijar el pensamiento y la atención; puede trabajar con él, pero se fatiga con facilidad, más intelectual que físicamente. Desaliento, enfado, disgusto de la vida; *sensibilidad excesiva* á los ruidos, etc., acompañada de ansiedad. Gran irritabilidad; una peculiar abstracción mental, marcada por una tendencia á divertirse con alfileres y agujas.

Desfallecimiento cerebral, las jóvenes escolares parecen confundirse durante las recitaciones, por-

que no pueden reconcentrar sus ideas; necesitan reflexionar, pero no pueden hacerlo.

CABEZA Y CUERO CABELLUDO.—Vértigo; el paciente se siente propenso á caer hacia adelante ó al lado izquierdo. Vértigo laberíntico; cefalalgias con vértigo; se presentan pequeños nódulos sobre la piel del cráneo; dichas cefalalgias son ocasionadas por el hambre, por irritación abdominal, por exceso de estudio, por agotamiento nervioso. El dolor de cabeza tiene el carácter de latido, pulsación, presión hacia abajo y frialdad, con deseo constante de envolvérsela. *Dolor de cabeza que parte de la nuca al vértice, más sobre el lado derecho, agravado por el ruido, el ejercicio, la luz, el estudio y aliviado por el calor.* Cefalalgia presiva de arriba hacia abajo, con picazón intermitente de la vulva. Apoplegía cerebral precedida de punzadas profundamente localizadas en la región parietal derecha y dolor obtuso, pesado, como calambre en los brazos. Cuero cabelludo muy sensible y dolorido; comezón. Pústulas dolorosas. Heridas y llagas supuradas. Sudor caliente en la cabeza de los niños, como si estuviese envuelta; fontanelas grandes y abiertas. Erupción desagradable en el occipucio. Caída del cabello. Céfalo-hematomas. Nódulos sobre el cuero cabelludo.

OJOS.—Es un remedio de gran importancia en las enfermedades del aparato lacrimal, especialmente de la glándula. Fístula lacrimal. *Orzuelo.* Blefaritis. Tumores tarsianos, diviesos y tumores císticos alrededor de los ojos y los párpados. Keratitis pus-

tular. Ulceras de la córnea, especialmente de la pequeña variedad redonda con tendencia á la perforación; también cuando la úlcera forma escara con dolores taladrantes. (Hepar.) Catarata. Ambliopía después de la supresión del sudor de los pies ó de las erupciones. Afecciones que aparecen en los ángulos de los ojos. Cicatrices y opacidades de la córnea después de la viruela. Neuralgía ciliar, especialmente sobre el ojo derecho. Presión y dolencia en las órbitas. Moscas volantes. Las letras pasan sin interrupción cuando se lee ó escribe. Caries de la órbita.

Oídos.—Sensible á los sonidos estrepitosos. Ruidos de gritería en los oídos. Inflamación del oído medio, especialmente en la supuración crónica. Hinchazón inflamatoria del meatus externo; torpeza de la audición con hinchazón y catarro de las trompas de Eustaquio y cavidades timpánicas. Otitis supurativa. Otorrea coagulada é icorosa, con caries de las células mastoideas. Inflamación del oído después del baño. Sordera; los oídos se despejan á veces con un traquido estrepitoso.

Nariz.—Punta de la nariz roja. Comezón de las ventanillas. *Estornudos;* coriza, catarro nasal; ozena, con secreción fétida y desagradable, cuando la afección está localizada en los tejidos conectivos submucosos ó en el periostio. Coriza crónica con hinchazón de la membrana mucosa, ceguedad, escoriación, con costras y pérdida del olfato. Caries de los huesos nasales por sífilis ó escrofulosis. Comezón

intolerable de la punta de la nariz. Ulceración inveterada que produce una secreción acre y corrosiva; erupción herpética alrededor de las ventanas de la nariz y de los labios.

CARA.—Dolor de la cara con pequeñas masas ó nódulos sobre la misma. Induración del tejido celular de la cara que sigue á los diviesos. Sicosis menti, acné y lupus. Grietas en la piel de la cara. Caries y necrosis del maxilar. Tumores sobre los labios. Color del semblante terroso, pálido.

BOCA.—Supuración de las glándulas salivales. Gangrena de la boca, con úlcera perforante del paladar; faringitis crónica acompañada de constipación. Ulceración de los extremos de la boca.

LENGUA.—Induración de la lengua, úlcera sobre la misma; se siente como si hubiera en ella un cabello.

DIENTES.—Dolor de muelas muy violento por la noche, cuando no produce alivio ni el calor ni el frío, y es causado por enfriamiento de los pies. Cuando el dolor de muelas está profundamente situado en el periostio, ó en la membrana fibrosa que cubre la raíz del diente y se forma un absceso (fístula dentalis). Dentición dificultosa, encías sensibles y ampolladas; postemillas.

GARGANTA.—Aumento de volumen de la glándula tiroides; tonsilitis cuando la glándula supurada no ha curado. Angina periódica. Parálisis del velum pendulum palati.

SÍNTOMAS GÁSTRICOS.—El niño vomita luego que

mama. Intolerancia de los estimulantes alcohólicos. Induración del píloro. Dispepsia crónica con eructaciones ácidas, cardialgía y calofrío, vómitos en la mañana hasta el medio día. Disgusto por la carne y por los alimentos calientes. Hambre excesiva.

ABBOMEN Y DEPOSICIONES.—Elevación del abdomen en los niños; glándulas inguinales aumentadas. Constipación asociada con afecciones espinales, debida á semi-parálisis del recto, particularmente *si las evacuaciones retroceden después de haber sido en parte arrojadas*, lo que acontece por irritación del esfínter del ano. Abscesos hepáticos con induración. Diarrea infantil de olor cadavérico, después de la vacuna, con mucha perspiración ácida en la cabeza, y abdomen distendido, duro y caliente. Diarrea de olor cadavérico. La flatulencia cambia de lugar; hemorroides intensamente dolorosas. Cólico verminoso. Fístula y fisura en el ano.

ORGANOS SEXUALES Y URINARIOS.—Supuración de los riñones, orina cargada con pus y moco. Depósitos de ácido úrico rojo-arenosos. Enuresis por vermes ó corea. Sífilis crónica con supuraciones é induraciones. Gonorrea crónica con secreción espesa, fétida y purulenta. Eretismo sexual, con persistentes pensamientos eróticos, frecuentes emisiones nocturnas, también con enfermedad paralítica. Comezón y mucho sudor en el escroto. Prostatitis, hidrocele, emisiones de semen. *El período menstrual es asociado con frialdad como de hielo sobre todo el cuerpo, constipación y sudor fétido de los pies.* Mens-

truación anticipada, pero escasa; rara vez es profusa. Ardor y comezón del púbis. Ninfomanía. Leucorrea acre, profusa y acompañada de comezón. Menstruación durante la lactancia. Quistes serosos de la vagina. Esterilidad. Abscesos de los labios con tendencia á convertirse en fístulas abiertas. Metrorragia debida á permanecer en el agua fría.

EMBARAZO.—Mamas muy duras y doloridas, como si amenazasen venir á supuración. Inflamación de los pechos; mastitis, para reprimir la formación del pus, y lograr la absorción de la induración que quede. Escirro. Los pezones se agrietan y ulceran fácilmente, úlceras fistulosas de las mamas, masas endurecidas que amenazan supuración. Dolencia y cojera de los pies, durante el embarazo, la que molesta más del empeine á la planta del pie.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.—Pneumonía, período de supuración. Empiema. Expectoración copiosa supurativa, floja y ruidosa, pus espeso, amarillo-verdoso, síntomas de fiebre héctica, profusos sudores nocturnos y gran debilidad. Bronquitis crónica y tisis. Tos en los niños enfermizos con sudores nocturnos. Garraspera, tos irritante, con sensación de un cabello sobre la lengua, provocada por cosquilleo en la garganta y en la fosa supra-esternal, y por las bebidas frías; peor en la noche cuando se acuesta. Esputos abundantes, espesos como pus, con debilidad y dolor profundamente localizado en el pecho. Abscesos de los pulmones en los tísicos. Tos

y garganta dolorida con expectoración de pequeños gránulos de olor desagradable.

ORGANOS CIRCULATORIOS.—Palpitación después del movimiento violento ó cuando está sentado en completo reposo. Enfermedad crónica del corazón.

DORSO Y EXTREMIDADES.—Dolencia entre los hombros, curvatura espinal, raquitis, *irritación espinal.* Coxis estropeado después de andar á caballo. Carbunclos á lo largo de la espina. Espina bífida. Abscesos del psoas. Enfermedad de la articulación de la cadera, para impedir ó reprimir la supuración. Supuración de llagas ó heridas de las extremidades con secreción de una materia espesa y amarilla, y para la supuración profundamente localizada. *Panadizo*, *uñero*, sensación como si supurasen las puntas de los dedos, ayudando y reprimiendo la formación de pus y estimulando el crecimiento de las uñas nuevas. Enfermedad de Pott. Carnosidad fungosa y caries; úlceras antiguas con dolores ardientes y lancinantes. Sinovitis crónica de la rodilla con gran hinchazón y anquilosis. Caries de los huesos con fístulas abiertas, secreción de pus y fragmentos óseos. Falta de crecimiento en las uñas de los dedos del pie. *La transpiración fétida de los pies es habitual*, de horrible olor y su supresión causa otros padecimientos. Sudor de mal olor en las axilas. *Uñas estropeadas y quebradizas*, con manchas blancas. Decrecimiento de las uñas de los pies. Dolores en los pies, de los maleolos á la planta. Debilidad de los maleolos. Pies insoportablemente delicados.

Afecciones nerviosas seguidas de traumatismo en la espina; *espasmo tónico de la mano cuando se escribe.* Los brazos y las manos se sienten pesadas y paralizadas. Dolor en el hombro y el brazo por la noche, el que se alivia con envolturas calientes; los miembros y los pies se sienten muy cansados y como si se paralizasen; *espasmo tónico y doloroso en los pies y los dedos durante un paseo prolongado.* Enfermedades ocasionadas por exponer la espalda á la corriente del aire.

SÍNTOMAS NERVIOSOS.—Epilepsía que se presenta en la noche, el aura comienza en el plexo solar. Dolor en varias partes del cuerpo como si estuviesen ulceradas. Irritabilidad y sensibilidad de la espina, con numerosos dolores reflejos. Contracción espasmódica de los esfínteres, histeria y neuralgía obstinada. Las partes enfermas están frías, son sensibles á la humedad. Debilidad con deseo de acostarse, temblor de los miembros y síntomas paréticos. Tabes dorsalis. Espasmos por la más leve causa. *Agotamiento con eretismo.*

SUEÑO.—Falta de sueño por orgasmo sanguíneo, palpitación, calor, pulso rápido. Habla dormido. Sacudimiento de los miembros durante el sueño. Sueños desagradables.

SÍNTOMAS FEBRILES.—Fiebre héctica durante un proceso supurativo prolongado. *Calosfrío* todo el día, al moverse, y con falta de calor animal. Sensibilidad al aire frío. *Calor* después del medio día y

toda la noche, con ardor en los pies. *Sudor nocturno* con pérdida del apetito y postración. Sudor copioso de la cabeza. *Sudor fétido de los pies.*

PIEL.—Piel muy sensible; comezón, ardor, pápulas, nudosidades, úlceras, tumores, carbunclos, uñeros y pústulas malignas. Sabañones, costra de leche con una secreción líquida de mal olor. Eczema escamosa. Acné. Las pústulas son sumamente dolorosas. Tendencia marcada á los diviesos en diversas partes del cuerpo. Abscesos y carbunclos é induraciones subsecuentes. Ulceras fungosas, pútridas, secreción icorosa y acre, bordes azules y elevados, úlceras fistulosas alrededor de las uñas. *Las enfermedades de la piel se curan con dificultad y supuran fácilmente.* Erupciones escrofulosas, grietas. Erisipelas flegmonósas que invaden la profundidad de los tegidos. Bolsas. Hinchazones glandulares. Viruela en el período supurativo; consecuencias de la vacuna hecha con pus-vacuno de mala calidad. *Lepra*, especialmente para la ulceración nasal, nudosidades y manchas cobrizas.

TEJIDOS.—Fungus, abscesos que sangran fácilmente con aberturas fistulosas, hinchazón inflamatoria, ulceración y necrosis de los huesos. Raquitis, supuración celular de curso lento é induración subsecuente. Inflamaciones malignas y gangrenosas. Abultamiento de las glándulas supuradas, especialmente de las cervicales. Casos descuidados de traumatismo si amenazan supuración. Secreciones y excreciones de mal olor. Hidropesía. Supuración de

las glándulas sebáceas, diátesis escrofulosa. Encondroma. Tumores blancos.

MODALIDADES.—Los síntomas son siempre peores en la noche durante el plenilunio. *Mejorados por el calor y en un cuarto caliente.* La cefalalgia se alivia con envolver la cabeza en un lienzo *caliente.* Los dolores abdominales y reumáticos, lo mismo que la tos, se alivian con el calor. Empeoran con el aire libre, por la supresión del sudor de los pies ó su enfriamiento, también por el frío.

DATOS HOMEOPÁTICOS.—Esta droga fué experimentada por Hahnemann. La primera relación de ella aparece en las *Enfermedades Crónicas*, vol. III, en 1828.

ADMINISTRACIÓN.—Schüssler recomienda la 6x y la 12x potencias; pero en la escuela Homeopática se han obtenido los resultados más brillantes con el uso de las atenuaciones elevadas (véanse Casos Clínicos, Part. III). Su aplicación externa es también recomendada por Schüssler y algunos otros, para los carbunclos, úlceras, ulceración de las heridas, abscesos y ozena, para esta última en pulverizaciones; las dosis masivas y repetidas están indicadas en los escrofulosos, en las hinchazones glandulares sin supuración; pero si hay supuración ó aun tendencia para ella, las altas potencias (30ª) ayudan en los casos crónicos, una dosis diaria, ó con menos frecuencia; en los subagudos, dos dosis, mañana y tarde; en los agudos, cada dos ó tres horas. Un método eficaz de usar la Silicea localmente es hacer una fuer-

te decocción de heno. Este la contiene en grande proporción. El silicato de soda se dará en solución libre. El Dr. Percy Wilde, quien introdujo esta importante preparación de Silicea, da tres ó cuatro gotas tres veces al día, y cada dosis es administrada en la tercera parte de un vaso de agua, ó, todavía mejor, en leche. El efecto del remedio necesita observarse, pues es capaz de producir cambios activos en los tumores, dentro del término de cuarenta y ocho horas (véase Tumores, Part. III).

RELACIONES. — En la supuración compárese con *Calcarea sulph.*; la diferencia consiste en que *Silicea* promueve supuración y lleva el proceso á la madurez, mientras que *Calcarea sulph.* cura el proceso por medio de su detención, y promueve la aparición de las yemas carnosas. Para los resultados de la vacuna hecha con pus de mala naturaleza tenemos, además de *Silicea* y *Thuja*, á *Kali mur.*, el que, según Schüssler, es uno de los remedios necesarios. El dolor de cabeza de *Silicea* es semejante al de *Spigel*, *Paris*, *Picrid acid.*, *Coccul.*, *Gelsem* y *Sanguin.* En la fístula lacrimal compárese con *Natr. mur.* y *Petrol.;* en el panadizo y falta de crecimiento de las uñas del pie, cuando falle *Silicea*, *Graphit.* da resultado. En las caries y periostitis compárese con *Asaf.*, *Graphit.*, *Conium* y *Platina mur.;* en la tabes compárese con *Alumina* y *Ruta.* *Silicea* es la «PULSATILLA CRÓNICA;» pues corresponde á las formas crónicas de aquellas enfermedades en las que *Pulsat.* cura cuando son agudas. La *Pulsat.* crece en el suelo

arenoso, y probablemente contiene *Silicea* como uno de sus constituyentes. En las enfermedades de los huesos se parece íntimamente á *Mercur.*, pero no se dará después de éste porque puede complicarse el caso. (Gilchrist).

En su *Kreislauf des Lebnes*, Moleschott dice que las cenizas de *Equiset. hyem.* se componen casi enteramente de *Silicea;* las curaciones de los trastornos de la vejiga conseguidas por *Equiset.* son debidas probablemente á la *Silicea* que contiene. Los manantiales minerales de Baréges, en los Pirineos, contienen una grande y extraordinaria cantidad de *Silicea* en una forma apreciable, y esta agua mineral ha sido el solo remedio que la experiencia empírica señala como sumamente apreciable en la clase de casos para los que la (Dr. Persy Wilde) *Silicea* está indicada homeopáticamente. En el vértigo laberíntico, compárese con *Natr. salicy.* En la ulceración alrededor de las uñas, *Psorinum* es inestimable. Sus remedios aliados son: *Fluoris acid.*, *Picris acid.*, *Hypericum*, *Ruta.*, *Mercur.*, *etc.*

PARTE III.

APLICACION TERAPEUTICA DE LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS.

ABSCESOS.

FERRUM PHOS.—Este es el primer remedio que se administra en todos los casos de diviesos, carbunclos, uñeros, ó cualquiera proceso supurativo; cuando se presente fiebre, calor, dolor con latido y congestión en los lugares afectados. Si se da al principio este remedio, frecuentemente impedirá la supuración.

KALI MUR.—Está indicado en el segundo período de los diviesos, carbunclos, uñeros, abscesos, etc., cuando hay hinchazón, pero todavía no se forma el pus, está especialmente indicado en los abscesos de los senos, con los característicos ya dichos. Puede darse también en los carbuncluos, diviesos y otros procesos supurativos para abortar la hinchazón antes de la formación del pus. También se usa en lociones, aplicándose exteriormente en compresas de hilas.

NATRUM SULPH.—Abscesos fistulosos que llevan años de duración, secretando pus acuoso, rodeados

por un borde ancho y azulado. Abscesos profundos. Una sola dosis de la 3ª trituración produce algunas veces cambios favorables; los abscesos ceden, los trayectos fistulosos se secan (Grauvogl). Panadizo, inflamación ó supuración alrededor de la raíz de las uñas.

SILICEA.—Cuando aparece la supuración se administrará de una vez este remedio. Ayuda mucho al proceso supurativo, ocasionando la maduración rápida del tumor, que con frecuencia se abre espontáneamente. Sigue á Kali mur. en aquellos casos en que el pus ha comenzado á formarse, como en los abscesos mamarios, especialmente si no es suficiente Kali mur. para impedir la supuración. Después de que los abscesos se abren ó han sido abiertos, se continuará en el uso de este remedio tanto tiempo cuanto la induración permanezca. La Silicea es útil también en los tumores ocultos. En el panadizo ayuda y reprime la formación del pus y estimula el crecimiento de nuevas uñas; el uso de Silicea en todos aquellos casos en que comienza á formarse el panadizo no puede ser suficientemente estimado. Una dosis cada dos horas curará comunmente el uñero en veinticuatro horas. (A. P. Davis.)

CALCAREA SULPH.—Este remedio sigue bien á *Silicea* en el proceso supurativo cuando, no obstante la ausencia de la infiltración, continúa la supuración, debido al estado atónico de los tejidos afectados. Es útil en los diviesos, abscesos de los pechos, panadizo ó uñero, cuando haya secreciones. Abortará los

uñeros y forúnculos á la 12ª potencia. (W. E. L.) La presencia del pus con un agujero de salida es una indicación para su empleo. La diferencia entre este remedio y Silicea, por lo que respecta á los abscesos, es como sigue: la *Silicea* madura los abscesos, desde el momento en que promueve la supuración; la *Calcarea sulph.* cura las llagas en supuración, puesto que tiende á limitar el proceso supurativo y le falta la fetidez que es característica de *Silicea.* Este remedio es similar á *Hepar sulph.*, pero su acción es más profunda é intensa. *Abscesos dolorosos cerca del ano.* Es un remedio sumamente útil en los diviesos de las encías.

KALI PHOS.—Este remedio está indicado en los abscesos, carbunclos, uñeros y otros procesos supurativos cuando hay síntomas adinámicos y la abundancia de la supuración llega á alterar la salud. El pus es icoroso, sanguinolento, de aspecto asqueroso y olor desagradable. En la mastitis cuando el pus es moreno, asqueroso y sucio.

CALCAREA FLUOR.—Cuando el proceso supurativo afecta el hueso, ó se presentan bordes duros y callosos en las heridas, este remedio se encontrará eficaz. En los uñeros una loción con hilas aplicadas exteriormente ha tenido resultado satisfactorio. «Es un remedio inestimable en los abscesos de la pelvis procedentes de la caries de algún hueso.» (Southwick.)

«En los casos antiguos de fistulas sinuosas de las

mamas he encontrado este remedio especialmente precioso.» (Dr. J. W. Ward.)

CASOS CLÍNICOS.

El paciente se había resfriado, y á consecuencia de ésto se afectaron las encías y la parte blanda y dura del paladar, y comenzó á desarrollarse un divieso exactamente detrás de los incisivos superiores.

Di Ferrum phos. que produjo algún alivio, pero el tumorcillo tenía cierta tendencia á la supuración. Continuaba hinchado y se hacía muy doloroso. Después de la lectura de un artículo sobre Calc. sulph., en donde el autor exponía: "para los diviesos de los dientes es el único remedio que siempre uso," decidí experimentarlo, y de consiguiente prescribí la 3ª x en dosis de cinco granos, y durante dos días la administré diariamente por tres ó cuatro veces. La mejoría fué inmediata; disminuyó el dolor, y, debido á la acción de las dosis de Calc. sulph., el divieso se absorbió y desapareció. (M. F. R.)

Una dama, la señora B., padecía una hinchazón de la pierna bajo la rodilla, había sido atendida algunos meses por su doctor, quien la había ordenado cataplasmas y procedido á la apertura con una lanceta; pero no hubo secreción. Estaba imposibilitada para andar. Se la aplicó luego el yodo á la parte enferma sin resultado, después un vendaje para reducir la hinchazón excesivamente dura y bañar la parte enferma con agua fría tres veces al día. Algunas partes estaban azuladas al quitar el vendaje, sintiéndose el lugar frío y muy duro y pareciendo próximo á reventar; había aumentado la hinchazón como dos tantos más de su tamaño. Fomentos calientes y Kali mur. tomado interiormente y aplicado al exterior, curó la pierna en tres semanas. (Tomado de Schüssler.)

Lilly, de 6 años de edad, hija de la señora del caso arriba mencionado, tenía un diente cariado con una postemilla bien desarrollada. La postemilla no daba señales de desaparecer, y deseando ver el resultado que daría para él la aplicación de las Sales de los Tejidos, la dí una cajita conteniendo cerca de 125 pastillas de Calc. sulph. 3ª x. Le hubieran durado diez ó más días, pero como tenían sabor agradable y era

exigente como niña, no pudo resistir, y toda la caja llena fué concluida en tres días, obteniéndose la curación. (M. F. R.)

En Agosto de 1877, un joven que había padecido de ciática hacía algunos años y que había adquirido el hábito de usar inyecciones subcutáneas de morfina, vió que se le desarrolló un divieso en el lugar en que se aplicaba las inyecciones, que supuraba y no sanaba; por fin, cuando parecía haberse curado y estar comparativamente bien, el enfermo sufrió un resfriado. La supuración comenzó de nuevo, y esta vez de una manera excesiva. La madre parecía alarmada, pues el enfermo estaba muy débil y no tenía apetito, su sueño era inquieto y sentía una sed constante. Le prescribí *Silicea*, una dosis en ayunas cada mañana. Después de una semana, la madre me hacía la siguiente y muy favorable relación: "La secreción de materia ha sido reducida de tal modo, que parece desaparecer enteramente; ha cesado la grande sed que tenía y ha vuelto el apetito; su sueño es profundo, y la sensación de horripilación y calofrío que tenía, se ha quitado completamente." Silicea ha proporcionado aquí una brillante demostración de su poder sobre la supuración, con los síntomas característicos que la acompañan. (Dr. Goullon Jr.)

Una modista, en la época de su mayor trabajo, para su desgracia, vió desarrollársele un panadizo sobre el pulgar de la mano derecha. *Ferrum phos.* 12ª en agua, cada tres horas, la alivió prontamente y se supuso estar ya curada. Se puso á trabajar con energía, y á los tres días reapareció el mal con extraordinario aumento del dolor y endurecimiento de la parte tumefacta. *Kali mur.* 12ª terminó desde luego la curación, apareciendo una sola gota de pus en el centro de la cutícula, al ser ésta cortada con las tijeras. (J. C. Morgan, M. D.)

Un caballero de edad vino á mi despacho con tenositis de la segunda falange. Toda la mano estaba llena de pus espeso y amarillo; venía padeciendo hacía tres meses; el sueño le era desconocido; se le habían aplicado cataplasmas, incisiones é inyecciones de morfina, hasta que los médicos (alópatas) habían decidido amputar el dedo; en efecto, vino á la ciudad con ese objeto. Habiendo salido su médico fuera de la ciudad, vino á mi oficina para que lo viese. Le dije que podría conservarse el dedo; sin embargo de que los flexores estaban todos destruidos y el periostio inflamado, á pesar de todo esto podía curarse el de-

do. Inyecté Eucalyptus en el orificio de entrada y penetró la inyección todo el dedo y hasta arriba de la mano; limpiando después las úlceras le puse un vendaje cómodamente apretado y lo sujeté á la acción de *Silicea* 6ª, una dosis cada tres horas; la curación con Eucalyptus se continuó diariamente y á las cuatro semanas el dedo había recobrado su tamaño y forma natural, pero como todos los flexores de los dedos habían sido destruidos no podía verificarse la flexión de esas partes de la mano. La *Silicea*, al menos, restauró todos los elementos del tejido conectivo, y el hombre quedó completamente satisfecho con la curación. (A. P. Davis, M. D.)

La Silicea ha manifestado ser un excelente remedio en el siguiente caso: En el mes pasado tuve que asistir á una señorita, de edad de diez y seis años, á la que no ví personalmente; la madre se me presentó diciéndome, que su hija venía padeciendo, hacía pocos meses, del pie derecho. Los médicos que la habían visto, declararon que era necesaria una amputación. El pie estaba extraordinariamente hinchado, la secreción de pus era excesiva; la pierna estaba casi encorvada, formando un angulo recto en la articulación de la rodilla y no podía absolutamente extenderla. La aconsejé abandonara todo remedio, tanto interno como externo, y la prescribí *Silicea* para tomar una vez al día. Tres meses después vino la enferma por sí misma, andando sin ninguna ayuda. El pie estaba casi completamente curado, solamente había una ligera secreción de pus.

Lo mismo ha acontecido en un caso de secreción purulenta del oído, que había sido tratado infructuosamente por largo tiempo, y ocasionaba al enfermo dolores intensos, tanto de día como de noche. Este caso fué también curado con Silicea. (De Schüssler.)

ADDISON, ENFERMEDAD DE.

NATRUM MUR.—Cuando existen grandes perturbaciones en la nutrición, tensión y calor en la región de los riñones; aspecto terroso de la piel, manchas morenas sobre el dorso de las manos, excesiva pos-

tración mental y física; temblor de las piernas, vista turbia, falta de apetito, náusea, vómitos, repugnancia á la carne, constipación. Aversión para el movimiento y el trabajo; bostezos frecuentes y pandiculaciones, frialdad de las extremidades, depresión de espíritu con irritabilidad; vértigo al levantarse ó al intentar andar.

AFONÍA.

Véase también ronquera.

FERRUM PHOS.—Ronquera después de cantar ó ejercitar la voz en los cantores ú oradores públicos, con dolencia en la laringe.

AMENORREA.

KALI MUR.—Supresión del período menstrual. Entorpecimiento en las funciones del hígado; capa blanca de la lengua é inactividad glandular.

KALI PHOS.—Supresión del flujo con depresión de espíritu, laxitud y debilidad, cuando aparece dificultad en la respiración como un resultado de la supresión.

KALI SULPH.—Menstruación escasa ó suprimida, con peso y plenitud en el abdomen.

NATRUM MUR.—En las jóvenes, cuando la menstruación no aparece, ó bien es escasa y á largos intervalos.

CALCAREA PHOS.—Amenorrea en las enfermas anémicas.

CASOS CLÍNICOS.

1. Caso de una joven cuyo período no se había presentado por varios meses, y comenzaba á tener molestias en el pecho como consecuencia de esto. Kali phos. 30ª, una dosis mañana y noche. La menstruación reapareció pronto, y á las cuatro semanas ya no tenía dolores en el pecho.

2. A una muchacha de 22 años, que siempre había menstruado escasamente, y en la que durante el año pasado había cesado el período por completo, causándole trastornos en la cabeza y los ojos, se le prescribió en 12 de Mayo de 1887, seis dosis en polvo de Kali phos. Después de usar la medicina seis días, reapareció la menstruación con violenta cefalalgia y duró siete días: los otros trastornos desaparecieron gradualmente. (Monabsblätter.)

ANEMIA.

CALCAREA PHOS.—Este remedio obra suministrando nuevos glóbulos sanguíneos. Dolores y calambres dependientes de un estado anémico. Debido á la anemia, la piel tiene una apariencia como de cera. Clorosis, aspecto transparente, blanco-verdoso, con cefalalgia constante y ruido de campanas en los oídos. Schüssler da solo este remedio para la clorosis.

«Remedio espléndido constitucional en los casos antiguos de anemia cerebral cuando la nutrición es evidentemente defectuosa.» (Arndt.)

«Anemia perniciosa, vértigo cuando se levanta ó se incorpora al estar sentado; vista nublada, epistaxis, frialdad de la punta de la nariz; cara pálida, descolorida, amarillenta, terrosa y cubierta de sudor frío; enfriamiento del cuerpo, sabor y olor repugnantes, lengua blanca, capa más densa en la raíz de la misma por la mañana; náusea y vomituración, sensación de vacuidad y hundimiento en el epigastrio; secreciones acuosas de los intestinos, con tenesmo después de las evacuaciones en el día ó por la noche; orina con sedimento floculento; menorragia, la sangre es ya roja brillante ó demasiado obscura, palpitación con ansiedad, seguida por debilidad temblorosa, particularmente de las pantorrillas, cansancio y la más grande debilidad.» (Arndt.)

Este remedio es también útil en la leucemia ó exceso de glóbulos blancos en la sangre después de enfermedades debilitantes.

Ferrum phos.—Sigue á Calcarea phos tan pronto como se establezca una mejoría en el estado general. Hay una necesidad de sangre roja en el sistema. Este remedio, por su poder para atraer el oxígeno, da colorido á los nuevos glóbulos rojos de la sangre y los enriquece después que se han formado dichos glóbulos bajo la acción de la Calcarea phos. Schüssler, en una carta reciente, dice: «El hierro que

entra en la formación de los nuevos glóbulos de la sangre, de ningún modo está ausente en el suero sanguíneo de los cloróticos, por esto he abandonado últimamente el hierro, el que recomendaba en las primeras ediciones de mi Terapéutica para la clorosis y otros estados anémicos.»

KALI MUR.—Este remedio puede ser administrado en la anemia como secundario é intercurrente, si coexisten síntomas tales como eczema ó erupciones de la piel.

KALI PHOS.—Anemia cerebral, el estado anémico del cerebro es causa de exagerada nerviosidad; pobreza de la sangre por influencias que continuamente deprimen la mente y el sistema nervioso. También cura este remedio la leucemia, producida por indisposiciones largo tiempo prolongadas. "Anemia espinal por enfermedades que producen agotamiento, tales como difteria, paraplegia refleja, con dolores agravados por la quietud, pero que se acentúan más principiando á moverse." (Arndt.)

NATRUM MUR.—En los estados anémicos, en que la sangre es delgada y acuosa; en las personas cloróticas que tienen una sensación habitual de frialdad en la espalda; clorosis en las jóvenes que presentan una piel marchita y sin brillo, palpitación frecuente, opresión y ansiedad en el pecho, tos por la mañana, fácil postración y fatiga, con los síntomas característicos de la lengua, etc.; caquexia palúdica por intermitentes y el abuso de la *quinina*, semblante lívido ó muy pálido, presión y distensión

del estómago, constipación con contracción del ano, terrible melancolía.

NATRUM PHOS.—Anemia espinal, debilidad paralítica de las extremidades inferiores, con postración general, pesadez y sensación de fatiga, especialmente después de un corto paseo ó subiendo escalones; las piernas flaquean, de manera que están incapaces para seguir caminando.

NATRUM SULPH.—Hidremia, sicosis, constitución hidrogenoide del cuerpo, ocasionada por la humedad del tiempo ó por habitar en casas húmedas; sicosis é hidremia. (Lilienthal).

SILICEA.—Leucorrea en vez de la menstruación; ataques de ceguera momentánea ú obscurecimiento de la vista. Anemia en los niños delgados, delicados y enfermizos, con tendencia al raquitismo.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. S. Powell Burdick, nos proporciona dos casos de anemia, ocurridos ambos en señoritas de 19 y de 21 años. Una y otra presentaban los siguientes síntomas característicos: Semblante pálido y anémico, gran agotamiento, depresión de espíritu, ataques violentos de cefalalgia frontal extendiéndose al occipucio. La más joven había sufrido de esta enfermedad por seis ó siete años, y recibido tratamiento de varios médicos, homeópatas y alópatas, habiéndole propinado los últimos grandes cantidades de hierro sin ningún provecho. La de más edad había sido también anémica por varios años. Todos sus síntomas fueron prontamente aliviados, apareciendo de nuevo el color suave y rosado de las mejillas; las orejas, que anteriormente estaban pálidas y casi translúcidas, tomaron el color rojizo natural. Los remedios empleados fueron: primero *Calcarea phos.* 12ª, por diez días ó dos semanas, seguida de *Ferrum phos.* 12ª, por dos semanas, luego se volvió de nuevo á Calcarea phos.

Fueron suficientes seis meses para curar permanentemente cada caso.

Una señorita de 17 años se puso anémica y clorótica después de una larga permanencia en la escuela, llegando á estar tan debilitada que no podía fijar la atención mucho tiempo, no tenía apetito y deseaba solamente estar recostada en su casa, no teniendo voluntad para ir á ninguna parte ni para hacer nada. El estudio le producía dolor de cabeza, por lo que tuvo que abandonarlo completamente; su menstruación era irregular, por algunos meses se le ausentaba, luego se presentaba un flujo que variaba en cantidad. La dí *Calcarea phos.* 6ª, como remedio principal, y de vez en cuando *Ferrum phos.* Al cabo de pocos meses vino á estar lo bastante bien para empezar de nuevo sus estudios, podía andar por cualquiera parte con deseos de salir y mejoría en su color. (C. T. M.)

NATRUM MUR.—W. Rowley refiere un caso de anemia debido al abuso de la sal. La enferma estaba extenuada, con palidez general; debilidad, sensibilidad exaltada; el flujo menstrual nunca se establecía convenientemente. Los intestinos tenían tendencia á la constipación. Había dado en la costumbre de usar la sal con exceso. Tratando el caso, el uso de la sal fué limitado, y se la administró una dosis de Natr. mur. á la 200ª, la que fue seguida por la mejoría general, el flujo menstrual adquirió su fuerza y condición regulares, y la salud fué por completo restablecida.

ANEURISMA.

CALCAREA FLUOR.—Esta enfermedad en su principio puede detenerse con el uso de este remedio, el principal, en alternación con *Ferrum phos.*, con tal que no haya sido administrado el *ioduro de potasio.*

FERRUM PHOS.—Este remedio se usará al principio para establecer la circulación normal y alejar aquellas complicaciones debidas á la acción exagerada del corazón; también puede alternarse con el precedente, dando esto buen resultado. En los aneurismas pequeños con muchas palpitaciones.

ANGINA PECTORIS.

MAGNESIA PHOS.—Este remedio puede darse para los espasmos neurálgicos de esta enfermedad. Será administrado en agua caliente. Dolores neurálgicos constrictivos en el pecho. Es también un remedio útil para la angina «falsa.»

FERRUM PHOS.—Este remedio puede alternarse con el precedente si se acompaña el padecimiento por bochornos en la cara, ardor ó calor difuso.

KALI PHOS.—Se usará este remedio alternado con *Magnesia phos.* si la acción del corazón es débil é intermitente y si hay tendencia á desmayarse.

ARTRITIS.

FERRUM PHOS.—Se dará al principio este remedio en dosis repetidas cuando se presenten los síntomas febriles; y después de declarada la enfermedad se administra como un intercurrente. Las articulaciones están dolorosas al movimiento, el que agrava y aumenta el dolor. Tenalgia crepitante.

KALI MUR.—En la artritis aguda, para la hinchazón ó cuando la lengua está manchada de blanco; puede alternarse con *Ferrum phos.* El movimiento

agrava los dolores; es útil especialmente después de Ferrum phos. Tenalgia crepitante.

NATRUM MUR.—Artritis crónica, crujido de las articulaciones (si el aspecto de la lengua y los otros síntomas correspondientes, obra probablemente favoreciendo la eliminación del urato de sodio). Sinovitis, gota, dolor en los tendones de la corva (probado).

NATRUM PHOS.—Gota aguda (después de *Ferr. phos.)* Gota crónica, sudor profuso y de olor ácido; artritis reumática, especialmente de las articulaciones de los dedos. Orina de un color rojo obscuro. Los dolores van repentinamente al corazón; dolor en los tendones de la corva.

MAGNESIA PHOS.—Es útil como un remedio intercurrente para los dolores (violentos). La indicación principal es el carácter espasmódico y atormentador de los dolores.

KALI SULPH.—En la artritis reumática donde los dolores cambian de una á otra articulación, agravados por el calor. Dolores reumáticos en las articulaciones, errantes y que mudan de dirección. Artritis fungoide; tumor blanco, hinchazón blanca.

SILICEA.—Supuración de las articulaciones.

CALCAREA SULPH.—Proceso supurativo de las articulaciones.

NATRUM SULPH.—En los casos agudos (ataques) de gota. Se alternará este remedio con *Ferrum phos.*; en la gota crónica él solo es suficiente. Gota en los pies, aguda y crónica; artritis reumática, es-

pecialmente en las articulaciones de los dedos, los dolores repentinamente van al corazón, orina roja-obscura.

CALCAREA PHOS.—Gota reumática, peor en la noche y con el mal tiempo. Higroma patellœ. Hidrops genu.

CALCAREA FLUOR.—Deformaciones gotosas de las articulaciones de los dedos.

CASOS CLÍNICOS.

Dolores reumáticos en las articulaciones de los pies, agravados por el movimiento, en los que había fallado *Bryon.* y *Kali iod.*, curaron con *Ferrum phos.*, á la 10ª dil.—*Pop. Zeitschrift, Berlín, 1886.*

Un zapatero de Berlín se enfermó á consecuencia de un resfriado. Había fiebre con dolor violento en el hombro derecho. La primera visita que le hice, fué al tercer día después de su enfermedad; la temperatura era alta, el pulso lleno y vivo, sed y pérdida del apetito. El hombro derecho estaba muy rojo y sensible al tacto; no se encontraba capaz de acostarse en su cama, porque la presión de las almohadas era intolerable. Estaba echado sobre el sofá, apoyado con cojines de manera que el hombro se librara de la presión. Dí á mi enfermo *Ferrum phos.* en cantidad equivalente á la que cubriría una pieza de seis peniques; esta dosis fué disuelta en un vaso de agua, grande, para darle una cucharadita de la solución cada hora. La mejoría se hizo sentir á las pocas horas. Durante la noche el enfermo pudo dormir, y al siguiente día la fiebre disminuyó; á los tres días estuvo en condiciones de mover el brazo con algún desembarazo, y en unos cuantos días más se encontró enteramente bien. (Sulzer.—Tomado de Schüssler).

ASMA.

KALI PHOS.—ASMA NERVIOSA. Es el principal remedio, en grandes dosis repetidas á menudo, para la dificultad de respirar y para el estado de depresión

del sistema nervioso. Asma y fiebre de heno. Asma producida por el más pequeño alimento.

KALI MUR.—Si existen desarreglos gástricos; lengua saburral con una capa blanquizca ó verdosa, y mucosidad blanca y difícil de expectorar; cuando este estado se acompaña con depresión de la respiración, altérnese con *Kali phos.* ASMA CARDIACA con sensación como si el corazón y los pulmones estuviesen comprimidos.

NATRUM MUR.—Asma con profusión de moco espumoso. En alternación con *Kali phos.*, también cuando las lágrimas corren por la cara siempre que se tose. Sacudidas espasmódicas con cada inspiración.

CALCAREA PHOS.—Como intercurrente en el asma bronquial, secreción clara y glutinosa. El niño es acometido de un ataque sofocativo al ser levantado de la cuna.

CALCAREA FLUOR.—Cuando después de mucho esfuerzo son arrojados pedacitos ó pequeñas masas, alternada con *Kali phos.*, siendo estas masas de moco amarillento. Respiración oprimida. La epiglotis se siente cerrada ó como si se respirase al través de un cuerpo grueso.

MAGNESIA PHOS.—En el asma cuando la flatulencia es molesta. ASMA NERVIOSA ESPASMÓDICA con paroxismos de tos seca y cosquilleo, dificultando el acostarse.

KALI SULPH.—Asma bronquial con expectoración amarilla. peor en la estación del calor ó en una at-

mósfera caliente. Muchos estertores mucosos. En el asma, cuando los ataques del enfermo aumentan después de tomar alimento, se pierde el color, ó bien hay rápida extenuación y ojos hundidos; el Dr. Rapp recomienda las preparaciones de *Kali* (Schüssler).

NATRUM PHOS.—Asma con expectoración amarilla y espesa.

NATRUM SULPH.—Como un remedio muy importante para la constitución sicósica, de la que el asma es una frecuente manifestación. Ataques que se presentan especialmente en la mañana de las 4 á las 5, con tos y acumulación pegajosa y viscosa, expectoración verdosa y copiosa, y vómitos después de comer, siempre se empeora con la humedad, con el tiempo lluvioso, y por habitar en cuartos bajos ó sótanos. Asma por desórdenes de la digestión. Evacuaciones sueltas por la mañana al levantarse. Asma de los niños. Respiración asmática en los jóvenes por un catarro general de los bronquios, que empeora siempre por cada cambio de la humedad del tiempo.

SILICEA.—Respiración tan dificultosa que los ojos se salen fuera de sus órbitas; necesitan abrirse las puertas y ventanas; se presenta durante la tempestad. Obra como un remedio constitucional para la extirpación de la enfermedad, acompañado de *Natrum sulph.* ASMA QUE TIENE POR ORIGEN UN ESTADO CAQUÉCTICO.

CASOS CLINICOS.

A un caballero en quien los ataques de asma eran frecuentes, du-

rando diez días, con respiración muy fatigosa, no pudiendo hablar sino con dificultad, la expectoración era espesa y amarilla, mucho estertor en el pecho; *Kali sulph* 3ª x lo alivió de una vez (Dr. E. M. Douglass).

Una mujer casada, de 36 años, padece ataques violentos de asma con expectoración purulenta, verdosa, se presenta una evacuación suelta, inmediatamente al levantarse, cada dos días; *Natum sulph.* 500ª cada dos horas. Pudo acostarse esa noche, mejorando mucho la respiración y la tos, y siendo más fácil la expectoración. El día siguiente estuvo perfectamente bien.

Una mujer, también casada, de 42 años, sujeta á los ataques asmáticos desde hacía algunos años, expectoración verdosa y extraordinariamente copiosa; *Natrum sulph.* cada tres horas. La mejoría comenzó á las pocas dosis, haciéndose la expectoración más pálida y menos abundante; siente una mejoría que hace años no ha observado, pero lo más notable es haberse detenido la expectoración á las pocas dosis de medicina, mientras antes con los remedios administrados en los ataques precedentes, había continuado por algunas semanas. Esto indica que el *Natrum sulph.* había destruido la raíz de la enfermedad. (Dr. Wm. J. Guernsey).

El Dr. O. H. Hall, de Zumbrota, Minn., refiere un caso interesante de asma que había pasado "por las manos de todos los médicos de quienes había oído hablar," curado por *Kali phos.* 2ª x.

Diez y ocho meses habían pasado de haberse escrito este caso sin que se presentara un nuevo ataque.—Minn. Med. Monthley. Nov. 1896.

El Sr. C. había padecido por varios años unos ataques de respiración asmática tan marcados, que lo ruidoso de la respiración anunciaba la llegada de dicho señor con alguna anticipación. Los ataques se presentaban después de cualquier esfuerzo extraordinario. Era un hombre alto y vigoroso, no había antecedentes de afecciones pulmonares en su familia; presentaba cierto estrechamiento en los diámetros de su pecho. Examinando los pulmones durante un período de remisión declarada, no se encontró lesión ni sonidos anormales, exceptuando algunos estertores gruesos á lo largo de los bronquios más gruesos. En Abril de 1887, tuvo un fuerte ataque ocasionado por varios

esfuerzos físicos, "el peor á la vez" de los que siempre tenía, que fué prontamente aliviado por *Natrum sulph.* 200ª, y desde que acostumbra tomar de cuando en cuando algunas dosis de este remedio, ha quedado casi libre de sus ataques durante en muchos veranos. (Dr. Wm. E. Leonard).

La Sra. E. que estuvo bajo mi cuidado el año pasado por una bronquitis crónica y otros desórdenes, fué acometida el 9 de Julio de su tercer ataque anual de fiebre de verano—catarro nasal ó asma de heno, como gusteis llamarla—habiéndola contraído por primera vez en la Florida. Ya antes había estado enteramente postrada, viéndose obligada á guardar cama por estos accesos, y los temía mucho. Su marido vino á verme al anochecer, poco horas después de comenzar con la respiración aspera y los estornudos, y me suplicaba moderase el ataque si era posible. Me informó que no podía acostarse, que su respiración se agravaba con el más pequeño movimiento y se acompañaba por curvatura entre las escápulas. No había otro dato que pudiese ilustrar para dirigir el tratamiento por medio de las medicinas más comunes; realmente, todas estas habían sido ensayadas por otros médicos en los ataques anteriores. Había encontrado que *Natrum mur.* aliviaba notablemente sus desórdenes, y así la dí *Natrum sulph.* 200ª con promesa solemne de alivio. No quedó frustrada nuestra esperanza; se durmió una hora después de haber principiado á tomar la medicina en una dosis cada media hora, y en unos cuantos días todos los signos de asma desaparecieron. El 18 de Julio, después de un reconocimiento minucioso no pude oír en sus pulmones ningunos signos de respiración asmática, siendo así que sus ataques pasados eran la causa de que por várias semanas estuviese en un estado enteramente miserable respecto á su salud. (Wm. E. Leonard).

ATROFIA.—MARASMO.

CALCAREA PHOS.—ENFERMEDADES ESCROFULOSAS DE LOS NIÑOS afectando LOS HUESOS (*Calc. fluor.*) Debidad general por falta de asimilación de los alimentos; dentición retardada. Diarrea acuosa con flatu-

lencia, abdomen blando y contraído, color lívido de la piel; el niño tiene un aspecto de ancianidad é inquietud.

KALI PHOS.—Enfermedades debilitantes, cuando se presentan deposiciones de olor pútrido. Atrofia de los huesos.

NATRUM MUR.—Enflaquecimiento rápido del CUELLO EN LOS NIÑOS; irritabilidad; los niños son muy tardíos para aprender á hablar. Calofríos, aspecto terroso de la piel y constipación.

NATRUM PHOS.—Marasmo de los niños que son alimentados con tetera. Abdomen abultado; hígado aumentado de volumen. Cólico después de comer. Evacuaciones que contienen alimentos indigestos.

NATRUM SULPH.—Constitución sicósica heredada; abdomen abultado, con mucho ruido de gases; deposiciones amarillas y acuosas que se expulsan con violencia, agravadas en la mañana al comenzar á moverse.

SILICEA.—EL CUERPO DISMINUYE DE VOLUMEN EN TANTO QUE LA CABEZA ES EXCESIVAMENTE GRANDE. El niño transpira fácilmente, está nervioso é irritable, la cara enflaquecida, el aspecto decrépito. AVERSIÓN Á LA LECHE DE LA MADRE, la vomita si la toma. Deposiciones acuosas y de mal olor. Gran postración después de cualquiera cambio de tiempo.

CASOS CLÍNICOS.

"Calcarea phos. en la falta de asimilación de los alimentos."

La niña R., de edad de 5 años, había sido muy débil toda su vida

y no parecía que ésta se le prolongara por mucho tiempo Era muy anémica y tenía el semblante como manchado. Había sido á veces colérica y muy nerviosa. Demasiado impresionable, no podía sufrir ningún castigo sin enfermarse por unos cuantos días. No tenía cabello, y durante la primera época de su vida no podía levantar la cabeza. Los ojos eran sensibles á la luz. Se quejaba de mal sabor en la boca, y tuve conocimiento del retardo de su dentición y del aumento crónico de las amígdalas. Tenía dolor en el estómago después de comer y el alimento parecía obrar en él como una masa extraña, no podía comer mucho porque siempre esto le causaba congoja. Había sufrido mucho de estreñimiento de vientre.

La orina muy cargada de color y frecuente urgencia para la micción; tenía más ó menos dolor en las extemidades y todo el tiempo que estaba mejor, sentía inquietud y necesidad de moverse; tenía una leucorrea constante, la que era de muy mal olor.

Muy fácilmente se cansaba, sintiéndose agotada, y no podía sufrir la estación del frío. Su sistema óseo era débil y carecía de desarrollo, por lo que estaba expuesta á padecer fracturas con facilidad. A la niña se le ordenó bañarse al salir de la cama, tres veces por semana, y abundancia de aire sano.

Considerado atentamente su caso, me ofreció un cuadro completo de *Calcarea phos.* La prescribí dos pastillas de la 3ª x cada dos horas. Es inútil decir que se mejoró casi desde la primera dosis. Su estado general también se fué mejorando de un modo permanente, y ciertamente este caso es un gran triunfo del remedio mencionado. (Dr. O. A. Palmer).

BOCA, ENFERMEDADES DE LA.

FERRUM PHOS.—Encías doloridas, calientes é inflamadas. Enrojecimiento, sequedad ó calor de la membrana mucosa de la boca.

KALI MUR.—Aftas, vejiguillas, úlceras blancas en la boca de los niños pequeños ó en la de las madres que crían. Postemilla, en la hinchazón blanda, antes

de la formación de materia, escoriación de la boca. Hedor considerable de la boca. La boca está roja é hinchada, con secreciones espesas ó acuosas.

Encías hinchadas, de color blanco ó amarillo. Las encías sangran fácilmente. Placas mucosas. Ulceración sifilítica de las encías. Verdadera gangrena de la boca.

KALI PHOS.—Cancrum oris, con mortificación de la mejilla, úlceras de color gris ceniciento, aliento fétido. Estomatitis; las encías sangran fácilmente cuando existe sobre sus bordes una línea roja ó cicatriz; cáncer acuoso, cáncer gangrenoso.

Hidroa que produce costras y granos dolorosos sobre los labios. Encías esponjosas y como volteadas. Saliva profusa, espesa y salada. Inflamación de la lengua cuando ésta ocurre con sequedad excesiva ó agotamiento. Bordes de la lengua roja y doloridos.

NATRUM MUR.—Vejiguillas con flujo de saliva, salivación. Vesículas como perlas alrededor de la boca. Labios hinchados; erupciones sobre la barba. Postemilla con dolores pulsátiles y taladrantes.

KALI SULPH.—Sequedad y descamación del labio inferior, la piel del mismo se desprende en láminas.

CALCAREA PHOS.—Encías dolorosas é inflamadas en el período de la dentición. Aspecto pálido de las encías, signo de anemia. El labio superior hinchado y dolorido.

CALCAREA FLUOR.—Postemilla, hinchazones duras en los maxilares ó en las encías. Induraciones. Ul-

ceras producidas por el frío en las comisuras de la boca.

NATRUM PHOS.—Este remedio tiene pocos que le igualen para la ulceración de la membrana mucosa bucal. Las «úlceras cancerosas» de los labios y de los carrillos ceden á este remedio á la 3ª ó 6ª atenuación decimales cuando *Borax*, *Antim.*, *Baptisia*, *Karli chorl.*, *etc.*, no han podido efectuar la curación (S. J. de H.)

CALCAREA SULPH.—Dolor en la parte interior de los labios, úlceras denudadas en los mismos. Las encías sangran fácilmente cuando se acepillan los dientes.

CASOS CLÍNICOS.

En una conferencia de médicos en Schaff hausen, el Profesor Dr. Rapp dijo: "En mi opinión, el mayor mérito del método del Dr. Schüssler consiste en la introducción de *Kali phos.* y *Magnesia phos.* En la estomatitis ordinaria, con hinchazón en las encías, depósitos sobre los dientes y fetidez del aliento, *Kali phos.* ha dado las pruebas más satisfactorias de su importancia."

BOCIO EXOFTÁLMICO.

NATRUM MUR.—Palpitación, las pulsaciones del corazón agitan el cuerpo; respiración corta al más mínimo esfuerzo.

CASOS CLÍNICOS.

En esos dos casos, se ha tratado de señoras que tenían hinchazón en ambos lados del cuello, voz alterada, dilatación excéntrica del corazón, con ruido de fuelle sistólico. La curación se obtuvo con *Natrum mur.* 24ª en unos cuantos meses. (Dr. Hofrichter).

FERRUM PHOS.—Hace las veces de *Acon.* en el período inflamatorio agudo, ó cuando se establece un agravación reciente en la bronquitis crónica. Será administrado en alternación con el remedio indicado por la expectoración. En cualquiera irritación de los bronquios, acompañada con dispnea, calor ó dolores ardorosos. Respiración corta, opresiva y acelerada. BRONQUITIS CAPILAR DE LOS NIÑOS. Tos aguda, corta, espasmódica y muy dolorosa.

KALI MUR.—En el segundo período, cuando la flema es blanca y espesa, de carácter fibrinoso.

KALI SULPH.—Cuando la expectoración es precisamente amarilla, acuosa y profusa, ó cuando es verdosa, viscosa y acuosa. En el período de resolución.

NATRUM MUR.—Inflamación aguda de la traquearteria, con flema espumosa y como agua clara, floja y ruidosa, algunas veces expectorada con dificultad. Bronquitis crónica, catarro bronquial, "tos de invierno," con algunos de los síntomas mencionados. Esputos claros ó acuosos como engrudo. La secreción causa dolencia y escoriación. En las formas crónicas, cuando el esputo es transparete, viscoso, voz débil, perturbación del corazón. El enfermo se agrava por habitar cerca de las costas.

CALCAREA PHOS.—En las personas anémicas en quienes la expectoración es albuminosa, como la clara del huevo.

CALCAREA SULPH.—Cuando la expectoración es amarilla, verde-amarillenta ó mezclada con sangre, en el período de resolusión. Tercer período de la bronquitis. Catarro ordinario ocasionado por el frío y en los casos semejantes para los que es benéfico *Hepar sulph.*

NATRUM SULPH.—Cuando el exudado cause escoriación y acaloramiento. El enfermo necesita sostenerse el pecho al toser. Accesos asmáticos que se agravan por la mañana. Agravación con el tiempo frío, húmedo y lluvioso.

SILICEA.—Tos que empeora con el frío, y se mejora por las bebidas calientes. Expectoración como el pus, los esputos descienden al fondo de la vasija que contenga agua y se extienden como sedimento. Afecciones brónquicas de los niños raquíticos. Tos laríngea por la mañana.

CASOS CLÍNICOS.

Numerosos casos de bronquitis, bronco-pneumonía y afecciones concomitantes del pecho, especialmente en los niños, han sido tratadas satisfactoriamente con *Ferrum phos.*, seguido por *Kali mur.* ó alternado con el mismo. Alguna veces *Bryon.* se ha encontrado un excelente remedio para alternarlo con *Ferrum phos.*; no ha sido necesario emplear otro tratamiento.

CADERA, ENFERMEDAD DE LA.

CALCAREA PHOS.—En el tercer período puede este remedio detener la destrucción ulterior del hueso y la supuración, promoviendo nueva organización.

CALCAREA SULPH.—Secreción de pus, etc.

FERRUM PHOS.—Dolor, latidos; calor é inflamación de las partes blandas.

KALI MUR.—Segundo período, cuando ha comenzado la hinchazón de los abscesos.

NATRUM SULPH.—Afecciones de la articulación izquierda de la cadera en los pacientes sicósicos, con constitución hidrogenóidea, que se empeoran por la humedad.

SILICEA.—Impide ó reprime la supuración y cura las partes enfermas. «En el tercer período, para limitar la supuración y la destrucción del hueso y para promover la nueva organización; punzadas, picazón y dolores ardorosos en lugares de poca extensión, dolor violento en las articulaciones de la cadera, en los niños escrofulosos y raquíticos.» (Arndt.)

NATRUM PHOS.—Enfermedad de la cadera en los sujetos escrofulosos.

CALAMBRES DE LOS ESCRIBIENTES.

NATRUM PHOS.—La mano tiembla mientras se escribe. Dolor calambroide. Dolor reumático en las coyunturas de los dedos. Incomodidad dolorosa en las muñecas.

KALI MUR.—Las manos se entiesan mientras se escribe.

MAGNESIA PHOS.—Frecuentemente se hace uso de este remedio con resultado satisfactorio.

CALCAREA PHOS.—Dolor como de calambre en los dedos y en la articulación carpiana.

CALCULOS BILIARES.

CALCAREA PHOS.—Para impedir que se vuelvan á formar nuevos cálculos.

MAGNESIA PHOS. —Espasmos producidos por los cálculos biliares.

CATARRALES, PADECIMIENTOS.

FERRUM PHOS.—Primer período del romadizo con desórdenes circulatorios, fiebre catarral, congestión de las membranas mucosas nasales. Escozor en los conductos nasales, agravado por la inspiración; es excelente cuando hay predisposición á resfriarse, alternándolo con *Calcarea phos.* «*Ferrum phos.* 3ª x en el catarro faríngeo, con la expectoración característica BLANCA y ESPUMOSA, nunca ha dejado de corresponderme.» (W. R. King.)

KALI MUR.—Catarro cuando hay flema blanca, espesa, no transparente. Coriza seco. Para la obstrucción del romadizo con una capa pardo-blanquizca de la lengua. Costras adherentes en la bóveda de la faringe. «Lo uso frecuentemente con provecho en el período purulento del catarro nasal agudo. *Kali mur.* me ha demostrado ser el más satisfactorio de los remedios en las inflamaciones agudas del conducto naso-faríngeo, en el que hay una sequedad ardorosa muy marcada. La apariencia es la de enrojecimiento con marcado engrosamiento, casi como si la membrana mucosa estuviese sólidamen-

te infiltrada.» (Ivins.) Gargajeo de mucosidades de los orificios posteriores. Ozena sifilítico.

CALCAREA FLUOR.—Catarro con expectoración de pequeñas masas amarillentas. Coriza seco. Obstrucción del romadizo (alternado con *Kali mur.*), cuando hay deseo infructuoso para estornudar. Ozena. Vegetaciones óseas y enfermedades de los huesos nasales, con olor mortecino y desagradable.

NATRUM MUR.—Catarros y resfríos con secreciones acuosas, transparentes y espumosas. Catarros crónicos en los enfermos escasos de sangre. El moco tiene algunas veces un gusto salado. Los resfriados son causa de erupciones vesiculares con contenido acuoso, que revientan y dejan costras delgadas. Coriza, «running cold,» con secreción espumosa, clara y acuosa, peor por la exposición al frío y por causa de algún esfuerzo. Influenza. Epistaxis por inclinarse y por toser. La parte posterior de las fosas nasales está seca. Pérdida del olfato. El Dr. Geo Herring encuentra la 1ª trit. casi infalible para detener un resfriado que comienza con estornudos. Estornudos que son peores al desnudarse en la noche y en la mañana. Vesículas febriles.

KALI SULPH.—Las secreciones amarillas, viscosas, ó una expectoración acuosa, son condiciones esenciales para el uso de este remedio. El paciente se siente generalmente peor al anochecer ó en una habitación caliente. Secreción amarilla ó amarillenta de la nariz. Resfriado con sequedad de la piel cuando

no se establece libremente el sudor bajo la influencia de *Ferrum phos.*

CALCAREA PHOS.—Catarros crónicos y resfriados en las personas que se hallan en estado adinámico (como remedio intercurrente). Romadizo con una secreción albuminosa por la nariz. Estornudos y adolorimiento de las ventanas de la nariz. El Dr. L. A. Bull dice: «Frecuentemente comienzo el tratamiento de los estados crónicos catarrales de los conductos aéreos con *Calcarea phos.* Encuentro que tiene una completa y decidida acción tónica y obra favorablemente en el estado de las mucosas. En muchas ocasiones tiene efectos exactamente iguales á los de las preparaciones de «*Cinchona.*» Pólipo nasal grande y pedunculado. Enfriamiento glacial de la punta de la nariz. Hinchazón y ulceración de la nariz en los niños escrofulosos.

CALCAREA SULPH.—Romadizo con secreción purulenta, opaca, amarilla, espesa, teñida frecuentemente con sangre. Va desembarazando el estado de las glándulas mucosas. Hemorragia nasal.

NATRUM PHOS.—Como un remedio intercurrente cuando aparecen síntomas gástricos, tales como acedías y lengua amarilla en su base. Picazón en la nariz. Catarro naso-faríngeo con mucosidad amarilla y espesa, especialmente en el ozena escrofuloso. Olor desagradable de la nariz.

NATRUM SULPH.—Hemorragia de la nariz durante el período menstrual. Ozena sifilítico, peor cuando cambia el tiempo de seco á húmedo. Catarros de las

membranas mucosas en general, caracterizados por una tendencia á la secreción profusa de mucosidades verdosas. Este es el remedio de los tejidos para *la grippe*, desde que la enfermedad es causada por un exceso de agua en los fluidos celulares.

KALI PHOS.—Para el ozena con secreción fétida por la nariz, aliento fétido, y cuando existan trastornos nerviosos secundarios. Epistaxis y predisposición para la misma. Al sonarse se arrojan unas costras amarillas por la nariz. Secreción amarilla y espesa; estornudos por la más ligera exposición al aire. Gargajeo de mucosidades espesas por los orificios posteriores de las fosas nasales.

MAGNESIA PHOS.—Pérdida ó perversión del sentido del olfato. Coriza seco y fluente alternativamente. Las secreciones por las ventanas de la nariz son muy fluidas y abundantes.

SILICEA.—Ozena con secreción de mal olor por la nariz, cuando la afección está localizada en el tejido conectivo submucoso ó en el periostio. (También se aplican jeringatorios con una solución del mismo remedio). Sequedad crónica y dolorosa de la nariz, ó ulceración inveterada, produciendo secreción acre y corrosiva; erupción herpética alrededor de las ventanas de la nariz y de los labios. Escozor en la punta de la nariz.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. H. Goullon (*Pap. Zeits chrift*) elogia el *Natrum phos.*; en el catarro crónico post-nasal, sirviendo como indicaciones para darlo,

la exudación amarillo-brillante y la lengua amarilla, etc., y refiere un caso curado por *Natrum phos.* 5ª después de que había fallado *Kali bich.* y algunos otros remedios y que el paciente se había vuelto hiponcodríaco. El siguiente caso se refiere á una ozena de muy mal olor, espeso, amarillo, alternando con secreción acuosa, ozena que había durado ya diez y ocho meses; la enferma había perdido el gusto y el olfato; los síntomas eran peores en la ventana izquierda de la nariz. El flujo catamenial se presentaba cada tres semanas. Se resfriaba muy fácilmente. Tres años hacía que tuvo un aborto. La dí tres dosis de *Kali sulph.* 12ª para que disuelta en agua tomase una vez á la semana. Al cabo de un mes manifestó estar enteramente bien del catarro; se recobró mucho de la pérdida de los sentidos del gusto y del olfato. (Dr. W. P. Wesselhaft.).

El Dr. Breuer, de Munich, refiere un caso de supresión del sudor de los pies, y como resultado de esto un catarro bronquial prolongado, curado por *Calcarea sulph.* y *Silicea.—A. H. Z.*, 1883.

Se trata en este caso de un caballero de complexión débil. Hacía una semana que tenía una acumulación de pus semi-líquido, espeso, de color moreno-obscuro, formado en la parte superior de la ventana izquierda de la nariz; al ser expelido despedía un terrible mal olor. Cerca de un mes antes le fué sacado un fragmento de hueso cariado del antro de Highmoro, al través de uno de los alveolos, superiores del lado izquierdo, y del que había sido extraído un diente cuatro años antes. La tienta penetraba libremente en el antro. *Calcarea, Silicea* y otros varios remedios pusieron de manifiesto su ineficacia. Tres semanas después, habiendo tomado dos dosis de *Kali sulph.* 6ª en agua, una cucharada sopera en la mañana y otra en la tarde por espacio

de cuatro días, no quedaba nada de secreción, y el alveolo se cerró tanto que la tienta no penetraba. (Dr. W. S. Wesselhoeft.)

NATRUM MURIATICUM.—El Dr. Louis Bull hace memoria de un caso de rino-faringitis atrófica en la que estaba la piel «descolorida, seca, con apariencia como la del pescado y profusamente sembrada de manchas con vegetaciones grandes y pequeñas. Se acordó, dice, de los experimentos de Boussingautl al privar de la sal á los animales, y opinó que se trataba aquí de un caso en el que el cloruro de sodium no era propiamente asimilado. Lo usó localmente en diez granos para una onza de solución, y al interior en forma dinamizada, con los más satisfactorios resultados.—*Hom. Recorder.*

CEFALALGIA.

FERRUM PHOS.—Dolor de cabeza por el frío, el calor del sol; dolor contusivo, presivo ó punzante, dolores que empeoran al inclinarse ó moverse. Dolor de cabeza por predisposición gotosa (alternándolo con *Natrum sulph).* Dolor de cabeza con vómito de de alimento sin digerir. Dolor congestivo, con presión y sensibilidad al tacto. Oprimiendo un objeto frío contra el sitio del dolor parece aliviarse éste. Si se presenta la lengua saburrosa, esta es una indicación más para su empleo. El dolor de cabeza de los niños requiere este remedio. Cefalalgia con una sensación de latidos; peor en el lado derecho. Cefalalgia con cara roja y enrojecimiento de los ojos.

Dolor de cabeza acompañado de náusea y ceguera, con vómito de alimentos no digeridos. Dolor de cabeza obtuso que invade todo el lado derecho desde el vértice á la región supraorbital del lado mencionado. Agolpamiento de sangre á la cabeza. Las cefalalgias empeoran por el acto de sacudir de la cabeza, por inclinarse, y realmente por cualquier movimiento del cuerpo. Cefalalgias congestivas, especialmente en el período menstrual. El vértice de la cabeza está sensible al aire frío, al ruido, á la vibración, no se puede consentir ni aun que se toquen los cabellos.

KALI MUR.—Dolor de cabeza con vómito, expectoración de mucus blanco de color lechoso. Cefalalgia acompañada de náusea con capa blanca de la lengua, ó vómitos de flema blanca, ocasionada por pereza en las funciones del hígado, lengua con saburra gris ó blanca en la base, falta de apetito.

KALI PHOS.—Dolor de cabeza con estado nervioso, sensibilidad para el ruido, irritabilidad, confusión, y alivio por un movimiento suave. Dolor de cabeza de los estudiantes y de todos aquellos que se sienten consumidos por la fatiga, cuando no se manifiestan síntomas gástricos. La lengua se encuentra algunas veces con una capa amarillo-morena color de la mostaza, asociada frecuentemente con fetidez del aliento. Dolores y pesadez en la parte posterior de la cabeza y al través de los ojos, MEJORÍA MIENTRAS SE TOMA ALIMENTO, con sensación de cansancio y agotamiento (después de Ferrum phos.)

Dolor de cabeza nervioso, con incapacidad para pensar, pérdida de fuerzas, irritabilidad, falta de sueño ó desaliento. Dolor de cabeza con cansancio, bostezos y pandiculaciones, sintiéndose postrado; cefalalgias histéricas. Cefalalgia con una sensación de lasitud, vacuidad, «desfallecimiento» en la boca del estómago; también si el dolor de cabeza es precursor de un ataque acompañado con vómitos biliosos. Dolor de cabeza neurálgico, zumbido en los oídos, se siente incapaz de permanecer en pie, sin embargo se mejora bajo la influencia de un estímulo placentero. Dolor de cabeza neurálgico con síntomas nerviosos, que mejora durante la comida; depresión. Ruidos en la cabeza al quedarse dormido. Cefalalgias de origen menstrual acompañadas de hambre. Dolor intenso en el mastoide izquierdo; peor por el movimiento y al aire libre.

KALI SULPH.—Cefalalgia que aumenta en una habitación caliente y al anochecer, y se mejora en el aire libre, fresco.

MAGNESIA PHOS.—Dolores de cabeza atormentadores con tendencia á los síntomas espasmódicos. Cefalalgias nerviosas ó reumáticas, dolores lancinantes y penetrantes, dolor que se presenta en paroxismos con carácter variable é intermitente. Cefalalgia por trastornos ópticos. Cefalalgia nerviosa con chispas delante de los ojos; diplopia. El dolor de cabeza es peor en el occipucio, y ES CONSTANTE MIENTRAS SE ASISTE Á LA ESCUELA y después del trabajo mental.

NATRUM MUR.—Dolor de cabeza obtuso y pesado con lagrimeo profuso y somnolencia; el sueño no es reparador. Dolores de cabeza acompañados de constipación debida á entorpecimiento y sequedad de la porción interna de la membrana mucosa, cuando la lengua está limpia ó cubierta de mucosidad clara y acuosa, con los bordes espumosos y mucha saliva. Dolor de cabeza con vómito de agua ó flema transparente, expulsando con esfuerzo un moco filamentoso. «Es aplicable á las personas caquécticas y á aquellas que han perdido fluidos animales. Se adapta á los estados crónicos y á la cefalalgia acompañada de náusea; á los dolores de cabeza que se presentan antes, durante y después de la menstruación; «para la cefalalgia de las jóvenes educandas que se aplican con demasiado ahinco á sus lecciones;» para el dolor de cabeza que comienza en la mañana después del paseo, dura hasta el medio día, ó desaparece con el sol; para la cefalalgia catarral y para la jaqueca.» (King.) Hemicránea, pérdida del conocimiento y sacudidas de los miembros.

NATRUM SULPH.—Dolor de cabeza acompañado de náusea con diarrea biliosa ó vómito de bilis, sabor amargo en la boca. Dolor cólico con vértigos, capa gris-verdosa de la lengua. Los ataques tienen lugar durante los períodos menstruales, son periódicos en cada primavera, y frecuentemente imprevistos en su invasión. Los síntomas característicos son: congestión de sangre á la cabeza, con sensación de plenitud; calor en el vértice; sensación de presión

en el interior de la cabeza; depresión mental y melancolía, vértigo y pesadez; vómitos, agravados por el movimiento y la lectura, mejorados por la quietud. Cefalalgia occipital. Dolores violentos en la base del cerebro como si apretasen la cabeza con un tornillo ó como si alguna cosa estuviera allí royendo. Dolor pulsativo en ambas sienes cuando se anda. Dolor indescriptible en el vértice de la cabeza, como si fuera á estrellarse. Cefalalgia pulsativa. Dolor de cabeza que comienza en la mañana al despertar, aumentando hasta el medio día y se calma cerca del tiempo en que se acuesta. No se puede tolerar el ruido. Tiene que acostarse en una habitación obscura. Náusea y vómito. Casos intensos de cefalalgia crónica con estos síntomas, son relatados por el Dr. A. M. Duffield, de Huntsville, Ala., como habiendo sido curados por este remedio á la 200ª potencia.

SILICEA.—Cefalalgias con la apariencia concomitante de pequeñas protuberancias ó nódulos del tamaño de un guisante, sobre el cuero cabelludo. Cefalalgias congestivas, gástricas, nerviosas y reumáticas. Dolores de cabeza por excesivo esfuerzo mental, por acaloramiento, por agotamiento nervioso. Diátesis escrofulosa. Raquitismo y estado anémico, caries. En las personas nerviosas, irritables, con piel seca, salivación profusa, diarrea y sudores nocturnos. Personas enfermizas con piel fina, cara pálida, complexión delicada, músculos laxos. En los individuos sumamente sensibles, que tienen una nu-

trición imperfecta, no por la falta de alimento, sino por asimilación defectuosa.

NATRUM PHOS.—Dolor de cabeza sobre la coronilla al despertar por la mañana; aspecto cremoso de la parte posterior del paladar; lengua húmeda y amarilla. Cefalalgia, dolor intenso como si el cráneo estuviese demasiado lleno. Cefalalgia frontal ú occipital, con náusea ó vómito ácido y viscoso. Cefalalgia muy dolorosa con calor y presión intensa en el vértice como si fuera á abrirse (si no ha sido suficiente *Ferrum phos.)* Dolores de cabeza desgarradores, expulsión de espuma ácida. Cefalalgia después de tomar vino ó leche.

CALCAREA PHOS.—Cefalalgia con una sensación de frialdad en la cabeza, la que se siente fría al tacto (Ferrum phos.) Los dolores empeoran con el calor ó el frío. Dolores de cabeza en los NIÑOS Y EN LAS JÓVENES ESCOLARES que están nerviosas, inquietas, etc. «Es conveniente para los dolores de cabeza gástricos y reumáticos. La caracteriza el vértigo cuando anda ó al moverse. Plenitud y presión en la cabeza, peor por la opresión del sombrero. Es útil en los niños enojadizos y coléricos, y en aquellos en quienes permanecen largo tiempo abiertas las fontanelas. Dificultad en ejecutar operaciones mentales. Mal humor y falta de disposición para hacer alguna cosa. Olvido; entorpecimiento con cada acceso de cefalalgia.» (King.)

CALCAREA SULPH.—Cefalalgia con vértigo y náusea, y sensación como si los ojos estuviesen hundi-

dos. Dolor alrededor de toda la cabeza, peor en la frente.

CASOS CLÍNICOS.

El enfermo, entre otros síntomas, tenía algunos desórdenes visuales, y cuando la cefalalgia era peor y la visión más perturbada, tenía una sensación de temor, especialmente en la noche, y una erupción alrededor de los tobillos, la que comenzaba con escozor. Le dí *Nat. phos.* 6ª x y esa fué la que puso fin á sus padecimientos. (Dr. Chas. Mohor.)

Un caso muy interesante vino á someterse á mi tratamiento. Una señora, de cincuenta y cinco años de edad, tenía una cefalalgia de tal modo atormentadora, que casi se volvía loca; pretendía que su cerebro estaba hecho pedazos y se le salía por los ojos, los que exudaban una materia concreta de color amarillo-gris. Había estado padeciendo por algunos días. La dí *Kali. phos.* 3ª x que obró como por encanto. A las dos horas se repitió la dosis, y el resultado fué el completo alivio. Como unas cuatro semanas después tuvo otro ataque, pero no tan intenso. La dí *Kali. phos.* á la 6ª x, y deseando observar el caso, la cité á las dos horas. "Dijo: Esa no era la misma medicina que me habeis dado antes; la acción es apenas perceptible." Entonces le administré la 3ª x, y á las dos horas estaba bien. Ahora bien, siempre he obtenido resultado de las altas potencias, pero esta experiencia parece indicar que la *cantidad* entra como un factor; si esto es así, se notará que una dosis de la 3ª x es igual á una milésima de la 6ª x (Caso escogido).

1. Dolor de cabeza intenso, dolencia general del vértice y del cuero cabelludo, no puede tolerar que se le toque el cabello, mucha excitación nerviosa por la noche. *Ferrum. phos.* 6ª x produjo un alivio rápido.

2. Cefalalgia frontal, la que era seguida para aliviarse, de hemorragia nasal. *Ferrum. phos.* 6ª x curó.

3. El paciente no podía ver; parecía como si se le agolpase la sangre en los ojos. *Ferrrum. phos.* 6ª x curó.

4. Dolor obtuso en el vértice de la cabeza durante la menstruación,

curado como por arte mágico en unas cuantas dosis de *Ferrum phos.* (Raue, *Rec. Hom. Lit.*, 1875.)

5. Dolor de cabeza comenzando cada noche á las diez con calofrío ó síntomas congestivos. *Magnesia phos.*, 10ª x dil., curó. (Traducido por S. L.)

Caso de una joven con cefalalgia atormentadora, sensibilidad considerable para el ruido, durante el segundo día de la menstruación. *Kali. phos.* 12ª produjo, inmediatamente después de tomarlo, un grande aumento del flujo menstrual con alivio repentino del dolor de cabeza. (Dr. W. P. Wesselhoeft, De Hg.)

M. K., de 16 años, ha sufrido por algunos años de cefalalgias que volvían periódicamente. El dolor estaba reconcentrado en la sien derecha, y era de un carácter taladrante, como si se introdujese un tornillo por fuerza—según la expresión de la misma enferma. Precediendo este dolor había sensaciones ardorosas en la boca del estómago, gusto amargo en la boca y lasitud. Estos síntomas sólo eran sentidopor la noche, ó en la mañana. Cuando el ataque sobrevenía, la paciente estaba completamente incapaz para atender á cualquier quehacer ordinario. Se seguían generalmente vómitos de bilis, y en seguida se declaraba la mejoría. *Natrum sulph.* diariamente, en dosis del tamaño de una judía, disuelto en agua, y tomado repetidas veces, curó á la joven enteramente. (De Schüssler).

Una joven de 16 años, sufría ya hacía algún tiempo de ataques periódicos de cefalalgia acompañada de náusea, caracterizada por dolor taladrante en la sien derecha, precedido de ardor en el estómago, gusto amargo, desfallecimiento. El dolor llegaba á su máximum por la noche ó en la mañana y era seguido de vómitos biliosos con subsiguiente alivio. *Natrum sulph.* 6ª, en dosis diarias curó, radicalmente.

CEREBRO.

Véase también Meningitis.

FERRUM PHOS.—En los primeros períodos de todos los desórdenes inflamatorios.

KALI PHOS.—Al principiar el período del reblan-

decimiento del cerebro; si se presenta con hidrocéfalo, se da también *Calcarea phos*. Reblandecimiento como un resultado de inflamación, insidioso en su aproximación. Conmoción del cerebro. Evacuaciones pútridas. Desvelo y estupor.

MAGNESIA PHOS.—Cuando se presentan síntomas convulsivos. Los desórdenes de la vista persisten después de la conmoción cerebral.

CALCAREA PHOS.—Condiciones hidrocefálicas. Hidrocéfalo crónico. Las fontanelas permanecen extensamente abiertas. Craniotabes.

CALCAREA FLUOR.—Céfalo-hematoma.

NATRUM SULPH.—Después de lesiones traumáticas de la cabeza. Trastornos mentales subsecuentes. Dolor intenso en la región occipital.

CASOS CLÍNICOS.

J. C. Morgán, en las *Transactions Pennsylvania Homeopathie Medical Society*, 1882, pág. 172, refiere algunos casos de desórdenes cerebrales en niños, en los que fueron marcados los síntomas convulsivos, y se obtuvo la curación por *Magnesia phos.* 30ª

El caso siguiente es de un caballero de edad provecta, el Sr. J. M., quien había sufrido de un ataque prolongado de inflamación aguda y subaguda del cerebro. Se recorobó lentamente; pero comenzaron los síntomas del reblandecimiento. Estaba impaciente para hacer una experiencia con los nuevos remedios. Había trastornos verbales, parecía perder momentáneamente el conocimiento, no podía andar aprisa, aun cuando se viera en gran peligro, ó se detenía temerariamente cerca del muelle, y no podía tenerse confianza en dejarlo solo: "Creo es tiempo de informaros de nuevo que hasta el presente continúa la mejoría; realmente, tengo poco de qué quejarme, excepto ocasionalmente—sólo ocasionalmente—de una sensación de estupor mental, para lo cual le

mejor remedio que he encontrado es *Kali phos*, el que me habéis recomendado." (M. D. W., de Schüssler).

CEREBRO, CANSANCIO DEL.

CALCAREA PHOS.—Postración nerviosa con depresión del espíritu; sudores nocturnos abundantes; semblante enflaquecido, pálido y descolorido; pérdida del poder viril; frialdad habitual y congestión venosa de las extremidades, por debilidad, desvelo y falta de apetito; sensaciones de entorpecimiento.

SILÍCEA.—Confusión, dificultad de fijar la atención. Genio ansioso y complaciente. La lectura y la escritura fatigan, no puede reflexionarse. Sensación de gran debilidad; sin embargo, el enfermo puede excitarse á sí mismo, tiene ánimo, pero se cansa pronto y se ve obligado á descansar. Desfallecimiento cerebral en las jóvenes escolares, se vuelven confusas durante las recitaciones, porque no pueden concentrar sus ideas. Necesidad de pensar; pero incapacidad de hacerlo.

KALI PHOS.—Para restaurar la pérdida de la energía nerviosa: Cubre el campo todo de la neurastenia.

NATRUM MUR.—Presagios tristes con falta de sueño, agotamiento después de la conversación, embarazo del cerebro.

CASOS CLÍNICOS.

Los "Remedios de los Tejidos" han sido sumamente útiles y han

manifestado, de una manera muy rápida, su acción curativa en el tratamiento de una multitud de casos de esta afección.

Los que han sido tratados con varios de los otros métodos y después por el de los "Remedios de los Tejidos," pronto ponen de manifiesto la diferencia marcada por la mejoría, y porque el padecimiento adquiere un alivio más rápido. La gran variedad de causas y los estilos y condiciones diferentes en los que al principio hallareis á los pacientes, impiden establecer cualquiera regla de conducta en el tratamiento; pero la condición principal y de mayor importancia que se trata de establecer, es el conveniente alimento para cada una de las partes y tejidos, y después satisfacer, por medio del uso de los remedios de los tejidos, las demandas más necesarias. Con el fin de suministrar la nutrición conveniente, puede ser necesario para el enfermo el cambio de los objetos que le rodean, la ocupación que le haga dichoso, el cambio de aire de perspectiva y de alimento, y en seguida reparar con los Remedios de los Tejidos, los tejidos ó fuerzas que han sido sobrecargadas por trabajo excesivo ó bajo la influencia de la alimentación y se hallan más ó menos agotados. Se establecerá un método arreglado, ejercicio regular, comidas regulares, sueño regular, y evacuaciones regulares de los intestinos y de la vejiga: esto es importante. Comunmente *Kali phos.* es un buen remedio para comenzar, consigue que la mente esté en condición favorable, y ayudado por *Calc. phos.*, *Ferrum phos.* ó *Natr. phos.*, subordinándose á las circunstancias, pronto inicia la mejoría. Luego se sigue con la *Calc. Sulph.* tan pronto como el *Phos.* ha reconstruido las celdillas nerviosas, y el *Sulph.* es necesario para completar la obra, que puede exigir de tres meses á dos años, ó más; pero puede conseguirse tan decisivamente con estos remedios y la aplicación adecuada de la higiene, cuanto es posible, para curar cualquiera enfermedad en el dominio de las medidas curativas. (Dr. T. D. Bittinger, Dayton, Ohio).

Los dos casos siguientes son tomados de mi libro de memorias en un dispensario.

Enero 23, 1893. La señora J., de diez y nueve años, estremecimientos de los párpados, agravados á las 5 P. M. todos los días, después de encender la lámpara. Las lociones en los ojos aumentaban los estremecimientos. Tiene temor de un accidente, hasta el grado de pasarle

temblores por el cuerpo; en seguida es aliviada de su estado nervioso. Paseando por la calle se dirige por el arroyo, bien por el lado derecho ó bien por el izquierdo. Carácter desconfiado, tuvo corea á la edad de doce años, durándole esta afección dos años. A los diez y siete tuvo sensación de temor por intervalos de algunos meses.

Se la prescribió *Kali phosphoricum* 4ª x, en tabletas de á un grano, cuatro veces al día.

Enero 30, mejoraron el estado mental y los vértigos. Se repitió el remedio. Ya no aparecieron de nuevo.

Junio 4. Fuí á su domicilio y me dijo que el estremecimiento, el terror y la dificultad al andar, se habían disipado durante la segunda semana de tratamiento y no habían vuelto. También estaba aliviada de los desvanecimientos, sin embargo de estar ahora, según cree, en condiciones de embarazo.

Marzo 30, Jas. C., de doce años, dolor en la pierna y brazo derechos y en la espalda. Deja caer las cosas, especialmente si se asusta. Dificultad para hablar, carácter irritable, inquieto, constipación intestinal, sueño no reparador. Había sido nervioso desde la edad de siete años, en cuyo tiempo recibió algunos puntapiés sobre la espalda. Después de un tratamiento por dos años, estuvo mucho mejor. El baño de agua salada en la parte inferior de la espina, le había sido provechoso. El último ataque hacía un mes que se le había presentado. Se le prescribió *Kali phosphoricum* 4ª x., y fué sostenido el uso de ese remedio con mejoría continuada.

Mayo 4. Manifestaba estar mejor cada vez, exceptuando una incapacidad accidental para asir las cosas con la mano derecha; agravación en la mañana, lográndose la mejoría al medio día.

Junio 8. No tiene ningún síntoma de los ya expresados; la espina fué bañada al principio con agua salada; pero esa medida se interrumpió pasadas cinco semanas. (T. C. Wiggins).

Un labrador japonés se quejaba de que no podía ver después de las 4 P. M. Podía distinguir los objetos grandes, como un árbol ó un hombre; pero no decía si lo que arrancaba con el azadón era caña de azúcar ó yerba inútil. Sabiendo que no se observaba en él semejante estado los domingos ó días festivos, inferí que la fatiga era la causa de su

mal, y le puse *Kali phosphoricum* 6ª x, con la más satisfactoria mejoría en dos ó tres días. Pronto cesó de llamarme. (T. C. Wiggins).

El Sr. S., como de sesenta años de edad, habiendo estado sometido por algunos meses al pesado trabajo de la hacienda pública, fué afectado repentinamente en la tarde del 14 de Agosto, 1893. Parecía no tener conocimiento de sí mismo al encontrarse en un almacén á donde había ido con objeto de ayudar al trabajo.

Lo ví al día siguiente y estaba evidentemente próximo á la postración. Le aconsejé abandonara el empleo y marchase fuera para descansar un mes por lo menos. Pudo solamente abandonar la ciudad por el resto de la semana; pero aquella pequeña ausencia, y la administración de *Kali phosphoricum* 6ª x, le ayudó, para continuar con sus ocupaciones, hasta que pudo marchar y quedarse por un tiempo más largo, lo cual verificó algunas semanas después. Decía: "La medicina me fortificó de una manera asombrosa."

El enfermo de que se trata en este otro caso, llegó á California con una modesta fortuna, que perdió en especulaciones desgraciadas, acontecimiento bastante común. La ansiedad, el cuidado de los negocios y el exceso de trabajo, habían pasado sobre él por algún tiempo. Finalmente, hace cerca de tres meses, mientras se dirigía á su casa en un tren local, experimentó repentinamente una sensación peculiar en el cerebro, y perdió el conocimiento de sí mismo; pero se recobró en unos cuantos minutos, y suplicó al conductor le ayudase á bajar del tren cuando llegara á la estación; tuvo la presencia de ánimo para recordar un bulto que colocó al lado de su asiento, pero estaba todavía desvanecido y confuso. Después de llegar á su casa, experimentó un dolor espasmódico intenso en la región cardíaca, que era acompañado de abatimiento, dificultad de respirar y frialdad de las extremidades. Esto duró varias horas, y continuaba en seguida lo mismo que antes para reaparecer á las dos semanas ó más, sin ninguna mejoría, y sufriendo algunos de esos ataques varias veces en un día, con intervalos irregulares. Por último, este estado, á la vez, era acompañado por más ó menos debilidad intelectual; y, como su médico le informó que estaba sufriendo de una afección orgánica del cerebro, resultado de la apoplejía, llegó á ponerse muy abatido.

Después de tres ó cuatro semanas se mejoró un poco, pero, al eje-

cutar algún trabajo manual insignificante de su casa, experimentó una recaída; y, como su médico insistía en que le quedaban pocos días de vida, se decidió á ensayar el tratamiento de un médico ecléctico, como en tiempos pasados acudió á uno en el Este, según los consejos de su familia.

Cuando vino el enfermo acompañado de su esposa, hallamos que el caso prometía pocas esperanzas. Su edad pasaba de sesenta años, su aspecto el de un hombre de apariencia gastado, abatido, y presentando evidentes señales de agotamiento nervioso. No había parálisis; al menos, no manifestaba alguna pérdida de las funciones motrices ó sensorias, y hallamos que haciendo un esfuerzo podía llamar en su auxilio todas sus facultades intelectuales. Se quejaba de falta de sueño por las noches á consecuencia de los dolores lancinantes en el lado izquierdo del pecho y de la cara.

La prescripción fué *Kali phos.* 3ª x, para restablecer la pérdida de energía nerviosa, y *Magnesia phos.* para los dolores espasmódicos.

Administramos cinco granos para un medio vaso grande lleno de agua; cada substancia medicinal sería disuelta en un vaso separado, y se le daría alternativamente una cucharada pequeña cada hora durante el día hasta el tiempo de acostarse. Al cabo de una semana volvió el enfermo por más medicina, observándosele una marcada mejoría. El agotamiento, el aspecto abatido del semblante se había cambiado en una expresión de alegría y de confianza. Dijo estar mejor; sin embargo, había sentido un ataque espasmódico después que comenzó la medicina, y ahora podía andar de acá para acullá y hacer ligeros esfuerzos sin llegar á fatigarse, durmiendo bien toda la noche. A la semana siguiente su esposa lo notó tan sano como nunca lo había estado.—Editor *California Medical Journal*

CIÁTICA.

KALI PHOS.—Afección del nervio ciático, el que se extiende desde la cara posterior del muslo á la rodilla, dolor de tirantez, adormecimiento del miembro, rigidez, gran desasosiego y dolor, agotamien-

to nervioso, falta de estímulo para mover el miembro, produce alivio el movimiento suave por un tiempo dado, tipo neurasténico.

NATRUM SULPH.—Ciática cuando existen los síntomas constitucionales de la gota. Dolor en la articulación de la cadera, peor cuando se levanta de un asiento ó al moverse en la cama.

MAGNESIA PHOS.—Ciática con dolores espasmódicos y atormentadores, aliviada por el calor.

NATRUM MUR.—Dolor de tensión en la articulación derecha de la cadera y en la rodilla, de un carácter remitente, CONTRACCIÓN DOLOROSA DEL TENDÓN DE LA CORVA, miembro enflaquecido y doloroso al tacto, se renuevan ó aumentan los dolores al recostarse, aunque no faltan de día, toman mayor aumento hacia las 12 a. m., se alivian por el calor.

CASOS CRÓNICOS DESPUÉS DE LA QUÍMICA.

SILICEA.—Ciática, casos crónicos. El dolor empeora por el movimiento. Dolor en las caderas. Las pantorrillas se sienten demasiado cortas al andar.

CALCAREA PHOS.—Reptación y temblor con el dolor. Los ataques vuelven en el tiempo de fríos. Dolor vivo y desgarrante en el hueso de la cadera.

CASOS CLÍNICOS.

El Sr. B. ha estado padeciendo hace siete meses de ciática en la pierna izquierda; el dolor era muy intenso y destruía rápidamente su salud; había sido tratado todo este tiempo por un médico muy

experimentado, y casi fueron ensayados todos los remedios conocidos, hasta que el mismo doctor abandonó el caso y dijo que no podía hacer nada más de lo que había hecho. Fuí llamado; encontré al enfermo sufriendo de un dolor tensivo y obtuso, extendiéndose á toda la longitud del nervio ciático de la pierna izquierda, empeorando al más ligero movimiento; preparé una pequeña cantidad en polvo de *Kali phos.* 6ª x, en medio vaso de agua, y le dí una cucharadita cada diez minutos por espacio de una hora, en ese tiempo se mejoró el dolor; entonces se durmió el enfermo hasta la mañana siguiente. La próxima noche volvió el dolor; le dí el mismo remedio, sin éxito. La noche que se siguió le dí *Kali phos.* 12ª, y muy pronto se alivió del dolor; continué con ese mismo remedio cada dos horas, una dosis de polvo en seco por una semana, y luego cuatro veces al día por término de un mes; una sola vez durante ese tiempo tuvo un ligero ataque, el que fué prontamente detenido, poniendo una dosis del polvo en medio vaso de agua, y dando una cucharadita cada diez minutos por algún tiempo. Ha pasado un año y no ha vuelto á sentir esa molestia. (Dr. G. H. Martín).

Una señora, que había sido traída á su domicilio después de una reunión en el campo, la encontré sufriendo de un dolor intenso hacia abajo del nervio ciático. Había alguna fiebre y sensibilidad excesiva al tacto y al movimiento. El dolor la hacía gritar al más ligero movimiento. La lengua tenía una capa amarillo-verdosa. La dí *Ferrum phos.* 200ª y *Natrum sulph.* 200ª en agua alternativamente. Al día siguiente pudo moverse sin mucho dolor, y estuvo capaz de cambiarse por sí misma de un lado á otro de la cama. Al tercer día pudo levantarse, y pronto entró en convalecencia. (E. H. H.)

CÓLERA.

FERRUM PHOS.—En el primer período, para los desórdenes vasculares, alternando con *Kali phos.*

Cólera infantum, evacuaciones frecuentes, acuosas, aún sanguinolentas; el niño está muy cambia-

do, cae en estupor, la cara roja, las pupilas dilatadas, suave movimiento rotatorio de la cabeza, pulso lleno y ondulante, cólera por supresión de la transpiración.

KALI PHOS.—Cuando las deposiciones tienen el aspecto de agua de arroz. Colapso, semblante lívido, cianótico y pulso débil.

KALI SULPH.—Calambres y otros síntomas de cólera.

MAGNESIA PHOS.—Para los calambres del cólera. Primer período. Diarrea acuosa con vómitos y calambres en las pantorrillas.

NATRUM SULPH.—Es, según Schüssler, el remedio para el cólera y la colerina.

CALCAREA PHOS.—Cólera infantum. Diarrea verde en los niños escrofulosos, viscosa, acuosa, sin digerir y de olor repulsivo. Cuerpo delgado; los niños tienen el aspecto de ancianos.

CASOS CLÍNICOS.

Un anciano atacado de vómitos intensos y diarrea, calambres en las pantorrillas y deposiciones como agua de arroz, se curó con *Kali phos.* (Schüssler).

CÓLICO.

MAGNESIA PHOS.—Cólico flatulento de los niños, con encogimiento de las piernas. Cólico que obliga al paciente á encorvarse doblándose; aliviado por la fricción, el calor y los eructos. Cólico en la región

umbilical. Contracciones musculares. Cólico remitente, dolor de calambre. «Cólico de los niños recién nacidos. Lo uso en casi todos los casos con éxito violento, absoluto, invariable y completo á la 30ª potencia.» (Dr. J. C. Morgan). Cólico en las criaturas pequeñas cuando su grito es entrecortado; no es causado por la nutrición. Cólico por cálculos biliares.

NATRUM PHOS.—Cólico de los niños con síntomas de acidez, tales como evacuaciones verdes de olor agrio, vomitando la leche cuajada, etc.

FERRUM PHOS.—Cólico en los períodos menstruales, con calor, bochornos de la cara y pulso acelerado.

NATRUM SULPH.—Cólico flatulento comenzando en la ingle derecha. Cólico bilioso acompañado de sabor amargo en la boca y capa pardusca ó verdemorena en la raíz de la lengua. En el cólico de plomo se dará frecuentemente este remedio en trituración de la 1ª x ó 2ª x. Dolor en el abdomen y en la cintura como de magullamiento. Mucha flatulencia. Retención de flatus. Padecimientos flatulentos después del parto, acompañados de constipación.

KALI SULPH.—Dolores parecidos á los del cólico. El abdomen se siente frío al tacto; algunas veces es causado por gran calor, por la agitación y el enfriamiento repentino; pronto, después, se escapan los gases que tienen un olor sulfuroso; se emplea este remedio si falla *Magnesia phos.*

KALI PHOS.—Cólico en el hipogastrio con urgen-

cia ineficaz para evacuar; se mejora encorvándose. Distensión del abdomen por los gases.

NATRUM MUR.—«En los casos de cólico bilioso que presentan los eructos de *Carbo verg.* y los dolores de *Diosc.* y *Coloc.* he encontrado que *Natrum mur.* presta un servicio excelente.» (C. E. Fisher).

CASOS CLÍNICOS.

Una mujer de 50 años venía sufriendo hacia dos, de gastralgia y enteralgia, los ataques le duraban varios días; en cada uno de ellos vomitaba un líquido tan agrio como el vinagre. Dos alópatas la habían tratado en vano, diagnosticando la afección como cáncer del estómago y de riñón flotante. Mi diagnosis fué exceso de secreción de ácido láctico. *Natrum phos.* La mejoría tuvo lugar á los dos días, y en unas pocas semanas estuvo completamente curada. (Schüssler).

Caso de una señora con cólico bilioso. Fuí mandado llamar en la noche, y no pude ir por motivos particulares. No obstante, le envié lo que creí que la aliviase. En la mañana temprano estaba de nuevo su esposo en mi despacho, diciéndome que no se había mejorado, sino que sufría terriblemente. Le dí un remedio diferente para que se le administrase hasta que pudiese ir allá. Pasadas cerca de las nueve y media llegué á la casa y encontré á la señora sufriendo aún dolores atormentadores. Teniendo en cuenta que había vomitado bilis y que se quejaba á la vez de un sabor muy amargo en la boca, le administré una dosis en polvo de *Natrum sulph.* en una poca de agua. Como dos minutos después de haberla tomado dijo que estaba considerablemente aliviada por la primera vez desde las once de la noche. A los cinco minutos tuvo una evacuación libre de los intestinos, y continuó la mejoría, que fué en aumento hasta la mañana siguiente.

Uno de los trabajadores infatigables del clero de la metrópoli, estuvo sujeto á ataques muy frecuentes é intensos de cólico, tomando siempre el carácter inflamatorio, vómitos violentos, gran sensibili-

dad del abdomen, desasosiego, ansiedad, sufrimiento. Estos ataques duraban generalmente de tres días á una semana. Hacía más de un año, según él aseguraba, que el *dolor comenzaba generalmente en la ingle derecha* y de este lugar se extendía sobre todo el abdomen. Le fué administrado *Natrum sulph.*, el ataque cesó inmediatamente, y aunque varias veces ha sido amenazado por él, no ha tenido cólico desde entonces. (Hering's *Materia Médica*).

CONMOCIÓN DEL CEREBRO.

KALI PHOS.—Estados asténicos, pupilas dilatadas, depresión funcional de las celdillas cerebrales como resultado de la conmoción.

FERRUM PHOS.—Desórdenes febriles dependientes de esa causa.

MAGNESIA PHOS.—Cuando se acompaña con ilusiones de la vista.

CALCAREA PHOS.—Algunas veces como un intercurrente, cuando haya sensación de adormecimiento.

NATRUM SULPH.—Efectos crónicos de caídas, y golpes en la cabeza.

CONSTIPACIÓN.

NOTA.—No es necesario recurrir á los purgantes. La constipación ocurre frecuentemente á consecuencia de algún desorden primitivo. Fíjese la atención en los síntomas de éste. El remedio adecuado hará que desempeñen sus funciones fisiológicas los intestinos. (Schüssler).

KALI MUR.—Cuando la constipación es acompañada por capa blanca de la lengua; también cuan-

do no se toleran las substancias grasas ni los pasteles. Diminución en la actividad de las funciones hepáticas, evacuaciones de color claro por falta de bilis, debida á la lentitud de las mismas funciones.

KALI PHOS.—Deposiciones de color moreno obscuro, mezcladas con mucosidades verdes amarillentas. Estado parético del colon y del recto.

NATRUM MUR.—Hemorragia después de la defecación con sensación de laceración y escozor. Constipación con mucha debilidada intestinal, y cuando es ocasionada por falta de humedad. Sequedad de la membrana mucosa de los intestinos, con secreciones acuosas en otras partes; vómitos acuosos, ojos húmedos, exceso de saliva en la boca ó sobre la lengua. Somnolencia y pirosis. Las evacuaciones son duras, secas y con dificultad para expulsarlas. Los padecimientos se acompañan de cefalalgia. Constipación hemorroidal. Proctalgia. Dolor en los anillos abdominales. «Constipación de las personas obesas, especialmente las que padecen debilidad cardíaca.» (Frawley).

CALCAREA PHOS.—Estreñimiento, evacuaciones duras con sangre, especialmente en los ancianos, acompañada de depresión mental, vértigo y dolor de cabeza.

CALCAREA FLUOR.—Insuficiencia para expeler las materias fecales.

NATRUM PHOS.—Constipación pertinaz. Constipación habitual con ataques accidentales de diarrea en los niños. Este remedio es un laxante admirable,

cuando se administra con el alimento á los niños. Dosis: de 5 á 10 granos tres veces al día para un niño de seis meses.

NATRUM SULPH.—Evacuaciones duras y nudosas estriadas con sangre, precedidas y acompañadas por escozor en el ano; expulsión difícil de las evacuaciones blandas; emisión de gases fétidos en gran cantidad. (Strong).

FERRUM PHOS.—Constipación con calor en la parte inferior del intestino, causada por atonía de las fibras musculares de los mismos intestinos. «*Ferrum phos.* está indicado en la constipación obstinada con prolapso del ano y hemorroides asociadas con anemia; cara pálida, se aborchona fácilmente, manos y pies friós, palpitación, calofrío persistente, flatulencia y plenitud del epigastrio, con gran aversión para comer la carne.» (Donaldson).

SILICEA.—El recto parece haber perdido el poder para expulsar las materias fecales.

Las heces retroceden después de haber sido expelidas en parte. Dolencia, punzadas y dolor agudo en el ano. Constipación asociada con escrofulosis crónica y enfermedades supurativas. Constipación de los niños escasamente alimentados, con cara pálida y terrosa. Transpiración copiosa alrededor de la cabeza, acompañada de enfermedades paralíticas.

CASOS CLÍNICOS.

La Sra. H., de 26 años, madre de tres niños, padecía constipación desde hacía tres meses que dió á luz su último niño. Los catárticos

no habían dado resultado. Las evacuaciones eran duras y secas, expelidas parcialmente con mucho esfuerzo, y en seguida parecía que retrocedían para adentro del recto.

Silicea 30ª curó en cuatro dosis tomadas á mañana y noche. (I. P. Johnson).

El Dr. Gross, discípulo de Hahnemann, refiere un caso muy notable de constipación crónica curado con *Natru mur.* 30ª El paciente, muchacho de 11 años, nacido de padres escrofulosos, tiene un hermano idiota, el mismo enfermo es mudo y también presenta algo de idiotismo. La pobre criatura sufría esta constipación desde que nació. Se pasaba de tres á cuatro semanas sin defecar. Después de un método curativo con *Natrum mur.* 30ª la constipación fué *enteramente curada.* (La relación completa del caso se encuentra en la *Constipación* de Strang, p. 72).

CORAZÓN, AFECCIONES DEL.

FERRUM PHOS.—En el primer período de todas las afecciones inflamatorias del corazón. Endocarditis, carditis, pericarditis, dilatación del corazón ó de los vasos sanguíneos (en alternación con *Calcarea fluor.*, el principal remedio). Palpitación del corazón.

CALCAREA PHOS.—Oclusión incompleta del agujero oval. Palpitación con ansiedad, seguida por debilidad temblorosa. Acción débil del corazón. Dolor agudo alrededor del corazón durante la inspiración.

KALI MUR.—Para aquel estado de la sangre que favorece los embolus, que obran á manera de un tapón. En la pericarditis, como remedio secundario, puede completar la curación. Palpitación por excesivo aflujo de sangre al corazón en los estados hipertróficos.

KALI PHOS.—Padecimientos intermitentes funcionales del corazón, con palpitaciones después de una fiebre reumática con agotamiento. Acción intermitente del corazón con sensibilidad morbosa y nerviosa, resultados de las emociones violentas, pesadumbre ó cuidados, debilidad del corazón, palpitación por conmoción directa, al subirlas escaleras, con cortedad del aliento. Palpitación con nervosismo, ansiedad, melancolía, falta de sueño é inquietud. Desmayos por sustos y fatigas á causa de la acción débil del corazón. Palpitación por la más ligera emoción mental ó subiendo escaleras.

KALI SULPH.—Pulso frecuente con detenciones, dolor palpitante y taladrante sobre la cresta del ileum, aversión para conversar, cara pálida. La enfermedad del corazón determina la hidropesía (también *Kali mur)*. Palpitación por efectos del calor.

MAGNESIA PHOS.—Cuando la violenta palpitación es debida á una afección puramente espasmódica. Dolores lancinantes y penetrantes en la región del corazón.

NATRUM MUR.—Palpitación con estados anémicos, sangre acuosa, hinchazones hidrópicas, etc. Palpitación con ansiedad, tristeza, etc. Pulso rápido, intermitente, con dolor de cabeza por la mañana. Hidremia y escorbuto. Movimiento agitado del corazón, sensación de constricción.

CALCAREA FLUOR.—Dilatación, ensanchamiento de los vasos sanguíneos; el principal remedio para restablecer la contractilidad de las fibras elásticas. Di-

latación del corazón con aumento de volumen del órgano. Acción débil del corazón.

COREA.

CALCAREA PHOS.—En los niños escrofulosos. Corea durante la pubertad en los muchachos de uno ó de otro sexo.

MAGNESIA PHOS.—Este es el principal remedio. Movimientos involuntarios y contorsiones de los miembros, el enfermo dirige miradas á los que le rodean como solicitando su simpatía. Debe ser este remedio seguido ó alternado con *Calcarea phos.*

SILICEA.—Cuando es debida á la presencia de lombrices, espasmos, sueño interrumpido por desvaríos espantosos, distorsión en los ojos, cara pálida, hambre canina, irritación de las ventanas de la nariz, constipación, gran sed, edema de la cara y extremidades.

NATRUM MUR.—Es conveniente para los casos crónicos, después de un susto ó de la supresión de erupciones en la cara, paroxismos de saltos involuntarios, sacudimientos del lado derecho, peores durante la luna llena, especialmente en los estados anémicos y cloróticos, con sed y fiebre.

NATRUM PHOS.—Si es debida á las lombrices, ó si se presentan síntomas de acidez. (Véase *Silicea*).

CASOS CLÍNICOS.

Caso de corea; la cara y la parte superior del cuerpo están afectadas; movimientos hacia abajo y laterales de la boca, parece que los

párpados estallan, movimiento violento de la cabeza hacia adelante, y otros movimientos irregulares. Mejoría durante el sueño, agravaciones al defecar y por las emociones; no dió resultado *Ignatia*. *Magnesia phos.*, 3ª por tres meses, produjo resultados satisfactorios; sin embargo, no curó completamente. Obrando según el consejo del Dr. Schüssler, fué administrada *Calcarea phos.* 6ª x, alternada con la Magnesia *phos.*, la primera una vez al día, la última dos veces. En un mes estaba curado el niño. (Dr. D. B. Whittier).

La paciente, coreica, se hablaba á sí misma constantemente, ó permanecía quieta en silencio caprichoso, ó transportaba las cosas de un lugar á otro y en seguida volvía á ponerlas como antes estaban, curó con *Magnesia phos.* 12ª (Dr. Sager).

H. S., de edad de 7 años. Lleva dos años de corea, causada por un susto; está pálido, delicado, anémico, bebe mucha agua, tiene algo de calentura y ulceraciones bucales con lengua blanca. *Natrum mur.* 200ª curó de una manera permanente. (Dr. C. P. Hart).

Corea curada por Magnesia phos.—Por el Dr. John H. Clarke. —Gertrudis S., de 6 años, fué admitida al "London Homeopathic Hospital," en Marzo 30 de 1887. Había padecido de corea bien desarrollada durante los ocho meses precedentes, y le habían sido administrados los remedios usuales para tal estado, durante los dos meses anteriores á su ingreso al Hospital, pero con poco resultado. No era clara la causa determinante. La niña no padecía de lombrices, y no había noticia de que hubiese sufrido algún susto. Se sabía que sus movimientos coreicos duraban todas las horas que estaba despierta, pero permanecía quieta durante el sueño. Andaba perfectamente bien y podía alimentarse por sí misma, pero su elocución era excesivamente defectuosa. La acción del corazón estaba acelerada, pero no se distinguía ningún ruido anormal. Sin embargo, algún tiempo después se percibía de cuando en cuando un ruido de soplo presistólico y suave, como si las fibras musculares del corazón participasen de los espasmos generales. Las pupilas estaban simétricamente dilatadas. Le fué prescrita *Magnesia phos.*, dos granos de la sexta trituración decimal, tres veces al día. La mejoría que siguió fué lenta, pero muy manifiesta. Disminuyeron los movimientos generales se corrigió la elocusión; la niña tomaba de buena

gana el alimento; dormía bien por la noche y perdió la expresión tan característica de padecimiento que antes tenía. En Mayo 17 no quedaban vestigios de la corea. Se le ordenaba mantenerse en pie, cerrar los ojos y conservar los brazos extendidos, lo que hacía sin dificultad. Sometida á la prueba difícil de andar con los ojos vendados, vino de un extremo á otro venciendo la dificultad. Finalmente, su facultad de expresar sus ideas, se había mejorado tanto que, siendo así que cuando ingresó al establecimiento y quería decir algo, no se le entendía, ya en esa fecha se explicaba con toda claridad. De esta manera, en siete semanas, este caso obstinado de una enfermedad, en verdad tan molesta, cedió completamente *bajo la acción de Magnesia phos.*, uno de los llamados por Schüssler "remedio de los tejidos." No le fué administrada otra medicina.—*Hom. World*, Julio de 1887.

CRUP.

KALI MUR.—Es el principal remedio para la exudación membranosa, alternándolo con *Ferrum phos.* Remedio soberano en el falso crup.

FERRUM POHS.—Se alternará este remedio con *Kali mur.;* respiración corta, oprimida y acelerada.

CALCAREA FLUOR.—Cuando no hayan sido suficientes *Ferrum phos.* y *Kali mur.* Se considera como el principal remedio para el verdadero crup.

CALCAREA PHOS.—Es útil si los precedentes fallan en su acción. «Ataques sofocativos al levantar al niño de la cuna. Parece que se suspende la respiración en el niño después que éste ha acabado de mamar ó de gritar, ó cuando lo han sacado de su cuna y entonces dirige su cabeza para atrás, se le pone la cara amoratada y se debate con pies y manos;

después del acceso queda el paciente en un estado de laxitud extrema.» (Bradford).

KALI PHOS.—Si el tratamiento se ha retardado hasta el último período, síncope; para la postración nerviosa, semblante pálido y lívido; en alternación con *Kali mur.*

MAGNESIA PHOS.—Oclusión espasmódica de la tráquea. La voz se hace chillona repentinamente; tos sofocativa.

CALCAREA SULPH.—Es útil cuando después del período de exudación se ha reblandecido la membrana dura, y existe en la garganta un moco pegajoso que causa mucha incomodidad. La tos del crup, bajo la acción de este remedio tomará el carácter catarral, y cuando se administre en tiempo oportuno impedirá algunas veces la exudación.

CASOS CLINICOS.

D. R. era un muchacho de 7 años que se veía atacado del falso crup siempre que se exponía á la acción de un viento sutil y penetrante del Nordeste, había tenido pocos años antes un ataque muy intenso de verdadero crup; este último otoño tuvo de nuevo un ataque, con fiebre y tos perruna estrepitosa. *Acon.* y Hepar, que han sido recomendados por tantos autores contra el falso crup, no produjeron cambio ninguno, por lo que ya me preparaba á ver que la afección persistiera en este muchacho por varios días, como de ordinario. Las noches especialmente eran muy agitadas, con mucha tos, de carácter áspero y duro, de suerte que sus parientes estaban muy alarmados.

Había calor seco y gran opresión. Cambié mi *Hepar sulph.* por *Kali mur.*, y lo administré cada dos horas en una dosis suficiente. Al cabo de unas cuantas dosis la tos se hizo más libre, perdió completamente el sonido de ladrido, y en todo el transcurso de la siguiente noche mi

enfermito durmió con quietud y sosiego, de tal modo que al despertar por la mañana, estaba capaz de levantarse, sintiéndose bien y completamente animado. (Schüssler).

No vacileis en dar las altas potencias en el crup, pues con frecuencia obran mucho mejor que las bajas. (E. H. H.)

DELIRIO.

FERRUM PHOS.—Cuando acompaña al delirio una fiebre elevada.

NATRUM MUR.—El delirio ocurre en cualquier tiempo, con estremecimientos del cuerpo, delirio con cambios en la idea dominante y musitación, lengua cubierta de espuma. Delirium tremens. Es el principal remedio, y si no da resultado, cambiarlo por *Kali phos.*

KALI PHOS.—Delirium tremens; terrores que se presentan en los bebedores; miedo, falta del sueño y desconfianza, discurso con divagaciones; esfuerzos para asir objetos ó huir de imágenes fantásticas. Se da alternado con *Natrum mur.*, porque este remedio restablece la consistencia normal de la substancia cerebral, la cual se halla trastornada en esta enfermedad.

CASOS CLINICOS.

Fuí consultado por los parientes de un individuo que sufría delirium tremens, al que ordené *Natrum mur.*, remedio con el que se obtuvo una completa y rápida curación. *Natrum mur.* es el principal remedio, cuando el delirium tremens es causado por un trastorno del equilibrio de las moléculas de esa sal, y de las de agua en algunas porciones del cerebro. (Schüssler).

DENTICIÓN.

FERRUM PHOS.—Dificultades de la dentición acompañadas con calentura, bochornos, ojos brillantes, pupilas dilatadas, y extremo desasosiego é irritabilidad.

MAGNESIA PHOS.—Convulsiones sin fiebre, durante la dentición, en alternación con *Ferrum phos.* «En los casos convulsivos, donde parece indicada *Bellad.*, y sin embargo no da resultado, cuando haya cólico espasmódico y soltura de los intestinos, este es un magnífico remedio.» (Dr. G. C. Morgan).

CALCAREA PHOS.—El principal remedio en los desórdenes de la dentición. Si la evolución dentaria aparece demasiado tardía, se administrará para apresurar su desarrollo. Es el remedio para los padecimientos molestos durante el período de la dentición. Es útil especialmente en los niños enflaquecidos, de carnes blandas, con las fontanelas posteriores abiertas. El niño no hace por aprender á andar ú olvida el hacerlo y pierde las carnes. Tiene saliveo, diarrea parecida al pus, y vómitos.

NATRUM MUR.—Cuando el niño babea mucho, tiene un verdadero flujo de saliva.

SILICEA.—Conviene especialmente para los niños que tienen grande la cabeza, las suturas abiertas, mucho sudor en la cabeza, abdomen abultado, piel fina, exceso de sensibilidad, nutrición imperfecta, debida á una asimilación defectuosa.

CALCAREA FLUOR.—Este remedio también facilita

mucho la dentición. Vómitos durante la evolución dental. Mala nutrición de los huesos, especialmente de los dientes. «Espasmos; comienzan por suspensión de la respiración, gritos incesantes y pérdida momentánea del conocimiento.» (Dr. G. W. Ward).

CASOS CLINICOS.

Caso de vómitos de alimentos y bebidas durante la dentición, diarrea lientérica de leche coagulada con pedacitos verdes y muchos gases de mal olor. Durante el sueño humedece la almohada con sudor, cabeza pequeña. *Calcarea phos.* 2ª, curó. (*Raue, Record*, 1873).

Dentición.—Niño de 18 meses de edad; piel caliente, mejillas muy abochornadas, ojos brillantes, pupilas dilatadas y desasosiego é irritabilidad extremas. *Ferrum phos.* 6ª trit. x en agua cada hora. La primera dosis tuvo un efecto calmante bien marcado, el niño se durmió pronto, después de tomarla y las mejillas perdieron algo su color encendido. Algunas otras dosis del remedio, hicieron desaparecer enteramente todos los síntomas de la irritación dental. (Wilde).

He tenido muchos casos de esa molesta afección en los niños, que he curado fácilmente con *Magnesia phos.* y *Calc. phos.* Para beneficio de los jóvenes prácticos, añadiré que generalmente impido el incidente de esa molestia, tratando á la madre de la manera siguiente: Tan pronto como tengo conocimiento de que una de mis clientes habituales ha llegado al quinto ó al sexto mes del embarazo, ordeno á la mujer que se halla en ese caso, que tome por mañana y tarde una dosis de *Calc. phos.* 3ª trit. x. Los resultados que he obtenido son: primero, impedir la degeneración frecuente de los dientes de la madre; y segundo, conseguir que la dentición del niño sea más pronta y sin molestia ninguna. (Dr. E. A. de Cailhol).

DESVANECIMIENTO

Cuando el desvanecimiento ó vahido ocurre en las personas nerviosas, quienes, sin tener algunos

síntomas activos de dispepsia, no asimilan bien la porción nutritiva del alimento. *Calcarea phos.* 1ª x, administrada después de las comidas, da muy buenos resultados. (C. R. Fleury).

DIABETES MELLITUS.

NATRUM MUR.—Poliuria, sed inextinguible; extenuación, pérdida del sueño y del apetito; gran debilidad y desaliento.

NATRUM SULPH.—Este es el principal remedio. Schüssler da como una razón especial para su uso la DEFICIENCIA DE LA SECRECIÓN PANCREÁTICA.

KALI MUR.—Orina excesiva y azucarada. Gran debilidad y somnolencia.

KALI PHOS.—Los síntomas para los que este remedio puede darse intercurrentemente, son: postración nerviosa, debilidad, falta de sueño y hambre exagerada; restablece la función normal de la médula oblonga y del nervio neumogástrico, que obran sobre la digestión ó sea en el estómago y sobre los pulmones.

FERRUM PHOS.—Diabetes, cuando haya un pulso acelerado ó cuando exista dolor, calor ó congestión en cualquiera parte del sistema, como remedio intercurrente.

CALCAREA PHOS.—Poliura con debilidad, mucha sed, sequedad de la boca y de la lengua, abdomen hundido y blando; deseo de comer tocino y sal. Glicosuria, cuando los pulmones están interesados.

CALCAREA SULPH.—Schüssler dice que este remedio tal vez pueda ser útil para esta enfermedad, lo mismo que *Kali sulph.*

NOTA REFERENTE Á LA DIABETES.

Un autor explica como sigue el tratamiento bioquímico de la diabetes:

El *ácido láctico* está compuesto de *ácido carbónico* y agua, y necesita separarse de esta manera para llegar á los pulmones. Esto se verifica en virtud de la acción catalítica del *Fosfato de sodio* en la sangre. Cualquiera deficiencia de *este fosfato* causará un desorden en el agua contenida en el sistema, dando lugar á la acumulación de un exceso de *ácido láctico*, y entonces la naturaleza, en sus esfuerzos para eliminar el agua, producirá los síntomas de la diabetes.

Toda vez que una falta de *Fosfato de sodio* es la causa principal de la diabetes, el remedio capital es el mismo *fosfato*, porque él regulariza la provisión de agua en la sangre. El *fosfato de sodio* suministra también el oxígeno, tan necesario para el proceso de la descomposición del azúcar, y de este modo impide su llegada á los riñones; y también sirve para adelgazar su consistencia normal en la bilis que se hace espesa por la falta de *fosfato de sodio.*

Si se tiene un caso de diabetes avanzada á un grado considerable, los riñones estarán inflamados por el paso á través de ellos del *ácido láctico* y el

azúcar. Esta lesión del tejido renal obra sobre los corpúsculos rojos de la sangre por la acción del *fosfato de hierro*, el que en la mayoría de los casos causará una deficiencia en aquella sal orgánica.

La naturaleza, en sus esfuerzos para proveerse del hierro, atraerá probablemente el *fosfato de potasa* sobre el fluido nervioso, el que será también rápidamente consumido, y el paciente sufrirá de postración nerviosa.

En consecuencia, el tratamiento para la diabetes mellitus, es: el uso de los *fosfatos de Sodio, de Hierro*, y de Potasio, y también el *sulfato de sodio*. Para el gran desorden funcional de los centros nerviosos causado por la demanda hecha en la sangre del *fosfato de potasio*, la que se revela por la falta de sueño y el hambre voraz, el remedio infalible en este caso es la misma sal de *fosfato de potasio*. Establece la acción de las funciones normales de la médula oblonga y del nervio neumogástrico, los que obran luego sobre el estómago y los pulmones.

Para la sed excesiva, la extenuación y el desaliento, se da *Cloruro de sodium*, que distribuye uniformemente el agua en el sistema y restablece prontamente el estado normal.

Pueden mezclarse los fosfatos cuando están dos ó más indicados; pero el *Sulfato de sodio* y el *Cloruro de sodio* se darán en solución separada. Donde hay gran extenuación ó falta de apetito, se dará el *Fosfato de calcio*, una pequeña dosis después de cada comida.

En mi opinión, la dieta no es sino de poca importancia en el tratamiento de la diabetes, excepto lo que corresponde á la cantidad de alimentos tomados. El objeto principal es que se digiera el alimento. Los pacientes diabéticos nunca comerán con exceso, vale más que tomen alimento, con moderación, seis veces al día y no una sola con exceso.

Además, el régimen de carnes ó alimentos grasos no puede ser provechoso, por el hecho importantísimo de que ocasiona un exceso de trabajo al hígado, causa una deficiencia y una condensación consiguiente de bilis y mucus, y algunas veces una cristalización de colesterina en el conducto biliar, lo que da lugar á los síntomas llamados cólico hepático, ictericia, cefalalgia biliosa.

CASOS CLINICOS.

El Dr. E. B. Rankin refiere un caso de diabetes insipidus en el que, bajo la influencia *de Natrum* phos. 6ª x, se mejoró la sed, el apetito y las fuerzas en general, así como la cantidad de orina. Sin embargo, no fué permanente el resultado obtenido en este caso. (*Southern Journal of Homœopathy*, Abril, 1886.)

Schüssler da noticia de dos curaciones de esta enfermedad, que le comunicaron de Escocia, y una, en la que un doctor Italiano empleó con felicidad el *Natrum sulph.* en la diabetes. Los detalles son escasos.

He tenido ocasión de tratar muchos casos de esa afección que considero de origen nervioso. El tratamiento que siempre me ha correspondido ha sido invariablemente *Natrum sulph.* y *Magnesia phos.* á la 6ª trit. x.; la duración del tratamiento ha sido de cuarenta y ocho horas á una semana, una dosis de cada una de estas sales, alternadas cada hora (Dr. E. A. de Cailhol).

La Sra. M., de 42 años, me consultó, manifestando que expelía casi cuatro galones de orina en veinticuatro horas; su peso específico era de 1,040. Tuve noticia de que esa enfermedad era ocasionada por un choque nervioso (onanismo conyugal). Curé ese caso en tres meses con *Natrum sulph.*, *Natrum phosph.*, *Kali phos.* y *Magnesia phos.*, administrados conforme á los síntomas que tenía que combatir. Habiéndola visto tres años después, observé que la curación era completa y no había señal alguna de recidiva (Dr. E. A. de Cailhol).

DIARREA.

FERRUM PHOS.—Diarrea por un estado de relajación de las vellosidades ó de los folículos absorbentes de los intestinos que no toman la cantidad ordinaria de humedad. Deposiciones de alimento sin digerir, ocasionadas por un resfriado que comienza con fiebre. Prolapsus recti. «Dolor sin intermitencia. Diarrea copiosa, acuosa, violenta, dolorosa, acompañada con frecuencia de vómitos.» (Guilbert). Diarrea en los niños, deposiciones acuosas, mucosas, verdes y frecuentes; el niño imprime movimientos rotatorios á su cabeza y suspira; cara angustiada, ojos entreabiertos; orina escasa, pulso y respiración acelerados, subsaltos musculares durante el sueño. Evacuaciones de alimentos no digeridos, la piel está caliente y seca, y hay sed. Dentición.

KALI MUR.—Diarrea después del uso de alimentos grasos, pasteles, etc. Evacuaciones claras, amarillentas, ó deposiciones de color de ocre ó de arcilla. Diarrea en la fiebre tifoidea; deposiciones semejantes al ocre amarillo claro. Deposiciones blancas ó

viscosas, con la característica capa blanca de la lengua.

DEPOSICIONES SANGUINOLENTAS ó viscosas.

KALI PHOS.—Diarrea fétida, acompañada frecuentemente por otras enfermedades, para curar las condiciones que son la causa de las evacuaciones pútridas. Diarrea de olor fuerte, ocasionada por sustos y otras causas semejantes. Diarrea con depresión y agotamiento de los nervios, con ó sin dolor. Evacuaciones como agua de arroz. Prolapsus recti. Timpanitis. Deposiciones pútridas, como agua de arroz, sanguinolentas, de olor corrompido. Expulsión ruidosa de gases fétidos. Deposición imperiosa, profusa é indolente mientras se toma el alimento, seguida por una urgencia no satisfecha para defecar. El recto se siente quemado y dolorido; prolapso del mismo.

NATRUM MUR.—Diarrea con deposiciones espumosas, acuosas y viscosas. Diarrea transparente, pegajosa, ocasionada por el uso excesivo de la sal. «*Natrum mur.* es un remedio que se usa especialmente para la diarrea crónica de los niños. El enflaquecimiento del cuello, el aspecto grasiento de la cara, y los deseos y aversiones peculiares suministran las principales indicaciones.» (Bell & Laird). Capa viscosa de la lengua con burbujas pequeñas de saliva sobre la punta.

NATRUM PHOS.—Escozor, dolor y ulceración en el ano. Deposiciones blancas ó verder por falta de bilis. DIARREA CAUSADA POR EXCESO DE ACIDEZ; las de-

posiciones son verdes y tienen un olor agrio, con capa amarilla y cremosa de la lengua. Vómito de líquido agrio ó de masas cuajadas. Diarreas de verano combinadas con una falta de poder digestivo, en que las deposiciones son ya color de arcilla ó comunmente verdiosas. También cuando en los niños de poca edad hay constipación habitual con ataques accidentales de diarrea. «Masas gelatinosas de mucosidades expulsadas con dolor y grandes esfuerzos, compuestas de caseina coagulada, cortas y frecuentes.» (Guilbert). Diarrea por irregularidades en la alimentación.

NATRUM SULPH.—Diarrea; deposiciones acuosas, obscuras, biliosas, ó de bilis verde. «Este es uno de los remedios más frecuentemente indicados en los casos de diarrea crónica, cuando la principal indicación es la deposición suelta por la mañana. Los síntomas flatulentos son muy característicos, pero no se presentan necesariamente. Agravación en el tiempo húmedo. Diarrea verde en la escarlatina. Erupciones como de verrugas en los brazos y entre los muslos. Relajación crónica hereditaria de los intestinos en las mujeres ancianas.» (Bell & Laird). Diarrea crónica, viniendo ALGUNAS VECES DESPUÉS DE LEVANTARSE Y MOVERSE.

KALI SULPH.—Diarrea amarilla, viscosa ó acuosa, deposiciones purulentas. Capa amarilla de la lengua, especialmente en la raíz de la misma. Síntomas del cólera, calambres, etc. Deposiciones de olor desagradable, negras, líquidas.

CALCAREA SULPH.—Diarrea purulenta mezclada con sangre, lengua color de arcilla. En el tifus, por comer árbol de azúcar y por el cambio del tiempo.

CALCAREA PHOS.—Diarrea en la dentición de los niños, como remedio intercurrente ó alternado.

En la consunción de los intestinos se da intercurrentemente. Es uno de nuestros más preciosos remedios para la diarrea de los niños raquíticos y escrofulosos. Diarrea verde y viscosa, de alimentos no digeridos. La deposición es caliente, acuosa, profusa, de mal olor y ruidosa.

MAGNESIA PHOS.—Deposiciones acuosas, expelidas con fuerza, con retortijones dolorosos en los intestinos, cólico flatulento aliviado por encoger los miembros ó por las aplicaciones calientes. Vómitos y calambres en las pantorrillas. Dolor por intervalos.

SILICEA.—Diarrea infantil de olor cadavérico, después de la vacunación, con mucha transpiración ácida en la cabeza, y abdomen distendido, duro y caliente.

CASOS CLINICOS.

Diarrea crónica que ya databa de mucho tiempo en una solterona de 75 años, curada por *Ferrum phosph.* (W. P. W.)

Diarrea matinal al levantarse; urgencia violenta, impetuosa, acompañada de flatulencia. La deposición salpica por todo el vaso que la contiene. *Natrum. sulph.* c. m. curó. (C. Lippe).

Un anciano fué atacado de vómitos intensos y diarrea acompañada de calambres excesivamente dolorosos en las pantorrillas. Las eva-

cuaciones tenían el aspecto del agua de arroz. Emprendí el tratamiento cerca de seis horas después del principio del ataque, y una dosis de *Kali phos.* efectuó la cura.

La rápida curación de este caso de diarrea colérica podría justificar la creencia de que *Kali phos.* es un específico contra el cólera. (Schussler).

El Dr. Goullon refiere un caso de diarrea crónica de dos años de duración. Deposiciones de consistencia esponjosa, lengua saburral, curada con *Calcarea sulph.*—*(Allg. Hom. Zeit.)*

Entre los primeros casos en los cuales ensayé estos remedios, se encuentra el de un niño de la raza negra, de dos meses de edad próximamente y que presentaba los síntomas siguientes: Diarrea dolorosa, movimiento constante de la cabeza, ojos vueltos hacia arriba, lengua amarillo-pardusca, y no manifestaba deseos de mamar. La madre dijo que había estado enfermo hacía ya una semana, y que le había propinado diferentes cosas, pero que al ver cómo se agravaba me mandó á llamar. La dije que temía hubiese pocas probabilidades para su restablecimiento; sin embargo, haría lo que pudiese por él. Prescribí *Magnesia phos.* y *Calcarea phos.*, en alternación, cada quince minutos. Esto fué cosa de las 9 ó 10 a. m. Volví cerca de las 3 p. m. para ver si estaba vivo todavía, y con sorpresa mía lo hallé mejor. Habían cesado los movimientos de cabeza, los ojos no presentaban nada anormal, había mamado una ó dos veces, y estaba en tranquilo reposo. Ordené que se le continuara dando la medicina en intervalos más largos. La mañana siguiente estaba considerablemente mejor. En esta visita encontré la lengua cubierta con una capa espesa blanca, y la boca con algunas ligeras escoriaciones. Prescribí entonces *Kali mur.*, remedio indicado para este estado en lugar de *Calcarea phos.*, que se alternara con *Magnesia phos.* cada hora.

Al inmediato día la lengua estaba limpia, y después de dejarle unos pocos más de polvos, para que se le continuasen dando por uno ó dos días á lo más, dí por terminada la curación. (E. H. H.)

El Dr. T. F. Allen curó un caso de diarrea crónica con agravación por las mañanas al comenzar á moverse, en una señora anciana, con *Natrum. sulph.* 7ª x. (N. A. J. H.)

FERRUM PHOS.—Al principio de la afección y para la fiebre.

KALI MUR.—Este es el único remedio en los más de los casos, en alternación con *Ferrum. phos.;* este último disminuirá la fiebre, y por lo mismo siempre está indicado al principio. *Kali. mur.* tiene con las substancias albuminoides (es decir, con la fibrina) la misma relación biológica que tiene el fostato de cal con la albumina. Cuando una intensa irritación ha atacado aquellas celdillas que forman el asiento de la enfermedad en la difteria, ó relativamente las moléculas de *Kali mur.* que están contenidas en ellas, se ocasiona un desorden en el equilibrio de las moléculas de esta sal y una pérdida consiguiente de algunas moléculas, quizá solamente en muy pequeña cantidad. Al mismo tiempo una parte de las substancias albuminoides (la base orgánica de las celdillas) se pone en libertad y aparece sobre la superficie de la membrana mucosa, donde es reconocida como exudación diftérica. En tanto que continúe la perturbación de equilibrio en el movimiento de las moléculas de *Kali, mur.*, la exudación persistirá. Para conseguir la curación de la difteria por medio del método bio-químico, se necesita aplicar nuevas moléculas de esta sal á los respectivos tejidos, puesto que las citadas moléculas de *Kali mur.* han dejado de estar en armonía para desempeñar su función, y por esta razón necesita darse el reme-

dio en la forma molecular. Dosis, de 10 á 15 granos de la 3ª ó 6ª trituración en un vaso de agua, una dosis cada dos horas, ó bien una cantidad de polvo del tamaño de un guisante, puesto en seco sobre la lengua.

CALCAREA FLUOR.—Cuando la afección se ha extendido á la tráquea á causa de un mal tratamiento, se da este remedio y *Calcarea phos.* alternativamente.

CALCAREA PHOS.—La exudación diftérica se extiende á la tráquea. Tal complicación es muy rara cuando se han usado exclusivamente los Remedios de los Tejidos. Queda una mancha blanca después de separada la mayor parte de la exudación.

KALI PHOS.—En las condiciones bien marcadas, malignas, gangrenosas, en las que el paciente está agotado y postrado. También para los efectos que quedan después de la difteria, tales como debilidad de la vista, voz nasal ó parálisis en cualquiera parte del cuerpo, estrabismo, etc. El CARÁCTER PÚTRIDO, es bien marcado, como se observa por el olor corrompido de la boca.

NATRUM MUR.—Difteria, si la cara está PÁLIDA É HINCHADA con SOMNOLENCIA pesada; deposiciones acuosas, flujo de saliva ó vómitos de líquido acuoso. SEQUEDAD DE LA LENGUA, respiración estortosa, etc. El uso de *Natrum mur.* tiene que suspenderse con la desaparición de estos síntomas.

NATRUM PHOS.—Afecciones diftéricas de la garganta, llamadas así impropiamente (no las verdade-

ras), cuando las amígdalas están cubiertas con una capa cremosa, amarilla, y la parte posterior y superior de la boca tiene un aspecto amarillo-cremoso; la capa de la lengua está húmeda, cremosa ó de color de oro.

NATRUM SULPH.—En la difteria como remedio intercurrente cuando hay vómitos de una substancia verde ó acuosa, y la secreción peculiar de mucosidades procedentes del estómago.

NOTA.—Bajo ningún motivo se usarán otros remedios, tales como el agua de cal, el ácido carbólico, el agua de hielo, etc., juntamente con estos bioquímicos de los que pueden destruir su acción propia. (Schüssler).

CASOS CLINICOS.

Caso completamente desarrollado de difteria con el característico aumento de volumen de las glándulas; las amígdalas, la úvula y toda la parte blanda del paladar estaban cubiertas con un exudado espeso y diftérico. La deglución se verificaba con gran dolor y era acompañada de los mayores esfuerzos; había postración excesiva. *Kali mur.* 6ª cada dos horas. Al día siguiente había una marcada mejoría, y á los cuatro días todo vestigio del mal de la garganta había desaparecido, y el niño se restablecía rápidamente bajo la influencia de *Calcarea phos.* (Dr. W. M. Pratt, *North American Journal of Homœopathy*, Mayo, 1883).

El verano pasado tuve una enferma de difteria que estuvo un poco fuera del orden común. Ví el caso el sábado 21 de Julio. Lo consideré como una simple ulceración dolorosa de la garganta, y prescribí *Calc. sulph.*, recomendándole á la madre que me avisara por la tarde en caso de que no hubiese mejoría. Cuando volví á mi casa, cerca de las cuatro, la enferma y su padre estaban en mi despacho. La encontré

en extremo calenturienta y su manera de hablar considerablemente velada. Le examiné la garganta cuidadosamente y encontré una placa pardusca bien marcada en cada amígdala. Prescribí en este mismo instante *Ferrum phos.* y *Kali mur.* en alternación. Como á las nueve fuí llamado y hallé que no manifestaba de ningún modo haber sentido alivio. Se quejaba entonces de alguna cosa que continuamente le llegaba á la garganta. Pensé que quizá podría ser originada esa sensación por la pirosis y la dí unas cuantas dosis de *Natrum phos.*, pero sin resultado. Continué los primeros remedios por toda la noche. La mañana siguiente estaba más mal. La membrana se había extendido considerablemente y las amígdalas estaban muy aumentadas de volumen. La producción de mucosidades en la garganta continuaba. La ví el domingo tres veces, administrándola las más bajas potencias, pues le dejé la 3ª x para esa noche. El lunes por la mañana me recibió la madre llorando y deseando saber si yo no la veía mejor para llamar otro médico. La encontré verdaderamente muy mal. Viniéndome violentamente á la imaginación que la secreción constante de mucosidades en la garganta es un síntoma de *Natrum sulph.*, por consiguiente se lo dí solo á la 200ª (B. & T.) potencia, y en unas cuantas horas hubo un cambio decidido hacia la mejoría. En pocos días la enferma estuvo bien. (E. H. H.)

En catorce casos de difteria en que se aplicó el tratamiento bio-químico, no dejó éste nada que desear. *Kali mur.* producía rápidamente un cambio favorable: la exudación pardo-blanquizca disminuía, encogiéndose y desprendiéndose con los gargarismos y lavatorios de la boca hechos con esa misma sal, que algunas ocasiones era auxiliada por *Ferrum phos.* El tratamiento obraba espléndidamente. En tres casos los pacientes cayeron en la postración desde el principio, y les fué dado *Kali phos.* como intercurrente; en otros dos *Natrum mur.*, alternado con *Kali mur.*, fué el principal remedio; y en los restantes existía un flujo considerable de saliva, somnolencia profunda y evacuaciones acuosas. En ninguno de todos estos catorce casos resultaron afecciones secundarias, tales como las que tienen lugar frecuentemente bajo el tratamiento ordinario: parálisis, perturbaciones de la vista ó neuralgía. (M. D. W.)

Caso tomado de la práctica de Schüssler: En un lugar, á unas cuan-

tas millas de la ciudad de *Oldenberg*, fué atacado un niño de difteria, la que desde el principio se complicó con una afección de la laringe. El niño fué tratado por el método ordinario y murió. Casi al mismo tiempo un niño de otra familia del lugar, fué atacado de difteria con idéntica complicación. El padre de este último enfermito vino á verme. Prescribí *Kali mur.* para la enfermedad que estaba en su principio, y *Calcarea phos.* para la afección de la laringe, á tomar ambas alternativamente. Encargué al padre me informase sin falta del resultado, lo que prometió hacer. Dos días después recibí una carta de él, en la que me informaba que el niño se había restablecido completamente.

En la difteria (maligna), en la que fallan todos los remedios conocidos, *Kali phos.* y *Kali mur.* con, y algunas veces sin, *Natrum mur.*, hacen desaparecer el carácter maligno y apresuran la curación. Contra la parálasis que sobreviene después de la difteria, no conozco otro remedio mejor que *Kali phos.* (Dr. F. de Schüssler).

Los siguientes casos son de interés, pues ponen de manifiesto la acción de *Ferrum phos.* en la difteria.

1. Una señora joven, con adolorimiento de la garganta, amígdalas completamente rojas é hinchadas moderadamente, un poco calenturienta, *Ferrum phos.* 30ª cada tres horas por un día y medio, al cabo de cuyo tiempo se suspendió el remedio en vista de la mejoría que produjo. A poco sobrevino una agravación y fuí llamado. La membrana diftérica cubría la amígdala derecha; prescribí, como antes, *Ferrum phos.* 30ª. Al día siguiente la membrana casi había desaparecido, la hinchazón y el enrojecimiento estaban mejores. Se continuó la prescripción cada cuatro horas. Al otro día solamente quedaba un ligero vestigio de la membrana. La medicina se dió con menos frecuencia, y al siguiente día estaba la enferma perfectamente bien.

2. Un muchacho de cinco años, estaba febril, ojos brillantes, relucientes, mejillas encendidas, amígdalas rojas é hinchadas, especialmente la derecha, sobre la cual se veía una exudación como cresta cerca de su centro y como de un cuarto de pulgada de diámetro, colgando hacia abajo, la parte superior adherida daba un aspecto casi negruzco á las amígdalas; aliento fétido. *Ferrum phos.* 30ª. Al día siguiente la amígdala estaba con un color más claro, pero una exudación semejan-

te aparecía sobre la pared posterior de la faringe; se continuó el mismo remedio cada cuatro horas; al otro día estaba bien. (Dr. C. Morgan, *Hahnemannian Monthly*, vol. VII).

DISENTERÍA.

KALI MUR.—Dolor intenso en el abdomen, como si cortasen con cuchillos; se experimenta la necesidad de evacuar con pocos minutos de intervalo, hay tenesmo que hace prorrumpir en lamentos, diarrea con deposiciones saniosas, viscosas. En el mayor número de casos cura este remedio entrando en juego con *Ferrum phos.*

FERRUM PHOS.—Si comienza la afección con fiebre violenta, este remedio con el precedente, es por lo común suficiente para efectuar la cura. Si el dolor es ocasionado por la inflamación, no se produce en intervalos y aumenta por la presión. Nunca es útil si el tenesmo se presenta. (F.)

KALI PHOS.—Cuando la deposición está compuesta de sangre solamente, y el paciente llega á tener delirio y abdomen abultado, ó bien cuando las evacuaciones tienen un olor pútrido. Deposiciones pútridas y de muy mal olor y grande sequedad de la lengua. Prolapsus recti. Tenesmo después de las deposiciones.

MAGNESIA PHOS.—Dolores de calambre aliviados por encorvarse, por el calor, la fricción ó la presión.

Tenesmo y dolores en los intestinos, con deseo constante para orinar y defecar. Dolores en el rec-

to, con cada evacuación como por un prolongado espasmo de los músculos.

CALCAREA SULPH.—Deposiciones purulentas, saniosas (mezcladas con sangre), especialmente en los casos que persisten después de *Kali mur.*

NATRUM SULPH.—Si se presentan síntomas biliosos.

CASOS CLINICOS.

El Dr. E. H. Holbrook refiere un caso de disentería, que fué muy aliviado por *Calcarea sulph.* c. m., y transformándose en diarrea biliosa, se curó con *Natrum sulph.*

Una señora se quejaba de excesivo tenesmo y dolor en los intestinos, con deseo constante para orinar y defecar. Cada vez aumentaba este dolor, necesitando levantarse ó inclinarse hacia adelante, y el alivio solamente se conseguía con el agua caliente. *Magnesia phos.* 2ª c., cada 15 minutos, curó á la tercera dosis. (Dr. Reed).

Al tratar últimamente un caso de disentería me encontraba apurado para reprimir el terrible dolor que acompañaba á la defecación. *Merc. corr.* obró bien en este caso, las deposiciones se hicieron menos frecuentes; pero el dolor aumentaba, siendo tan intenso que producía el síncope. Alguna cosa había que hacerse si continuaba tratando mi caso. El dolor en el recto y el abdomen era *muy intenso*, más en el recto que en el abdomen. El tenesmo era como un espasmo prolongado de los músculos empleados en la defecación. Administré la *Magnesia phos.* de Schüssler en agua caliente, y con dificultad habría obrado más rápidamente una inyección hipodérmica de morfina: el dolor casi desapareció con la primera dosis; el estado de gravedad se trocó en mejoría, y dí por terminado mi caso al día siguiente. Nunca he tenido en toda mi práctica un resultado más rápido y agradable. *Magnes phos.* es un gran antiespasmódico, y tan seguro en su acción como los más de nuestros remedios frecuentemente usados. Pensé en esta sal, teniendo en cuenta una relación que me hizo el Dr.

E. E. Snyder, de Benghampton, N. Y., quien la administró con un resultado semejante, tan satisfactorio, en un caso de tenesmo espasmódico de la vejiga que sufrió un enfermo de cistitis consecutiva á una gonorrea. Ciertamente me hizo un gran servicio con su relación. (Dr. H. K. Leonard).

DISMENORREA.

Véase también *Menstruación;* y *Mujeres, Enfermedades de las.*

CALCAREA PHOS.—Cuando la dismenorrea es la consecuencia de la falta de cuidado que la paciente haya tenido durante la pubertad. Ninfomanía. Dolores como de parto, antes y durante el período catamenial, con dolor violento en la espalda, vértigo, excitación sexual y cefalalgia con latidos.

FERRUM PHOS.—Dolor en los períodos mensuales, acompañado de bochornos y pulso acelerado, con vómito de alimento no digerido, algunas veces de gusto ácido. Debe tomarse también como un preservativo antes de los períodos si estos síntomas vuelven de vez en cuando. Congestión excesiva en los períodos mensuales, la sangre tiene un color rojo-brillante, la vagina seca y sensible.

KALI PHOS.—Gran dolor en la época del período en las mujeres pálidas, propensas al llanto, irritables, impresionables.

MAGNESIA PHOS.—El principal remedio en los casos ordinarios de cólico menstrual, menstruación dolorosa ó dolor que precede al flujo. El calor mo-

derado es consolador; dolores neurálgicos, calambroides, agravados por el movimiento.

DISMENORREA MEMBRANOSA.

NATRUM MUR.—Menstruación escasa y obscura, precedida por cefalalgias frontales; propensión á padecer ataques de fiebre vesiculosa que se localiza especialmente en los labios y erupciones de urticaria durante el verano. Dolor quemante en la vagina y dolor incisivo en el útero. Gran melancolía. También para la menstruación demasiado profusa y anticipada, con dolor de cabeza como si ésta estallase, y estremecimientos frecuentes producidos por calosfríos.

NATRUM SULPH.—Menstruo corrosivo con cólico. Pellizcos en el abdomen, á la madrugada. Epistaxis violenta. Vulvitis. Temblor ó sacudimiento de las manos y flojedad de los pies.

SILICEA.—Con gran enfriamiento. Al comenzar el flujo se siente una frialdad glacial por todo el cuerpo. Vagina sensible.

CASOS CLINICOS.

La Srita. N., de 19 años, era molestada con dolores antes y durante el primer día del período, los que la hacían guardar cama. Su constitución, por otra parte, era pletórica, robusta y con perfecta salud. Hice la división de diez granos en polvo de *Ferrum phos.*, para que se le diesen en agua caliente cada media hora hasta que se aliviase del dolor, lo que aconteció después de la tercera dosis, y luego conti-

nuó los polvos en agua cada dos noches, tomando un baño de asiento de agua caliente salada, antes de recogerse, durante el intervalo del período, al menos una noche por semana. Las reglas llegaron sin molestia y desde entonces se han presentado sin que el dolor reaparezca y con perfecta regularidad. (Dr. T. D. Bittinger, Dayton, O.)

J. T. Kent refiere un caso de dismenorrea de algunos años de duración, curado por *Calcarea phos.* en dos meses.—*Homœopathic Physician*, 1884.

El Dr. R. D. Belding *(N. Y. St. Trans.)* hace relación de un caso de dismenorrea de algunos años de duración, caracterizado por malestar y dolor en el hipocondrio izquierdo atravesando hasta el omóplato derecho, con agravación por acostarse sobre el lado izquierdo, con cefalalgia y diarrea. La paciente se sentía mejor en el tiempo seco y frío; cada verano tiene erupciones de urticaria. Sueña con ladrones, tiene ulceraciones frecuentes sobre el labio superior. *Natrum mur.* 200ª verificó la curación.

El Dr. D. B. Whittier (en el *Hahnemannian Monthly*, Julio de 1887) refiere varios casos de dismenorrea curados con *Kali phos.* y *Magnesia phos.*

El Dr. A. P. Davis relata un caso de dismenorrea con dolores intensos en el útero, espalda y miembros inferiores; no aliviaban las aplicaciones calientes en el abdomen; una gran dosis de *Magnes phos.* 6ª x, disminuyó el dolor en media hora; otra dosis hizo que se presentara libremente el flujo. El dolor duraba comunmente varias horas antes de venir el período. El remedio fué administrado como un preservativo durante varios meses subsecuentes, con buen resultado, y curó finalmente á la paciente. El Dr. Davis considera que *Magnes phos.* es superior á *Cimicifuga* en la neuralgía del útero, y para aliviar los dolores menstruales; lo tiene como muy útil para el infarto uterino, y dándola en casos de menorragia, cura con la 6ª x.

Kali phos. en la Dismenorrea.—El Dr. D. B. Whittier refiere la curación de una dismenorrea de quince años de duración (en una mujer sumamente neurótica é histérica) por un uso continuado de *Kali phos.* durante más de seis meses, después de haber fallado las medicinas alopáticas y las homeopáticas aparentemente indicadas. Algunos de los síntomas fueron éstos: las glándulas mamarias estaban

tan dolorosas, que el contacto de los vestidos era insoportable. Los dolores menstruales eran como calambre, con sensación de presión y aflujo hacia abajo en el hipogastrio, sensación que se hacía mucho más molesta después que comenzaba el flujo. Cuando los sufrimientos eran más intensos, aparecía un dolor agudo, lancinante, que se extendía del hipogastrio al epigastrio y se acompañaba con una sensación como si alguna cosa estuviese fluyendo hacia el estómago, apareciendo inmediatamente un vómito bilioso ó espumoso, y algunas veces de substancias ácidas estriadas con sangre. Este vómito aliviaba la angustia dolorosa del estómago, pero aumentaba los dolores uterinos y algunas veces continuaba por veinticuatro horas. Dolor de cabeza, general al principio, que se localizaba pronto sobre el ojo izquierdo. Cuando los dolores de la cefalalgia eran intensos, disminuían en otra parte, y *vice-versa*.

El primer período menstrual que se siguió á la administración del *Kali phos.* fué comparativamente bueno.—*Hom. Journal of Obstetrics.* Noviembre.

Dismenorrea que hacía algún tiempo que duraba, en la que en cada período menstrual era expulsada una membrana, variando en tamaño desde una á dos pulgadas de largo. Los dolores iban en aumento después de comenzar el flujo, localizados en la parte más baja del abdomen, y se aliviaban por echarse encogida en la cama con una bolsa de agua caliente sobre el abdomen. Los dolores duraban por un día—eran sordos, aumentaban gradualmente—y al siguiente día, ó un día después, se eliminaba una membrana. La dí, después de uno de sus períodos menstruales, *Magnes phos.* c. m., una dosis en seco. La próxima menstruación fué un poco más fácil, pero no mucho. Continuó tomando *Magnes phos.* en agua por dos días, mañana y noche, y el siguiente período menstrual fué sin dolor, aunque expulsó, como antes, la membrana. Después de esto, los menstruos fueron enteramente sin dolor. (Dr. Comphell, en los *Proceedings of Hahnemannian Association*, 1889).

Tuve una paciente con dolores neurálgicos, lancinantes, muy intensos, durante el período menstrual. Los dolores se localizaban en el estómago y duraban el primer día y algunas veces el segundo. Comenzaban en la espalda, extendiéndose en seguida alrededor y fijándose

en la boca del estómago; eran aliviados por el calor y la presión. *Magnes phos.* 10 m., una dosis, y no tuvo más dolor. (Dr. J. T. Kent).

Un caso sumamente instructivo de dismenorrea membranosa curada con *Magnesia phos.* 4ªx. fué dado á conocer recientemente en el "*Homœopathic World;*" databa ya de varios años y la curación fué completa.

DOLORES DE ESPALDA.

SILICEA.—Tirantez espasmódica en la espalda, obligando á permanecer quieto. Adolorimiento conste en la parte media de la columna vertebral.

FERRUM PHOS.—Dolores en la espalda, en los lomos y sobre los riñones. Los dolores reumáticos se sienten solamente al moverse.

KALI MUR.—Es útil después de *Ferrum phos.*, si éste no ha producido el alivio.

KALI PHOS.—Dolores como de estropeo. Las partes enfermas se sienten impotentes, el movimiento suave disminuye gradualmente el dolor y la rigidez; sin embargo, el ejercicio excesivo aumenta el dolor (tal como el andar demasiado lejos). Esta especie de dolor siempre es peor al levantarse, después de haber estado sentado y al principio del movimiento.

CALCAREA PHOS.—Dolores con adormecimiento, frialdad, ó con una sensación de reptación; agravación en la noche y durante la quietud. Puede también darse alternado con *Ferrum phos.* Después del agotamiento de las enfermedades, dolor de espalda en

la región lumbar por la mañana, cuando se despierta.

KALI SULPH.—Dolores que empeoran en un cuarto caliente y en la noche; se mejoran al aire libre (fresco). Cambian y mudan de lugar.

MAGNESIA PHOS.—Dolores vivos, lancinantes, taladrantes, intermitentes, neurálgicos y que mudan de lugar; se encuentra alivio por el calor.

CALCAREA FLUOR.—Dolor de la espalda que simula irritación espinal. Se siente cansancio y dolores en la parte inferior de la espalda, con dolor ardiente y sensación de plenitud, constipación intestinal. Lumbago agravado al principiar á moverse, pero mejorado si se continúa en el movimiento.

NATRUM MUR.—Dolores en la cintura aliviados por acostarse sobre alguna cosa dura, con los síntomas característicos de la lengua, burbujas de saliva espumosa. Dolor después de una prolongada inclinación como si estuviese magullado. Debilidad en la espalda con agravaciones matinales; gran sensibilidad en la columna vertebral; rigidez y enflaquecimiento del cuello. Gran debilidad y cansancio.

NATRUM SULPH.—Dolor en la espalda toda la noche, como si estuviese ulcerada; solamente puede descansar sobre el lado derecho. Dolencia que recorre de arriba á bajo la espina y cuello.

NATRUM PHOS.—Dolores en la región lombar al despertar por la mañana.

DOLOR DE MUELAS.

FERRUM PHOS.—Dolor de muelas con calor en la mejilla, inflamación de la encía ó raíz del diente. Se agrava con el calor, se mejora con los líquidos fríos; encías doloridas, rojas é inflamadas. Gran dolencia de los dientes, se sienten alargados. Odontalgia.

KALI MUR.—Dolor de muelas con hinchazón de las encías y carrillos, quita el exudado de la substancia albuminoide gastada.

KALI PHOS.—Dolor de muelas en las personas irritables que sufren por alguna emoción y son sumamente nerviosas, delicadas ó pálidas. Dolor de muelas con encías que sangran fácilmente. Las encías tienen una línea roja brillante sobre ellas. Los dientes se sienten doloridos; rechinido de los mismos; dolor intenso en los dientes destruidos ó empastados.

KALI SULPH.—Dolor de muelas agravado por estar en un cuarto caliente y al anochecer, pero mejorado al aire libre y frío.

MAGNESIA PHOS.—Dolor de muelas, si los líquidos calientes mejoran el dolor (si se alivia con los fríos, *Ferrum phos.)* Odontalgias neurálgica, reumática, muy intensas y lancinantes, mitigadas por el calor. Los dolores se alivian por la presión, pero aumentan por el movimiento más ligero. El dolor de muelas empeora después de meterse en la cama y por lavatorios fríos, y en general, por todas las cosas frías,

en los dientes empastados. Dolor de muelas que no es de naturaleza inflamatoria.

NATRUM MUR.—Dolor de muelas con lagrimeo involuntario, ó gran secreción de saliva.

SILICEA.—Cuando el dolor de muelas es muy intenso por la noche, cuando ni el calor ni el frío producen alivio, y cuando es ocasionado por un enfriamiento de los pies. Cuando el dolor de muelas está profundamente situado en el periostio ó membrana fibrosa que cubre la raíz del diente, y cuando se forman abscesos. Dolor de muelas causado por súbito enfriamiento de los pies cuando están humedecidos por la transpiración. Pérdida de los dientes.

CALCAREA PHOS.—Decadencia demasiado rápida de los dientes, constitución estrumosa. Padecimiento de los dientes durante el embarazo. El dolor en los dientes empeora por la noche.

CALCAREA FLUOR.—Dolor de muelas producido por el contacto de los alimentos. Dolor de muelas con pérdida de los dientes; el esmalte de los dientes está áspero y deficiente, pérdida prematura de los dientes. «Cuando el uso de *Calcarea fluor* ha sido continuado por muchas semanas, he observado malos resultados sobre los dientes, por lo que aconsejo se use, hasta donde sea posible, en la caries de los dientes, especialmente en los niños.» (R. S. Copeland).

CASOS CLINICOS.

Tres casos de odontalgia fueron aliviados en unas cuantas horas por *Ferrum phos.* 6ªx. Los síntomas eran: Sensación de alargamiento, mu-

cha sensibilidad de los mismos á la presión; dolor continuo, no se podía dormir, no había hinchazón de la cara ó las encías, no se aliviaba por el calor ó por el frío.—N. A. J., 1893, p. 54.

EDEMA DE LOS PULMONES.

KALI PHOS.—Edema pulmonar, tos espasmódica, amagos de sofocación por la dispnea con semblante amoratado. Edema agudo, exceso de expulsión de masas serosas y espumosas.

NATRUM MUR.—Edema. Acumulación excesiva de mocos acuoso en la membrana mucosa de los pulmones y de los bronquios, secreciones espumosas y serosas.

EMBARAZO, PARTO, ETC.

FERRUM PHOS.—«Tengo la costumbre de dar este remedio después del parto con alivio marcado de los dolores de sobreparto, y preservativo de la fiebre láctea.» (Dr. W. M. Pratt, *North American Journal Homœopathy*, Mayo de 1883). Mastitis, primer período. Metritis, primer período. Indisposición matinal, vómito de alimentos sin digerir. Rigidez del cuello uterino, con cara abochornada, desasosiego, ansiedad é impaciencia. Náuseas matinales con vómito de alimento.

KALI PHOS.—Dolores de parto débiles é ineficaces, dolores falsos. Parto tardío por debilidad constitucional; este remedio da vigor y ayuda materialmente. Dolores de parto débiles é irregulares. Rigidez

del cuello, con labios gruesos y blandos, la paciente está inquieta, llorosa y nerviosa. «Por tres años he empleado *Kali phos.* 4ª en dosis del tamaño de una haba, puesta en seco sobre la lengua, cada diez ó quince minutos, como un remedio para excitar los dolores del parto. Nunca me ha fallado, y rara vez he tenido que administrar la tercera dosis. Mi práctica es extensa; he tenido sobre noventa casos en seis años. *Magnesia phos.* me ha dado buen resultado en los dolores espasmódicos y en la eclampsia. Después del parto doy generalmente una dosis diaria de *Ferrum phos.* para evitar la inflamación.» (Dr. Rozas, *Pop. Zeit.*, Abril de 1887). Para los dolores de sobreparto es comunmente el mejor remedio. Si se da con constancia varias semanas antes del parto, el puerperio es menos doloroso.

KALI MUR.—Remedio principal en la fiebre puerperal. Mastitis, para reprimir la hinchazón antes que se forme la supuración. Vómito de flema blanca.

MAGNESIA PHOS.—Dolores espasmódicos de parto con calambres en las piernas, esfuerzos excesivos de expulsión. Convulsiones puerperales. Rigidez del cuello con labios delgados. Dolores débiles y cortos.

CALCAREA PHOS.—Dolores ardientes, dureza y adolorimiento en las mamas, las que se sienten aumentadas de volumen. Mala calidad de la leche de la madre, salada y azulosa, el niño no la toma. Decadencia después del puerperio, ó durante el embarazo. Prolapsus en las personas debilitadas. Especialmente adecuada á las pacientes reumáticas.

Menstruación durante la lactancia. Adolorimiento en la sicondrosis sacro-iliaca. Lasitud en todos los miembros durante el embarazo.

CALCAREA SULPH.—Mastitis, cuando hay secreción de pus después de una lactancia prolongada. *Silicea.*

CALCAREA FLUOR.—Si los dolores de sobreparto y las contracciones son demasiado débiles. Nódulos duros en el seno. Hemorragias. Este remedio fortifica el tejido elástico del útero grávido, haciendo fácil el parto. (Dr. S. J. Hogan).

NATRUM MUR.—Náuseas matinales, vómitos de flema acuosa y espumosa, la leche es azulada y aguada.

NATRUM PHOS.—Náuseas matinales, con vómito de substancias agrias. Si se da este remedio al principio de la mastitis impedirá la supuración.

NATRUM SULPH.—Diminución de la secreción de la leche.

SILICEA.—Supuración de las mamas, trayectos fistulosos crónicos. Nudosidades duras en los senos. El niño rehusa la leche, ó la vomita tan pronto como la toma. Pezones hendidos y ulcerados.

CASOS CLINICOS.

"Mientras más me familiarizo con este sistema, más satisfecho me encuentro.

En el parto, cuando los dolores son demasiado débiles é irregulares, no he visto nada que obre más pronta y eficazmente como *Kali phos.* Para los dolores espasmódicos y calambroides, *Magnesia phos.* es una presea. Después de un alumbramiento, doy *Ferrun phos.* cuan-

do acostumbraba dar Acon. y Act. rac., seguido ó acompañado por cualquier otro de los que puedan estar indicados. También lo uso á la 3ª x para lavatorios de la vulva y el abdomen, y para inyecciones vaginales, mañana y noche. Las partes curan prontamente bajo este tratamiento, y con el uso de otros remedios, como los que he indicado, la paciente logra un buen restablecimiento."—*Eclectic Medical Journal*, Dr. E. H. Holbrook.

Una sirviente portuguesa, madre de tres niños sanos, no había estado bien desde el principio de su cuarto embarazo. Cerca de seis semanas antes del término de su preñez, fué amenazada por un malparto. Había arrojado agua y sangre; los dolores eran severos y bien manifiestos; el cuello estaba dilatado, y me sentí tan convencido de que el parto era inevitable, que la aconsejé se abstuviese de sus obligaciones, y la dí *Kali phosphoricum* 6ª x para ayudarla en su trabajo. Con gran sorpresa mía cesó el dolor, y continuó el embarazo hasta su término. Entonces la asistí de un niño falto de desarrollo, que vivió tres días. (Dr. C. C. Wiggins).

ENURESIS.

Véase desórdenes urinarios.

EPILEPSIA.

KALI MUR.—Es el específico ó el principal remedio en esta enfermedad, especialmente cuando ocurre con ó después de la supresión de las erupciones.

«KALI MURIATICUM.—Es uno de los remedios de los tejidos descuidado con demasiada facilidad. Su delicada afinidad por los centros nerviosos lo hacen obrar como un remedio lento. En vista de que el médico busca demasiado frecuentemente paliativos en la epilepsia, no es generalmente empleado por

un tiempo suficiente. Sin duda conserva la fibrina como factor é impide una metamorfosis del tejido.

Esto, creemos, será la mira terapéutica en el tratamiento de esta enfermedad. Es bastante por su acción para aliviar un acceso, para que se limite por sí mismo. El verdadero objeto es dominar la degeneración morbosa. Las fibras protoplásmicas son ciertamente fortificadas por *Kali mur.*, y tal condición tiende á garantizar la integridad del cerebro. Cuando las celdillas cerebrales están convenientemente nutridas, pueden oponerse á la irritación de las fibrillas del sensorio que las rodea. Lográndose esto, tenemos dado el primer paso hacia la curación de la causa de la enfermedad. Mientras no se pretenda disponer de algún específico, y en tanto que se admita la dificultad en la curación de esta terrible enfermedad, lo consignado por el autor del libro, da mucha validez á lo que dejamos expuesto.»—*The Clinique,* Junio 15, 1897.

KALI PHOS.—Epilepsia ó accesos epilépticos con semblante hundido, frialdad y palpitación después del ataque.

MAGNESIA PHOS.—Accesos epilépticos, algunas veces como resultado de hábitos viciosos, los cuales necesitan reprimirse.

FERRUM PHOS.—Accesos epilépticos con aflujo de sangre á la cabeza.

NATRUM PHOS.—Es frecuentemente útil como un remedio alternativo, y para la irritación intestinal (lombrices, etc.)

SILICEA.—Epilepsia nocturna, especialmente cerca de la época de la luna nueva; sensación de frialdad antes del ataque, espasmo que se extiende del plexo solar hacia arriba. Susceptibilidad exaltada para el estímulo nervioso, con un estado de agotamiento de los nervios.

CASOS CLÍNICOS.

La señora X, viuda, de 30 años, desde la muerte de su marido, hace seis años, se ve acometida de ataques epilépticos por la noche mientras duerme, prorrumpe en gemidos, se muerde la lengua, arroja espuma sanguinolenta, los intestinos muy constipados, no hay ningún desorden uterino. *Silicea* 200ª disminuyó mucho la frecuencia de los ataques. (Hoyne).

KALI MUR EN LA EPILEPSIA.—El Dr. C. C. F. Wachendorf refiere el caso de un hombre de 45 años, quien tuvo una erupción en Septiembre de 1888, la cual desapareció hasta Agosto de 1889. En Noviembre del mismo año, la erupción estaba suprimida, y comenzó á tener ataques irregulares de "accesos de desfallecimiento." Se ponía pálido, sintiendo una sensación de calor; en seguida se presentaba el espasmo, con dolor en el cerebelo, y ardor en la región del estómago. Los ataques casi siempre venían después de un susto. *Nux, Bufo* y *Arsenicum* fueron cada uno experimentados á su vez, pero sin éxito ninguno. Entonces le fué prescripto *Kali Mur* 6ª x, conforme á la siguiente indicación: "*Epilepsia por erupciones suprimidas.*" Después de los seis días de tomar la medicina ya no tuvo ataques. Todavía toma accidentalmente dosis de esa medicina para conservar su acción.

Una señora de 32 años, casada, tiene un niño de 6 años y ha padecido sus accesos desde el alumbramiento de esta criatura, con pocos días de intervalo, y muy fuertes durante los menstruos, cada veinticuatro horas, ó con intervalos desde unos cuantos minutos hasta una hora, persistiendo este estado por tres ó seis días, presentándose lue-

go cada dos ó cuatro días, en el intermedio de los períodos menstruales. La mujer era de baja estatura, indolente, de cuello corto, abdomen elevado, cara abochornada, temperamento sanguíneo-bilioso y más bien de carácter apacible. Cefalalgia perenne en los temporales y en el occipucio, así como calor constante sobre el vértice; también dolor severo en la región lumbar y al través del sacro; sensación de entorpecimiento y de frío en las extremidades inferiores, transpiración viscosa sobre todo el cuerpo. Los médicos habían declarado su caso como "epilepsia," causada por afección uterina. Sin considerar el diagnóstico, ó el tratamiento anterior por la medicación alopática, de una vez le administré *Calcarea phos.* y *Kali phos.*, tres dosis diarias, y durante los menstruos *Magnes phos.* cada dos horas durante los primeros dos días del período. A los dos meses de la primera vez que la ví, ya estaba aparentemente bien con respecto á la marcha de su enfermedad, llegó á estar embarazada de nuevo, y por el uso de *Calcarea phos.* no tuvo más trastornos ulteriores. (Dr. A. P. Davis).

Un muchacho de 13 años había sufrido, desde la edad de 6 años, de temblores en los miembros, y fueron pasando gradualmente al estado de epilepsia. Recibió, el 8 de Octubre de 1888, seis dosis en polvo de *Kali chlor.* Desde el 10 de Diciembre no le volvieron á aparecer. (*Monatsblatter*).

Una joven de 23 años, que había padecido desde la edad de diez y siete de epilepsia, recibió, después de haber tenido dos ataques violentos el 11 de Junio de 1885, seis papeles de *Kali phos.* 30ª. El 11 de Abril de 1887, escribió: "Desde el 15 de Junio de 1885, no he tenido un nuevo ataque." (*Monatsblatter*).

ERISIPELA.

FERRUM PHOS.—Inflamaciones erisipelatosas con color rosa de la piel, para la fiebre, el dolor y los síntomas severos de la inflamación.

KALI MUR.—Erisipela vesiculosa, el principal remedio. Erisipela con bulas.

KALI SULPH.—Variedad ampulosa, facilita el desprendimiento de las costras.

NATRUM PHOS.—Erisipela; hinchazón dolorosa y como picaduras de agujas en la piel, la que está lisa, roja y brillante. Infiltración inflamatoria de la piel.

NATRUM SULPH.—Para la forma de la erisipela lisa, roja, brillante y que se convierte en pústulas, la piel muy hinchada, con ó sin vómitos de bilis. Inflamación edematosa con hinchazón de la piel.

CASOS CLÍNICOS.

Ferrum phosphoricum.—Recientemente se ha publicado un caso escrito por un médico práctico, natural de la India, en el Homœopathic World, que explica bien la actividad de este remedio. El caso era aparentemente de una erisipela flegmonosa del muslo izquierdo, en un muchacho de 6 años. Había persistido por unas seis semanas, y muy poco se había conseguido con *Mercurius iodatus*, *Hepar sulphuris* y *Silicea* prescritos al principio. *Ferr. phos.* 6ª x operó un cambio inmediato hacia la mejoría, y efectuó una cura rápida.

La señora Forbes, viuda, estaba muy enferma de erisipela; fiebre elevada y postración completa. Los miembros de su familia creyeron que se moría, tan luego como vieron que comenzó á delirar. La cabeza y la cara estaban tan hinchadas que los ojos permanecían completamente cerrados, sufriendo dolor intenso. Le fueron administrados *Natrum. sulph.* y *Ferrum phos.*, alternativamente, una dosis cada hora, y más amenudo. Después de la segunda dosis de la primera medicina arrójó una gran cantidad de bilis. Calmaron los síntomas intensos. Esto tenía lugar el sábado en la noche. Se insistió en la misma medicina, dando entonces *Ferrum phos.*, sólo como intercurrente, pues el pulso se hizo menos frecuente. Para asombro de todos sus amigos, la mañana del miércoles se sintió tan bien, que salió para su trabajo como de costumbre.

La estadística muestra una mortalidad de 2,600 casos de esta enfermedad por año. En un caso semejante de erisipela en una señora de 87 años, estos dos remedios y unas cuantas dosis de *Kali phos.* la curaron, cuando el tratamiento usual, embrocaciones de iodo, brandy, etc., no habían dado resultado deteniendo la enfermedad. (M. D. W. de Schüssler).

ESCARLATINA.

FERRUM. PHOS.—Casos sencillos de fiebre escarlata. (En alteración con *Kali mur.)*

KALI MUR.—Es con frecuencia suficiente en los casos benignos con *Ferrum phos.,* hace brotar la erupción é impide las complicaciones. Infartos linfáticos, etc.

KALI SULPH.—Descamación; piel denudada, este remedio ayuda á la descamación y á la formación de nueva epidermis, así como al desarrollo de la erupción. Secreciones por los oídos de pus icoroso, de mala naturaleza y de olor desagradable; secreciones fétidas de todas las superficies mucosas.

KALI PHOS.—Hidropesía post-escarlatinosa.

NATRUM MUR.—Somnolencia, sacudidas, y vómitos de líquidos acuosos.

SILICEA.—Escrofulosis, glándulas hinchadas con tendencia á supurar, diviesos, abscesos, subsiguiente induración de las glándulas por tardía convalecencia.

NATRUM SULPH.—Erupción áspera y granulosa, acumulación de mucosidades en la garganta.

CASOS CLÍNICOS.

A. S., niña de un empleado de correos á quien visité en este lugar, se había enfermado de un ataque muy ligero de escarlatina. La erupción desapareció casi á las veinticuatro horas. Los síntomas de la garganta, que al principio amenazaban ser intensos, desaparecieron en tres ó cuatro días. Al séptimo día se le declaró una retención de orina casi completa, siendo así que en veinticuatro horas solamente excretaba una cantidad muy pequeña, sin embargo de que la niña bebía bastante. La orina contenía alguna cantidad de albúmina, los pies estaban hinchados, el abdomen muy distendido. Como la niña tuvo todo este tiempo fiebre elevada y delirio por la noche, aconsejé á los padres, al hacer mi visita en la mañana del octavo día, que consultaran un segundo médico. El Dr. Gerster, que fué llamado en consulta conmigo, estuvo completamente de acuerdo con mi diagnóstico. Cuando le dije que no había obtenido ningún resultado con algunas de las medicinas que le propinaba, tales como *Bellad.*, *Canthar.* y *Arsenic.*, convenimos en darle *Kali mur.*, cada dos horas una pequeña cantidad de polvo. Al anochecer, la enfermita estaba ya mejor. Había arrojado una mediana cantidad de orina libre de albúmina, el pulso más regular, la piel húmeda. La noche siguiente, durmió la muchachita sosegadamente por varias horas. En la mañana se encontraba casi libre de fiebre y podía considerarse en convalecencia. Continuamos el uso de *Kali mur.*, y unos cuantos días después estuvo capaz de volver al lugar de su residencia perfectamente bien. (De Schüssler).

El Dr. Holbrook, refiere un caso de escarlatina *(Southern Journal of Homœopathic)* tratado sólo con *Kali mur.* 200ª en el que se logró el restablecimiento completo de la salud, y, dando la misma medicina, á los demás niños de la casa, se pudo impedir el contagio, aun cuando estaban constantemente cerca del enfermo.

"Hace unos cuantos días," escribe el pastor espiritual de W..... dos de mis niños tuvieron la escarlatina, y uno de ellos complicada con difteria, por lo que el médico alópata lo declaró como un caso desesperado. Lo que más me alarmaba era el completo insomnio, tanto de día como de noche.

Las convulsiones y los síntomas tifoideos no cedían á ningún remedio. Empleé varios sin resultado; por fin, consultando la obra de Schüssler, encontré que *Natrum mur.* era el remedio indicado. Inmediatamente hice uso de él, pero con poca confianza. No obstante, el resultado fué notable; después de la primera dosis tuvo el niño un sueño apacible, y durmió sin agitación toda la noche. Continué el remedio, y mi hijo, considerado desahuciado, fué curado en unos cuantos días." *(Jour. Pop. de Hom.)*

Varios casos de escarlatina que en este invierno no se mejoraron bajo el uso de los remedios acostumbrados, fueron, sin embargo, rápidamente aliviados y curados por *Natrum sulph.* La erupción, en vez de ser lisa, era áspera y granulosa, y en algunos casos había acumulación de mucosidades en la garganta. (E. H. H.)

ESCRÓFULA Y TUBERCULOSIS.

(El siguiente artículo es tomado de la 24ª Edición de Schüssler, publicado en 1897).

MAGNESIA PHOSPHORICA Y NATRUM PHOSFHORICUM. —La posibilidad de sufrir los leucocitos, la metamorfosis caseosa es debida al hecho de que ellos contienen albúmina y grasa. Una conglomeración ó masa de leucocitos que no ha experimentado todavía la degeneración caseosa constituye la escrófula, mientras que la tuberculosis es el estado que se presenta después de tal degeneración. Por esta razón, la escrófula es la primera, la tuberculosis la segunda. Mucho puede realizarse en casi todos los períodos, y sobre todo en las enfermedades escrofulosas por el uso de los fosfatos, elegidos según sus indicaciones características.

Respecto á la tuberculosis, *Magnesia phosphorica* merece atención especial, y las últimas experien-

cias la acreditan como un remedio para el lupus. Mientras no se presente la degeneración caseosa, *Natrum phos.*, es útil para libertar los leucocitos aprisionados.

Una masa de leucocitos que sufren la degeneración caseosa proporciona un abono nutritivo para el bacilo, y por consiguiente, necesita ser despedida y eliminada como un cuerpo extraño por la acción normal de las celdillas. Cada celdilla sana posee la propiedad de atraer y de rechazar las substancias perjudiciales. Las celdillas perfectamente sanas, no se encuentran en la proximidad de los tubérculos. Para que así sea, necesitan formarse por la acción de los indicados fosfatos, los que efectúan la nueva formación de sus celdillas y entran también en su composición.

La *Tuberculina* de Koch no puede efectuar tales resultados, puesto que es una substancia extraña para las celdillas y por lo mismo es rechazada.

La expulsión de un tubérculo por medio de la acción de la celdilla normal es la expresión del poder curativo de la Naturaleza. La posibilidad de un restablecimiento de tal modo conforme con el orden natural puede realmente concebirse por cualquier hombre inteligente.

NOTA.

(En una de las Ediciones anteriores, la 20ª, encontramos lo siguiente, lo cual añadimos como una nota á la Escrófula y á la Tuberculosis).

La Tuberculina, de la que ha sido últimamente confeccionada la linfa tuberculosa, tendrá todavía que sufrir muchas metamorfosis antes de hacer patente que los que la usan, siguen un camino falso.

"Man dreht sicht rechts,
Man dreht sich links,
Doch hängt der Zopf stets hinten."

Se voltea uno á la derecha
O bien se voltea á la izquierda,
La trenza cuelga detrás.

Se encuentran aún al presente, acá y allá, médicos que, infatuados con el procedimiento bacteriológico, pretenden curar por medio de la enfermedad tuberculosa las condiciones tuberculosas.

Se apoyan en sus éxitos, pero éstos descansan sobre errores; aun á la faz de sus numerosas faltas, no manifiestan deseos de dudar de ellos.

No se excluye la posibilidad de que el bacilo pueda encontrarse en el esputo de alguien que sufra de un simple catarro bronquial, pero por otra parte, perfectamente sano, el que podía sólo haber sido inspirado y retenido en la secreción espesa.

Un entusiasta imitador de Koch, afectado con la manía del bacilo, quiere, apoyándose sobre el descubrimiento de éste en el esputo, inferir que los tubérculos están presentes en el tejido del pulmón y, siguiendo estas erróneas conclusiones, llevará sin pérdida de tiempo la tuberculina al campo de su acción.

Después de que la curación ha sido realizada, lo cual se dice, cuando el catarro, bajo la influencia fa-

vorable de las condiciones exteriores ha curado por sí mismo, el paçiente, creyéndose haber sido afectado con la tuberculosis, con gusto paga los gastos seguidos para la persecución del bacilo.

El bacilo que se encuentra en las celdillas sanas, será despedido y eliminado; el que, como se deja arriba mencionado, se halla casualmente en una secreción catarral en los conductos aéreos, será expectorado con la secreción; el aglomerado en una masa de leucocitos, que ha sufrido la degeneración caseosa, adherido y desarrollado allá adentro, no puede arrojarse, á causa de que esta masa carece de actividad. En ese sitio tendrá lugar su procreación,[1] y obrará entonces como *causa* de la enfermedad.

Como quiera que sea, si este abono nutritivo, á consecuencia de medios racionales es extirpado y eliminado, entonces el bacilo seguirá la misma vía; ó se abandonará á su mismo fin, como acontece con los insectos muy pequeños del queso cuando se consumen.

Si el bacilo no requiriese esta masa de leucocitos en degeneración caseosa como terreno para su multiplicación, si pudiesen procrear en los lugares sanos, entonces pronto minarían todo el organismo y la tuberculosis, realmente, no tendría tiempo para hacerse crónica y el paciente moriría antes de que

1 Como no puede uno con certeza decir si tal condición patológica está ó no presente en su organismo, es prudente evitar las condiciones que puedan inducir á semejante estado.

ambos pulmones hubiesen sido poco á poco destruidos por el bacilo.

Es diferente con los gérmenes que causan enfermedades agudas infecciosas, sarampión, escarlatina, tifus, viruela, etc. Estos gérmenes no pueden encontrar un terreno patológico sobre que crecer, y son en proporción vivamente despedidos y eliminados por la acción de la celdilla sana.

Un sabio, Daniel, puede, sin embargo, preparar un remedio de los gérmenes del sarampión ó de la escarlatina, el que será justamente tan poco apreciable y quizá tan dañoso como la tuberculina, y el virus anti-rábico del francés Pasteur, con el que no solamente pretende curar la hidrofobia, sino también la epilepsía.[1]

La tuberculina puede, en algunos casos, efectuar cambios favorables en ciertas afecciones de corta ó larga duración, pero no cura, y muchas veces se producen agravaciones, acortando la vida del paciente.

Ultimamente en la Sociedad Médica de Berlín, el Dr. Henoch dió á conocer sus experimentos en la sala del hospital de niños de la «Caridad».

1 Pasteur, que fué un famoso químico, pero no un médico, estaba ignorante de la patología y de la terapéutica, y recuerda á uno de los sastres de Luis XIV, quien presentó un día á ese monarca un memorial sobre el estado de economía doméstica y política interior.

Es evidente que necesita uno estar bien instruido en la fisiología, en la química fisiológica y patológica, en la patología y anatomía patológica, á fin de descubrir los métodos racionales de curación. La química sola no es bastante, tiene otros problemas que resolver.

Hace alusión primero á la incompetencia de estadística y de cuadros estadísticos, los que no muestran nada para el médico práctico. Aquí solamente puede ser decisiva la experimentación de los casos individuales.

Nada significa tampoco el límite de la mejoría, puesto que la significación verdadera de «mejoramiento» es subjetiva é involuntaria. Sin embargo, es diferente con las marcadas agravaciones como las que él observó. En los 22 niños enfermos de su departamento que fueron tratados con la linfa de Koch con el mayor cuidado y precaución, no pudo señalarse un solo caso aún de dudosa mejoría; no obstante, varios de esos mismos casos, por otra parte, se empeoraron á consecuencia de nuevas complicaciones ocasionadas por su uso.

La mejoría, ó más bien aparente mejoría, puede explicarse fácilmente. La tuberculina puede, como cualquier otro expectorante, producir un aumento de expectoración, y quizá una cantidad de bacilos será separada de su albergue, y naturalmente á una diminución de expectoración sigue la acción secundaria propiamente llamada. Si tal acción secundaria dura por algún tiempo, entonces mejorará la salud general del paciente, y con buen apetito y conveniente cuidado, ganará en peso.

El alborozo causado por aquel cambio favorable durará hasta que se agote la acción secundaria y nuevas colonias de bacilos se localicen en el terreno infectado.

Y esto pronto ocurrirá, porque el terreno nutritivo del bacilo no puede ser desarraigado, sino que permanece todavía lo mismo.

El esfuerzo para desarraigar el terreno infectado por medio de la tuberculina, trae á la memoria un proverbio del poeta Haller, quien decía, hablando de la especie humana:

Unselig Mittelding von Engel und von Vieh
Du prahlst mit der Vernunft, und du gebrauchst
(sie nie.[1]

ESPASMOS, CONVULSIONES, ETC.

FERRUM PHOS.—Convulsiones con fiebre en la época de la dentición de los niños.

KALI PHOS.—Accesos por algún susto, con semblante pálido ó lívido. Espasmos histéricos con pérdida del conocimiento y delirio musitante.

MAGNESIA PHOS.—Calambres en cualquier parte del cuerpo, piernas, garganta, laringe, etc. Calambre de los escribientes. Contracción muscular, sacudimientos y espasmos. Convulsiones con rigidez de los miembros ó del cuerpo, contracción de los pulgares entre los dedos cerrados, etc. Excitación exagerada de las fibras nerviosas. Sacudidas convulsivas de las comisuras de la boca. Espasmo de la garganta por la acción de tragar, tartamudeo espas-

1 Desgraciada posición entre ángel y animal,
De prudencia haces alarde, y no la usas jamás

módico. Espasmos tónicos, contracciones violentas y rigidez de los músculos durante intervalos más ó menos cortos. Tétanos, trismus (fricciónes en las encías). Espasmos tetánicos, como los de *Bellad.*, cuando esta última no ha dado buen resultado.

CALCARERA PHOS.—Convulsiones de la dentición, sin fiebre, si falla *Magnesia phos.* Accesos durante el desarrollo, en la infancia, en la adolescencia ó en la vejez, cuando en todos estos casos hay deficiencia de las sales de cal. En los enfermos pálidos, anémicos, en los estrumosos y escrofulosos. Calambres y movimientos convulsivos en toda especie si falla *Magnesia phos.*

CASOS CLÍNICOS.

Espasmos con contracciones de los dedos, ojos abiertos; durante los intervalos tiene una tos espasmódica. *Magnesia phos.* 9ª x curó.—*Raue's Record Homœopathic Literature.*

A. R. V. G., señorita de 18 años, visitió, en compañía de su madre, en el verano pasado (1875) un establecimiento hidroterápico. Sin estar enferma, hizo uso de los baños, aun durante su período catamenial. Inmediatamente después de ésto experimentó violentos espasmos ó calambres, los que tenían lugar diariamente, y continuaron después de haber regresado a su casa. Se consultó á un médico, en virtud de que la enfermedad aumentaba á pesar de diferentes medicinas. Fué consultado un segundo doctor, quien estuvo de completo acuerdo en el diagnóstico, como también en el tratamiento adoptado por su colega. Las inyecciones de morfina, muy fuertes y repetidas varias veces al día, fueron los principales remedios aplicados; pero la penosa enfermedad no podía disiparse de modo alguno; al contrario, los calambres aumentaban en violencia y frecuencia. El médico que la atendía de-

claró finalmente que no habría cambio de mejoría hasta que la paciente tomase algunos baños ferruginosos en la primavera. Los padres estaban temerosos de que su hija no viviese para entonces, lo que tal vez sucedería si no se hacía algun esfuerzo paaa alejar el acceso. En consecuencia, telegrafiaron solicitando de mí una visita. El 6 de Septiembre del pasado ví á la paciente por primera vez. La había conocido anteriormente y quedé asombrado al encontrar, en lugar de la que había sido una mujer sana y rozagante, á una mujer pálida, extenuada, que no habría yo reconocido. Durante mi presencia, tuvo un ataque, sus funciones estaban descompuestos, los ojos vueltos hacia arriba, espuma por la boca, y en seguida un terrible paroxismo en que pegaba y golpeaba con las manos y los pies, tal como nunca había yo visto. Esto fué solamente el principio; repentinamente la parte superior de su cuerpo se torció de un modo indescriptible, el occipucio encajado profundamemte en la almohada, los pies haciendo fuerza contra el rodapié de la cama, su pecho y abdomen llegaron á arquearse como un puente, elevándose casi media yarda, y conservó esta posición forzada por varios segundos. De repente todo el cuerpo se sacudió hacia arriba con un brinco, y la pobre paciente se agitó de un lado á otro con su espina contraída. Durante todo el ataque, que duró varios minutos, estuvo completamente sin conocimiento; los pellizcos y golpes dados con la mano no tenían efecto, el rociarle agua fría en la cara ó la aplicación de plumas quemadas á la nariz era ineficaz, las pupilas estaban completamente insensibles á la luz. *Ignat.*, que fué la que ordené, no produjo efecto; *Cupr. met.* obró mejor, pero sólo temporalmente; *Bellad.*, *Ipec.* y *Pulsat.* (la última por la supresión del flujo catamenial) no dieron resultado. Los ataques no aumentaban ni disminuían en el menor grado; por deseos de sus padres tuve que hacer uso de las inyecciones de morfina. En mi visita del 4 de Octubre, los espasmos avanzaban con tal violencia que el catre cedía á su esfuerzo. Consulté la Terapéutica de Schüssler, y le ordené *Magnes phos.* Después de tomar este remedio apareció el flujo catamenial el 10 de Octubre; pero su estado, por otra parte, no había experimentado ningún cambio. Los espasmos continuaban con la misma violencia. Luego, recordando el precepto de Schüsller para usar *Calcarea phos.* cuando *Magnes phos.*, á pesar de estar indicada por los síntomas, manifiesta

ser incapaz de producir el efecto deseado, la dí *Calcarea phos.* el 16 de Octubre, una dosis suficiente cada dos horas. Inmediatamente los espasmos vinieron á hacerse menos frecuentes. El sexto día hubo un ataque, débil y de corta duración. Desde esta fecha tuvo tranquilidad hasta el 6 de Noviembre, día de la vuelta del período, el que fué precedido por un ataque sumamente corto. El 14 de Diciembre fuí llamado por la señorita, ya con aspecto de salud y rozagante, quien deseaba consultarme para una ligera afección bronquial. Me dijo estába enteramente curada de sus ataques, y al principio de Diciembre el periodo había sido completamente regular, sin experimentar ninguna incomodidad. (De Schüssler).

Tuve que tratar un caso que por ser muy interesante merece la atención de los médicos. Fuí solicitado para ver á una señora avanzada en años. Habia estado padeciendo casi por cinco semanas de ataques terribles de espasmos convulsivos. Durante las últimas veinticuatro horas tuvo treinta ataques terribles de espasmos convulsivos. Durante las últimas veinticuatro horas tuvo treista ataques. Los espasmos producían en su cuerpo el efecto de un choque eléctrico, al grado de tirarla al suelo. El ataque duraba unos cuantos minutos, y una vez terminado, la enferma se sentía bastante bien, aunque un poco agotada. No se atrevía entonces á dejar la cama, temiendo golpearse. Había sido tratada por su primer doctor con *Flor zinci.*, solución de Fowler, y fricciones, pero sin éxito. Cuando ví á la señora, pensé en experimentar los remedios funcionales de Schüssler. Sabiendo que *Magnes. phos.*, *Kali phos.* y *Calcarea phos.* eran prescritos para calmar los espasmos, escogí el último, *Calcarea phos.*, atendiendo á las circunstancias. Al día siguiente, para admiración de los que le rodeaban, encontré á la anciana haciendo ejercicio alrededor del aposento. Me recibió con una sonrisa, exclamando: "Ah! Doctor, mis espasmos están curados." Y así era: no tuvo otro ataque. (Dr. Fechtman. De Schüssler).

El Dr. F., de Alsó, Hungría, refiere: Fuí solicitado para ir al campo á ver á un hombre que estaba padeciendo desde hacía tres días de sollozos convulsivos y espasmódicos. Estaba recostado en la cama. Las inyecciones subcutáneas de morfina, la fricción con cloroformo y los sinapismos (cataplasmas con mostaza) fueron todos empleados sin éxito.

Aunque los sollozos eran mitigados por dos ó tres horas, volvían con más violencia que nunca. Le dí una dosis en polvo de *Magnes. phos.* en la mitad de un vaso de agua. Después de la segunda dosis, que fué una cucharada, los sollozos cesaron enteramente, con asombro de todos los presentes. (De Schüssler).

Después de terminada la publicación de la precedente edición de esta obra, se han publicado muchas y repetidas relaciones de calambres de los escritores curados con *Magn-phos.*

ESPERMATORREA.

NATRUM PHOS.—Emisiones todas las noches, deseo sexual casi extinguido. Semen delgado, acuoso, huele como á orina corrompida. En los experimentadores produjo emisiones seminales todas las noches; al principio parece que hay eretismo con ensueños lascivos; pero más tarde tienen lugar las emisiones, una ó dos cada noche, sin ninguna sensación. Estas fueron seguidas de debilidad en la espalda y temblor de las rodillas, las que se sienten como si flaqueasen. (Farrington).

KALI PHOS.—Nervosismo, decrecimiento de la emoción sexual excesiva, sea satisfecha ó reprimida. Impotencia acompañada de secreciones nocturnas con estas indicaciones nerviosas. (Nottingham). Intenso deseo sexual. Emisiones dolorosas, por la noche. Postración y visión débil después del coito.

NATRUM MUR.—Emisión de líquido prostático. Poluciones, seguidas por calofríos, lasitud y aumento del deseo sexual. Impotencia.

SILICEA.—Eretismo sexual, con enfermedad paralítica. Pensamientos sexuales persistentes; frecuentes emisiones nocturnas.

CALCAREA FLUOR.—Goteo constante del fluido seminal y prostático, con diminución del volumen de los testículos.

ESPINA, ENFERMEDAD DE LA.

KALI MUR.—Tabes dorsales, degeneración de la médula espinal.

KALI PHOS.—Reblandecimiento idiopático de la médula espinal con entorpecimiento molecular de los centros nerviosos. «Anemia espinal por agotamiento, producido por algunas enfermedades, tales como difteria, paraplegia de origen reflejo, con dolores de estropeo agravados por la quietud, pero que se exacerban al comenzar á moverse.» (Arndt).

NATRUM PHOS.—Anemia espinal. «Debilidad paralítica de las extremidades inferiores, con postración general, pesadez y sensación de fatiga, especialmente después de un corto ejercicio, ó ascendiendo escaleras, las piernas flaquean de tal manera que se encuentran incapacitadas de continuar adelante.» (Arndt).

CALCAREA PHOS.—Anemia espinal. Curvatura espinal, debilidad espinal. «Dolor como de calambre en el cuello, incomodidad y dolores entre los omóplatos, raquialgia y dolores en la región lumbar, curvatura de la espina en la misma región, absce-

sos cerca de la región lumbar, tabes mesentérica, raquitis, fontanelas abiertas, niños extenuados de carnes blandas y arrugadas, predisposición para los forúnculos y úlceras, criaturas de carácter impertinente y colérico, agravación por esfuerzo corporal y por el aire libre.» (Arndt). Inflamación procedente de enfermedad de la estructura ósea de la espina.

CALCAREA FLUOR.—Espina ventosa. Anemia espinal.

SILICEA.—Cuando está afectada la estructura ósea de la espina, mielitis, coccigodinia, espondilitis. Esclerosis espinal posterior.

CASOS CLINICOS.

El Dr. Thos. T. McNish, Allegheny, Pa. en el *American Homœopathist*, Octubre 15 de 1897, dice: Hace dos años fuí consultado por un agricultor, de sesenta años de edad, delgado, de temperamento nervioso, acerca de una dispepsia que padecía ya hacía tres años. Era un caso grave y molesto; pero no entro á detallarlo, bastándome decir que le dí *Sepia*, 30ª trituración, y este simple remedio efectuó una completa curación.

El enfermo me informó entonces que tenía otro padecimiento de fecha mucho más remota, el cual no había mencionado antes porque lo creía incurable; pero el tratamiento afortunado de su dispepsia le dió esperanza de que el otro trastorno que padecía pudiese ser también curado. La historia del caso en pocas palabras es ésta: Diez y nueve años antes, al tiempo que cavaba un agujero, sufrió una torcedura en la espalda; las consecuencias de esta lesión se disiparon, no obstante, y se creía bien, cuando repentinamente se vió acometido de lo que él llamaba "un calambre" en la parte inferior de la región dorsal y en la superior de la lumbar, calambre que le daba vuelta alrededor hasta que

él "se volvía para atrás." El espasmo, que era muy doloroso, le repetía varias veces. Después de un intervalo de algunas semanas tenía otro ataque, y desde ese tiempo en adelante aumentaban en frecuencia hasta tener uno ó más diariamente. Su salud en general no parecía afectada. Siguió el tratamiento de muchos médicos (todos de la antigua escuela) con muy ligero resultado, y por último se puso en manos de un especialista, quien le daba masage eléctrico una ó dos veces por semana. Este fué continuado con regularidad por cuatro años, en cuyo tiempo los ataques disminuyeron en frecuencia (pero no en intensidad), de modo que no se presentaban más á menudo, sino una vez por semana, y en alguna ocasión el intervalo fué de dos semanas. (Olvidé decir, en el lugar conveniente, que el paciente estaba siempre torcido hacia el lado derecho. Había muy ligera sensibilidad sobre la primera vértebra lumbar).

Comprenderéis fácilmente que no estaba satisfecho con este caso, y realmente vacilaba en hacerme cargo de él; pero la insistencia del enfermo me decidió, y después de dos semanas de estudio y reflexión prescribí *Magn. phos.*, 6ª x. trituración, cuatro dosis al día. Este método fué continuado por un mes.

El efecto de la medicina fué notable. Desde que tomó la primera dósis cesaron los espasmos, y aun cuando desde entonces han pasado más de diez y ocho meses no han vuelto jamás.

ESPINAL, IRRITACIÓN.

NATRUM MUR.—Se fatiga fácilmente, debilidad por el más ligero esfuerzo, inquietud de los miembros, dolor en la espalda y sensibilidad de la espina. Falta de sueño, desasosiego y debilidad. Dolor de cabeza al andar. Gusto salado y repugnancia para el alimento. La vista llega á ofuscarse después de la lectura, á la vez que solamente son visibles la mitad de los objetos. *Natrum mur.*, en sus primeros efectos,

estimula el sistema nervioso, causando contracciones musculares muy semejantes á las producidas por el galvanismo. También aumenta los corpúsculos rojos, las secreciones glandulares, la digestión, etc. A consecuencia de esta acción estimulante esa sal es tan eficaz cuando se aplica localmente en fricción á los músculos débiles, etc. Más adelante, sin embargo, *Natrum mur.* agota los nervios, disminuye la actividad glandular, y desarrolla la astenia y la anemia, acompañadas de enflaquecimiento. La piel está seca, áspera y cetrina; las membranas mucosas son también secas, hendidas y como barnizadas, acompañados estos síntomas de escozor y crudeza, ó de secreción escasa corrosiva. El enfermo se queja mucho de sequedad en la boca, cuando en realidad la molestia es originada por la viscosidad de las secreciones que no tienen su fluidez normal. Ahora bien, por este efecto atónico de la sal, observamos la neurastenia espinal. La cintura se siente paralizada, especialmente por la mañana al levantarse. Se siente la espalda como si estuviese quebrada. Las piernas débiles, temblorosas; peor en la mañana. Los pies pesados como el plomo. Con todo esto puede suceder el que la vejiga llegue á debilitarse, declarándose un goteo molesto de orina después de una evacuación normal, y podemos admitir este síntoma vesical como un concomitante de la debilidad espinal, aun cuando en la experimentación no se haya encontrado tal correlación, porque semejante combinación está en per-

fecta armonía con la índole del remedio. Podemos mirar la atonía espinal y vesical como una manifestación de la tendencia general de la sal para producir el agotamiento; de aquí que no sea un síntoma de parálisis, sino más bien de neurastenia.

SILICEA.—Irritación espinal alternando con sudor de mal olor en los pies. Irritación espinal en los niños que depende de las lombrices (*Natr. phos.*), agravación marcada en la época del novilunio. Irritación espinal con rigidez de la nuca y cefalalgia. Debilidad de la espalda y sensación paralítica en las extremidades inferiores. Ardor en la espalda, y dolor constante en su parte media. Coxis adolorido. El paciente está muy sensible al más pequeño ruido, tiene ásperas y amarillas las uñas de los dedos, aun en la cama conserva los pies fríos como el hielo. Piel enfermiza, cualquier pequeño traumatismo es causa de supuración. En general, se siente mejoría por el calor.

KALI PHOS.—Neurastenia, especialmente por excesos sexuales, caracterizada por intensa irritación espinal.

CALCAREA FLUOR.—Dolor de espalda simulando irritación espinal, con dolor de presión débil y tirante hacia abajo. Constipación de los intestinos.

ESTADOS MENTALES.

FERRUM PHOS.—Consecuencias de la cólera. Indiferencia para los asuntos ordinarios, pérdida de la

energía y la esperanza; se molesta por cosas triviales.

KALI PHOS.—Cansancio cerebral por exceso de trabajo, con pérdida del apetito, estupor, depresión de espíritu, irritabilidad, ó gran impaciencia, pérdida del sueño y de la memoria. Enfado é irritabilidad en los niños; mal genio ocasionado frecuentemente por desórdenes nerviosos. Miedo, malhumor en los niños, gritan y lloran, Sonambulismo. Estado muy nervioso, sobresaltos al más ligero ruido, habla mientras duerme, necesidad de ser transportado de una á otra habitación al tiempo en que despierta, lo que acontece fácilmente, hablando entonces con divagación. Désconfianza acerca de los negocios y asuntos pecuniarios. Poca disposición para asociarse con los demás. Abatimiento de espíritu, sensación de languidez. Miedo del ruido y aumento de sensibilidad para el mismo. Entorpecimiento, falta de energía, timidez. Alucinaciones, nostalgía. Actividad morbosa de la memoria, perseguido por visiones del pasado y deseos vehementes después de ellas. HIPOCONDRÍA, MELANCOLÍA, malhumor por agotamiento nervioso. Ilusiones mentales (estado anormal de la substancia gris de los nervios), impresiones falsas y fantasías. Lasitud, estado depresivo, falta de energía. Locura, la pérdida de la facultad del raciocinio requiere este remedio. Manía en sus diferentes grados y períodos. Melancolía acompañada de agotamiento y desecación que afecta los centros nerviosos de la médula espinal. PÉRDIDA DE

LA MEMORIA. Melancolía por demasiado esfuerzo intelectual. Terrores nocturnos en los niños; despiertan gritando y asustados. Desasosiego é irritabilidad. Sensibilidad demasiado exagerada. Suspiros y depresión del ánimo, con inclinación á ver las cosas por el lado más triste. Suspiros y lamentos en el sueño. Esquivez, bochornos excesivos por sensibilidad emotiva; falta la fuerza de dominio sobre los nervios de la túnica de los vasos sanguíneos. Estremecimientos al ser tocado, ó al oír un ruido imprevisto; inclinación á las quejas, hace "las cosas más grandes de lo que son en realidad." Efectos consecutivos á un pesar.

NATRUM SULPH.—Tendencia al suicidio, necesita ejercer gran dominio para evitarlo. TRASTORNOS MENTALES OCASIONADOS POR CAÍDAS Y TRAUMATISMOS DE LA CABEZA. Intolerancia para la música, la que produce melancolía.

MAGNESIA PHOS.—Ilusiones de los sentidos. Muy desmemoriado. Plenitud é incapacidad para pensar claramente. Indisposición por cualquier esfuerzo mental.

NATRUM MUR.—Gran abatimiento, aprensión por el porvenir, recuerdo persistente de acontecimientos desagradables, los consuelos solamente dan por resultado empeorar su situación. Hipocondriasis, acompañada con un estado de sequedad é irritabilidad de las membranas mucosas, y constipación con evacuación de materias fecales duras. Tristeza con

palpitación; evita la compañía, enfadándose con demasiada facilidad.

NATRUM PHOS.—Nervioso, irritable, enfadado por bagatelas. Ansioso y aprensivo. Se imagina que son personas las piezas que componen el mueblaje, que oye pasos en la habitación inmediata.

SILICEA.—Se imagina estar en dos lugares al mismo tiempo. Monomanía que le obliga á temer picarse con alfileres y á estar buscando esos objetos. Deseo por el hogar doméstico y todo lo que á él se relaciona; pensativo, obstinado, irascible. Postración y debilidad nerviosa, inquietud y ensueños penosos acompañan estos síntomas, los que también se agravan al aproximarse el tiempo del plenilunio, en el cambio de estación y durante una tempestad.

CALCAREA FLUOR.—Gran depresión con recelo infundado de ruina en los negocios. Indecisión.

CASOS CLINICOS.

IDIOTISMO.—En Enero de 1891, una señora vino á consultarme acerca del estado mental del más joven de sus hijos. Este, de nombre C. S., tenía entonces 26 años, y una estatura de 5 pies 8 pulgadas, y aunque bastante robusto físicamente, de buen apetito, etc., era un idiota consumado, incapaz para responder á alguna pregunta, excepto el decir sí ó no, y aun estas respuestas no carecían de estupidez. Su apariencia y manera de obrar eran las de un niño pequeño. Observé que todos sus dientes estaban cariados, y que uno de los lados de la cabeza, el izquierdo, era mucho más pequeño que el derecho. Muy nervioso en su modo de ser, no podía permanecer quieto en una silla por espacio de cinco minutos, y cuando los accesos de nerviosidad llegaban al grado de paroximos se arrancaba todos sus vestidos y daba vueltas

por todo el aposento, quedándose completamente desnudo. No obstante, parecía tener algún temor ó respeto por su anciana madre, la única, realmente, capaz de dominarle. No tenía el vicio de la masturbación, ni había cosa en lo absoluto que pareciese interesarle.

Algunas veces y por varios años, este muchacho había sido tratado por médicos de la escuela antigua, pero sin resultado alguno. El paciente era el séptimo hijo de la familia; todos los otros estaban sanos, y lo mismo el padre y la madre. Me informé si durante el embarazo de este niño la madre había estado expuesta á algún accidente ó susto repentino. Me contestó ella misma que no; que por lo contrario, siempre había tenido una vida quieta y feliz.

Prescribí para este paciente: *Magnesia phos.* y *Calcarea phos.*, una y otra en dosis de 5 granos de la 3ª tr. x., para tomar en alternación cada hora durante el día; el muchacho comunmente dormía muy quieto por la noche. Recomendé que cada semana me lo trajesen; además, no prometí una curación, sino que advertí á la madre tuviese perseverancia con el pobre muchacho, porque el tratamiento sería largo y cansado.

Después de un mes del tratamiento arriba indicado, la madre manifestaba que los desagradables accesos nerviosos en que se hacía pedazos el vestido estaban contenidos; el muchacho era más quieto en su carácter, siguiéndola por toda la casa, y pareciendo tomar interés en sus trabajos domésticos.

Dos meses después de haber comenzado el tratamiento, su inteligencia parecía de algún modo desarrollada; ayudaba á la madre en el barrido de las piezas y lavaba la vajilla sin quebrarla, procurando interesarse en muchas otras diferentes cosas, particularmente fijando la atención en las imágenes ó fotografías, é indicando correctamente que tal ó cual retrato era de sus hermanos y hermanas, etc. Después del cuarto mes de tratamiento, aconsejé á la madre le permitiera ir con sus hermanos, que eran carpinteros, y ver si podía serles útil en su trabajo. Así se hizo; comenzó por ayudarles cargando las tablas y algunas veces cepillándolas cuando era necesario; semana tras semana llegó á estar más interesado en su obra.

Finalmente, después de ocho meses de tratamiento, siempre bajo la influencia de *Magnesia phos.* y *Calcarea phos.*, estuvo capaz de hacer

ocho horas de trabajo común de carpintería para sus hermanos, y ganar $2 en un día, sin experimentar repugnancia, fatiga ó pereza alguna. Hasta el presente continúa trabajando con constancia, por supuesto, como un hombre de escasa inteligencia, pero ya no es una carga pesada como antes, para su pobre y anciana madre.

La mejoría de ese idiota ha sido hasta ahora permanente. (Dr. E. A. de Cailhol, Los Angeles, Cal.).

Un paciente de 80 años, sufriendo de profunda hipocondriasis, melancolía, disgusto de la vida, miedo á la muerte, carácter desconfiado, desanimado y triste. Después de haber fallado los remedios homeopáticos ordinarios, se restableció enteramente con *Kali phos.*, 6ª.

Otro caso de melancolía religiosa, de tres semanas de duración, en una mujer, fué curado enteramente por *Kali phos.*, 6ª, en una semana. (Dr. Arnberg, *Allg. Hom. Zeit.*, 1881). La descripción detallada está más abajo.

La señorita M., hija del finado Dr. M., había estado padeciendo desde los diez y ocho años de ataques accidentales de aberración mental; pero á medida que pasaban los años, estos ataques de locura llegaban á ser peores y más frecuentes, hasta que su hermano creyó conveniente entrar en arreglos con el doctor del manicomio del Distrito para transportarla allí. Como un recurso último, se llamó á un amigo para ver si los nuevos remedios podrían ser de algún servicio en semejante caso desesperado. Habiendo asegurado á su familia que *Kali phos.* obraría bien, se lo dieron sin tardanza, cuatro dosis diarias por algunas semanas. Esto tuvo lugar hace cuatro años. El resultado fué de lo más satisfactorio. Después de haber tomado la medicina no ha vuelto á tener otro ataque, y está completamente curada; apta para dirigir los quehaceres domésticos, recibir y hacer visitas, lo que no había estado capaz de hacer por algunos años, á causa de sentirse tan nerviosa y esquiva durante los intervalos de los ataques. Varios casos de una naturaleza semejante han sido tratados con igual éxito: dos de éstos de manía puerperal. (M. D. W., de Schüssler).

En el siguiente caso se trata de una señora de 44 años. "Ví," escribe el Dr. A., de Arnsberg, el 7 de Febrero, "á una señora sufriendo de enajenación mental. Tenía por origen la melancolía religiosa, aun cuando antes de este acontecimiento no había tenido inclinación

para las prácticas religiosas. Declaraba estar perdida para siempre; se lamentaba, gritaba, torcía las manos y desgarraba sus ropas, ó los pedazos de papel que se le ponían cerca para impedirla arrancarse sus vestidos. No conocía á los que la rodeaban, y estaba impósibilitada para dormir Sus ojos tenían una mirada extraviada, y con frecuencia se necesitaban dos personas para sostenerla. Solamente apretándole la nariz, y por la fuerza, podía hacérsele pasar un poco de alimento ó medicina. Prescribí *Kali phos.*, en vista de que el estado de agitación en que se hallaba la enferma tenía origen en otro de depresión, para lo cual es á propósito ese medicamento." El Dr. Schüssler, dice en su obra: "Un desorden funcional de las moléculas de esta sal causa en el cerebro depresión mental, manifestándose por medio de la irritabilidad, el terror, el llanto, la nerviosidad, etc., también como por el reblandecimiento cerebral." Tomó *Kali phos.* con resultado excelente. Una experiencia anterior adquirida por el uso de este remedio me indujo á elegirlo.

"En esa ocasión tuve el caso de un anciano de 80 años. Sufría de enajenación mental, la cual se le manifestaba bajo la forma de intensa hipocondriasis y melancolía. Estaba cansado de la vida, pero al mismo tiempo tenía miedo á la muerte. Por algunas semanas había sido tratado inútilmente con muchos remedios aparentemente indicados para su enfermedad, como Nux vom., Aurum, Bromuro de potasa en dosis alopática; sin embargo, fué curado rápidamente por el uso continuado de *Kali phos.* Apenas habían pasado ocho horas de haber comenzado el tratamiento cuando ya experimentó una cierta sensación de tranquilidad, y esa noche tuvo un sueño sosegado. No tuve motivo, por consiguiente, para arrepentirme del tratamiento escogido, tanto más cuanto la mejoría continuaba con seguridad, al grado que el 25 de Febrero interrumpí mis visitas profesionales.

"He visto con frecuencia á mi enferma del caso antepenúltimo, constantemente ocupada en su casa, con su jovialidad acostumbrada, y expresándose con una calma completa respecto á su pasada enfermedad." (Tomado de Schüssler).

FIEBRE SIMPLE.

Véanse también Fiebres Especiales.

FERRUM PHOS.—Fiebres catarrales con pulso acelerado. Es el principal remedio para el principio de la calentura en todos los períodos de las fiebres inflamatorias, reumáticas, etc. "Por su administración se han obtenido los más satisfactorios resultados para impedir la fiebre traumática." Fiebre sinoca. Calofrío todos los días á la 1 p. m. Calor seco en las palmas de las manos, cara, garganta y pecho.

KALI MUR.—Con estreñimiento y capa blanca y espesa sobre la lengua. Fiebre catarral con grande calofrío; el menor aire frío le hace estremecer todo el cuerpo, tiene que sentarse cerca del fuego para conservar el calor y aún así está friolento. Se mejora abrigándose en la cama. (Holbrook).

KALI SULPH.—Este remedio, administrado muy repetidas veces, ayuda á producir la transpiración cuando la temperatura de la sangre se eleva por la noche. Se aplicarán además lienzos calientes con frecuencia. Obra también en las fiebres ocasionadas por envenenamiento de la sangre.

NATRUM MUR.—Fiebre de heno con secreción acuosa de los ojos y de la nariz.

KALI PHOS.—Fiebres nerviosas, temperatura alta, pulso vivo é irregular, agitación nerviosa ó gran debilidad y depresión. En las fiebres de carácter asténico, sequedad de la boca, fuliginosidades en los

dientes, y delirio; este remedio ha producido los más grandes resultados. (Meadow).

CASOS CLINICOS.

M. L., caballero de 38 años, se resfrió mientras estaba en estado de perspiración. Como consecuencia de esto sufrió de dolores desgarrantes en los miembros, ruidera en los oídos, con torpeza de la audición y cefalalgia frontal. Estos dolores se acompañaban con fiebre; y á pesar de que tenía sudores nocturnos, no le proporcionaban alivio. El apetito era escaso y tenía la lengua cubierta con una capa blanca. Receté una pequeña cantidad de *Kali mur.* en agua, para que tomase cada dos horas. Se declaró una rápida mejoría general, pero permanecía aún el dolor y el entorpecimiento de los pies. Al mismo tiempo se había suprimido la transpiración habitual que padecía en los pies. En este estado recibió el enfermo Silicea, dos dosis diarias por semana. La transpiración de los pies se restableció, y con la aparición de ésta, desapareció el resto de los padecimientos, volviendo por completo la salud. (De Schüssler).

El Dr. G. H. Martín refiere un caso de fiebre elevada (104° F.) acompañada de agotamiento general, estropeo en los músculos, cefalalgia y diminución del apetito, en la que prescribió *Ferrum phos.* 12ª x., que no dió resultado, pues el enfermo declaraba al siguiente día que sus síntomas se habían agravado. Entonces se le prescribió *Ferum phos.* á la 6ª x., el que produjo una inmediata mejoría.

FIEBRE INTERMITENTE.

NATRUM SULPH.—La fiebre intermitente en todos sus períodos reclama principalmente este remedio.

(3ª x. trit.) Constitución hidrogenoide, agravación por la humedad del tiempo. Forma terciana. La aplicabilidad de *Natrum sulph.* se apoya en las siguientes consideraciones químico-fisiológicas: En los pacientes sujetos á las calenturas intermitentes está aumentada la cantidad de agua en los corpúsculos de la sangre y en el suero de la misma, y por consiguiente, está disminuida la proporción de oxígeno tomado por la sangre. *Natrum sulph.* favorece la separación del exceso del agua en el organismo. Cuando por medio de la acción de dicha sal ha sido reducida la proporción de agua en los corpúsculos al estado normal, están de nuevo en aptitud los mismos corpúsculos para tomar la cantidad suficiente de oxígeno y distribuirla á todos los tejidos. Como los tejidos por esta circunstancia vuelven de su estado patológico á su condición fisiológica normal, están en estado de separar del organismo la causa de la intermitente—bien sean emanaciones pantanosas (miasmas) ó bacterias (fungus). El aire seco que se respira en los lugares montañosos, y que es abundante en oxígeno, puede curar espontáneamente la fiebre intermitente, porque el organismo se apodera de una gran cantidad de oxígeno y desaloja mucha agua por la evaporación. Los enfermos que padecen de intermitentes necesitan abstenerse de la dieta láctea, suero de manteca, huevos, grasas y pescado. "Fiebre intermitente, biliosa, evacuaciones sanguinolentas; es un síntoma muy constante la capa sobre la lengua de un color

verdoso ó bronceado; conjuntiva amarilla." (Duffield).

NATRUM PHOS.—Fiebre intermitente con vómito de ácidos ó de masas agrias.

MAGNESIA PHOS.—Fiebre intermitente con calambres en las pantorrillas. Los calofríos recorren la espalda á las 7 p. m., también se presenta un calofrío intenso á las 9 a. m. Gran postración. Intermitente con violentos calambres y cianosis de las extremidades.

KALI MUR.—En la fiebre intermitente cuando la saburra de la lengua es de un aspecto blanco-pardusco ó blanco. (En alternación con *Natrum sulph.*)

KALI PHOS.—Fiebre intermitente con transpiración profusa, debilitante. Forma cuartana.

FERRUM PHOS.—Fiebre intermitente con vómitos alimenticios.

CALCAREA PHOS.—Fiebre intermitente crónica de los niños, como un remedio intercurrente.

NATRUM MUR.—Calofrío cerca de las 10 á las 11 a. m. Gran sed en todos los períodos. Cefalalgia violenta aliviada por la perspiración. Vesículas febriles al rededor de los labios. Si el hidroa se presenta en el primer acceso de la fiebre, aunque no exista luego, después del abuso de la quinina. En los niños de pecho es una indicación para el uso de este remedio el hidroa sobre los labios, y posteriormente las úlceras que le suceden, con ataque por la mañana. (H. C. Allen). La intermitente larvada se presenta como neuralgía de la cabeza y cara.

KALI SULPH.—Fiebre intermitente con capa amarilla y viscosa en la lengua.

CASOS CLÍNICOS.

El Sr. L. hacía tres meses que padecía calofríos y fiebre. Había tomado quinina y otros remedios. Paroxismos cada tercer día á las 11 a. m., con dolor severo en los miembros y en la cintura; el calofrío le duraba cerca de dos horas, sin estar acompañado de sed; la fiebre toda la tarde con dolor de cabeza como si estallase, y sed intensa, tomando grandes cantidades de agua fría.

Poca ó ninguna transpiración, come y duerme bien, y al día siguiente volvía á sus ocupaciones. *Natrum mur.* 30 trit., cada hora durante la apirexia.

El próximo del calofrío fué ligero y no volvió más el acceso. (H. C. Allen.)

El Dr. Shervino, de Dallas, Texas, refiere dos casos de intermitente curados con *Magnesia phos.* 13 x. Las indicaciones eran: antes del calofrío, dolor en el cuello, rigidez, dolor en la columna vertebral; durante el calofrío, calambres en los miembros inferiores, mejorados porque alguno le cogiera uno ó ambos pies y tirase de ellos extendiéndoselos (lo que aliviará cualquier calambre en las extremidades—Eds.); sed antes y durante el calofrío, no existe en el período del calor, ó en el del sudor que termina el acceso; calambres y vómitos al mismo tiempo durante el calofrío. (S. J. H.)

FIEBRE PUERPERAL.

KALI MUR.—Este remedio puede ser suficiente por sí sólo para esta enfermedad, ó, en alternación con *Ferrum phos.* para la exudación.

KALI PHOS.—Manía ó fiebre puerperal, cuando se declaran concepciones absurdas, ilusiones, ó locura violenta. Remedio específico.

NATRUM MUR.—Es un remedio intercurrente, útil en las convulsiones puerperales.

CASOS CLÍNICOS.

Caso de fiebre puerperal. Calofrío, seguido por fiebre. Supresión de los loquios, leche y orina. Delirio de carácter alegre, profusa diaforesis crítica, sin sed ó lengua muy sucia, constipación intestinal y extensa timpanitis al través de las paredes abdominales. *Ferrum phos.* 6ª, una dosis cada hora. En diez horas todos los síntomas de forma urénica habían calmado; la enferma estaba llena de ánimo y consolada. Volvió la secreción de los loquios y de la leche, y la orina fué evacuada libremente. Se siguió un franco restablecimiento. (Dr. F. A. Rockwith, *American Journal Homœopathic Materia Médica*, 1875.)

FIEBRE TIFOIDEA.

FERRUM PHOS.—Cuando comienza la fiebre gástrica ó tifoidea, para el calofrío del período inicial.

Tifoidea, con extrema postración; hemorragia frecuente, indicando la desorganización de la sangre.

KALI MUR.—Fiebres gástricas ó tifoideas, indicado por la capa blanca ó gris de la lengua y la soltura de los intestinos, con deposiciones amarillentas, de color de acre, ó floculentas, y para la sensibilidad é hinchazón abdominal.

KALI PHOS.—Síntomas malignos ó tifoideos, cuando éstos afectan el cerebro, causando estupor durante el curso de la enfermedad, ó con síntomas de putridez de la sangre. Debilidad, acción débil del corazón, insomnio, mal olor del aliento, evacuaciones pútridas, estupor. Fuliginosidades en los dientes.

Es un remedio excelente en la excesiva alteración

de la sangre, cuando el sistema parece invadido completamente por el miasma tifoideo y la enfermedad no está localizada en un solo órgano. El carácter repulsivo de las secreciones es un síntoma muy marcado para la elección de *Kali phos.*

KALI SULPH.—Fiebre gástrica ó de forma típica, con una elevación de temperatura por la noche y descenso de la misma en la mañana.

NATRUM MUR.—Estados malignos ó tifoideos durante el curso de cualquiera especie de fiebre, tales como sacudimientos con gran somnolencia, vómitos acuosos, sopor, lengua apergaminada, etc.

CALCAREA PHOS.—Después de las fiebres gástricas ó tifoideas, en la declinación de las enfermedades.

CASOS CLÍNICOS.

Fiebre tifoidea en un caballero joven, de un entendimiento muy activo; un síntoma prominente era que se ponía muy histérico, gritaba como un niño y sollozaba siempre que llegaba á estar nervioso. *Ignatia*, *Hyosc.*, *Stram.* y *Coffea*, todos fallaron en el alivio. *Kali phos.* curó este síntoma, y no recibió otro remedio durante todo el curso de la fiebre. Después de levantarse el paciente, el remedio pareció obrarle como un tónico. (Monroe.)

El siguiente artículo, debido á la pluma del Dr. A. P. Davis, de Dallas, Texas, apareció en el *Southern Journal of Homœopathy*, y es de interés, puesto que ilustra el valor de nuestros remedios en esa enfermedad:

"El modo más racional que se debe seguir es *reparar las pérdidas*, y ayudar á la naturaleza á *eliminar los excesos.* Hay depresión sensible en todos los casos de fiebre tifoidea; y como esta depresión es el resultado del cambio molecular, necesitan recibir nuestra atención especial las moléculas de los varios elementos.

Si se puede ó no efectuar ese cambio molecular con el uso de *Baptis.*, *Rhus tox.*, *Bryon.*, *Phos. ac.*, *China*, *Cimicif*, *Ferrum phos.*, *Natrum mur.* ó *Natrum phos.*, es cuestión que demanda atención especial. Algunos han pretendido alcanzar buen éxito por el uso de Baptis. tinct., otros por el de Rhus tox., como su único recurso, empleando un tratamiento accidental, según los síntomas que se presentan, y este método se ha visto coronado por el éxito. Es un hecho admitido que la inflamación en las glándulas de Brunner y en las de Peyer mantiene la fiebre, por consiguiente el remedio que cure estas glándulas abreviará la enfermedad, y los remedios que he encontrado para efectuar esto con más seguridad son *Ferrum phos.* y *Kali mur.*, administrados en alternación cada hora durante la fiebre, y más si existe una capa blanca ó pardusca sobre la lengua. El *Ferrum* es el mejor remedio para la fiebre, y el *Kali mur.* el mejor eliminador de semejantes estados morbosos. Si la lengua se pusiere morena, se dará *Kali phos.*, y especialmente en aquellos casos en que el enfermo está delirante ó nervioso, y en la forma más maligna de la enfermedad. Si la lengua presenta una capa amarilla, brillante, entonces se recurre á *Magnesia phos.*, con especialidad cuando hay dolor en los intestinos y una sensación de presión en el estómago. Si tiene la lengua una capa amarilla color de oro, cremosa y húmeda, se da *Natrum phos.*

Se dará *Natrum sulph.* cuando la capa de la lengua sea de un verde moreno sucio. Estos remedios están indicados especialmente según el estado que presente la lengua. Por último, cuando el paciente comienza á convalecer, se termina el tratamiento con *Calcarea phos.* como un constituyente necesario al tejido conectivo y á las celdillas de la sangre.

En todos los casos en que he usado estos remedios de los tejidos, han probado abundante y suficientemente, y curarán si se dan conforme á sus indicaciones. Proveen los elementos inorgánicos que están desordenados ó que faltaban en todos los períodos de la enfermedad, y si se ha tenido una observancia estrecha en su elección, el médico curará indudablemente cualquiera enfermedad que pueda ser absolutamente curada. Ordinariamente les doy de la 4.ª x á la 6.ª x potencia, y si muchos me consideran como dogmatizador por el uso de estos remedios, yo no puedo ver hasta ahora la razón que haya para dejar de preferirlos en lugar del intrincado laberinto de supuestas experimenta-

ciones patogenéticas de la polifarmacia. Sin embargo de que he usado muchos policrestos, en la actualidad doy preferencia decidida á la aplicación conveniente de los Remedios de los Tejidos en los casos en que éstos están indicados."

Llamado en consulta para ver á la Srita. Nettie W., de 23 años, la encontré aparentemente en el último período de la enfermedad, con los síntomas comunes en semejantes casos. Como ya habían sido ensayados otros remedios y la paciente parecía sucumbir, aconsejé *Kali phos.* 6ª en solución. Con el uso de este remedio se reanimó, y fué continuado algunos días, dando como resultado final su restablecimiento. En otro caso semejante fué administrado el mismo remedio cuando otros parecieron no ser de utilidad, también con buen resultado de producir un cambio hacia la mejoría en unas cuantas horas, seguido por el completo restablecimiento. (C. T. M.)

FIEBRE AMARILLA (VÓMITO).

NATRUM SULPH.—Si la enfermedad toma el carácter de una intensa fiebre biliosa remitente, y si hay exceso de bilis. Vomito verdoso, amarillo, obscuro ó negro.

FERRUM PHOS.—Para la fiebre en alternación con el remedio precedente. Al principio del ataque.

KALI PHOS.—Para el colapso y la depresión de las fuerzas vitales. También para los vómitos de color negro, azuloso ó verde-obscuro y para las hemorragias.

FÍSTULA ANAL.

CALCAREA PHOS.—*Calcarea phos.* 1ª x y *Silicea* 3ª x, tres veces al día, alternándolos cada semana, es el tratamiento recomendado por el Dr. C. R. Fleury.

CALCAREA SULPH.—Abscesos dolorosos alrededor del ano en casos de fístula. Secreción purulenta de los intestinos.

GARGANTA, MAL DE LA.

FERRUM PHOS.—Garganta seca, roja, inflamada, con mucho dolor (dosis muy frecuentes); reduce la congestión, el calor, la fiebre, el dolor y latidos en la ulceración de la garganta, paladar inflamado y adolorido, período agudo de la laringitis. Ardor de la garganta con dolor. Mal de garganta en los cantores y en aquellos que hacen uso diariamente de la voz. Tendencia á enronquecerse por la noche.

KALI MUR.—Cuando se localiza la hinchazón en las glándulas ó amígdalas se da este remedio alternado con *Ferrum phos.* Garganta ulcerada con placas ó manchas blanquizcas ó parduscas, y la lengua blanca que al remedio caracteriza. Mal de garganta sifilítico; dolor al tragar. Expectoración desagradable de pequeñas masas caseosas. El Profesor Wertheim, de Viena, recomienda este remedio empleándolo como lavado y gargarismo en las enfermedades de la boca y garganta. Faringitis granulosa. Elevaciones adenoides; secreción de moco blanco y glutinoso; también cuando se exhala por la parte posterior de las fosas nasales. El paciente hace esfuerzos y tiene que sorber para arrojarlo. En la faringitis foliculosa con secreción tenaz, glutinosa y tos, aliviada temporalmente por despedir, después

de grandes esfuerzos, los esputos adheridos. Lo hemos encontrado más frecuentemente útil que *Kali bichromicum*. (Dr. H. C. French.)

KALI PHOS.—Mal de garganta gangrenoso. Garganta muy seca; deseo constante de tragar. Expectoración de mucus salado de la garganta.

NATRUM MUR.—Dilatación de la garganta. Bocio, si se acompaña de secreciones acuosas. Inflamación de las membranas mucosas de la garganta, una mucosidad transparente cubre las partes enfermas, relajación de la úvula. Mal de garganta crónico con sensación de una masa ó tapón, y gran sequedad de la misma garganta. Constricción y punzadas en la garganta. Faringitis foliculosa, especialmente en los fumadores después del tratamiento con el nitrato de plata.

NATRUM PHOS.—Amígdalas cubiertas con una mucosidad amarillo-cremosa, sensación de escoriación, el depósito húmedo que aparece en las mañanas sobre la lengua tiene un aspecto amarillo. Secreción como de una masa pequeña en la garganta, la que empeora al tragar los líquidos.

CALCAREA PHOS.—Como intercurrente en el mal de garganta de los predicadores.

CALCAREA SULPH.—Mal de garganta supurativo (véase Tonsilitis), para el último período de la ulceración de la garganta, pus amarillo.

MAGNESIA PHOS.—En la faringitis crónica con sofocación al intentar comer de prisa.

NATRUM SULPH.—Garganta adolorida con sensa-

ción de un cuerpo extraño al tragar en vacío. Ulceración de la garganta. Difteria con vómitos y afluencia de mucosidades que vienen del estómago. Ardores en el paladar durante los menstruos.

CALCAREA FLUOR.—Estado de relajación de la úvula, cosquilleo en la lengua. Excitación á toser. Expectoración dificultosa de mucus al principio de la mañana. El ardor en la garganta se mejora por el calor moderado.

CASOS CLÍNICOS.

Un actor, el Sr. E., me consultó para una irritación intensa de la garganta, que le impedía mucho la pronunciación, y era causa de un aliento sumamente malo. Esto era lo que principalmente lo molestaba, tanto más cuanto que estaba comprometido para desempeñar un papel, tres días después, en el que era indispensable la proximidad con los demás actores compañeros suyos. Habiéndolo examinado inferí que el resultado de su enfermedad era debido á una deficiencia de *kali phos.* y por consiguiente ordené este remedio. Al anochecer del segundo día el Sr. E. me informó que estaba completamente restablecido; del mal aliento no se percibía vestigio alguno. También declaró haber observado una mejoría notable luego que tomó la segunda dosis. (Dr. Luesse.)

GÁSTRICOS, DESARREGLOS.

Compárese con VÓMITOS.

FERRUM PHOS.—En el período de enfriamiento de la fiebre gástrica. Gastitris aguda con mucho dolor, tumefacción, sensibilidad en la boca del estómago, especialmente si se presentan vómitos de alimento. Dispepsia con bochornos, calor en la cara, epigas-

trio sensible al tacto. Indigestión con dolor latente ó pulsativo. Calor, enrojecimiento ó bochorno de la cara, ó bien vómitos de alimentos no digeridos, estando la lengua limpia. Indigestión por un estado de relajación de las paredes musculares de los vasos sanguíneos del estómago, con sensación de ardor, cara abochornada y dolor después de tomar alimento.

Flatulencia, eructos que tienen el sabor del alimento que se come. Dolor de estómago en los niños por el frío, si el dolor se agrava con la presión. Dolor de estómago por enfriamiento con deposiciones sueltas, causadas por absorción insuficiente de humedad, debida á un estado de relajación de las vellosidades intestinales. Pérdida del apetito, repugna la leche, después de comer se presentan náuseas y vómitos de alimentos; son muy agrias las substancias vomitadas; no se pueden tomar cosas ácidas, arenques, carne ó café y pastelillos. Algunas veces se declaran vómitos matinales antes de almorzar; cefalalgia, martilleo en la frente y los temporales de tal manera que la enferma teme un ataque de apoplejía. Menstruación copiosa cada semana, con adolorimiento en el abdomen y en el sacro. Sueño inquieto con desvaríos horrorosos. El sueño de la noche no produce descanso. No pueden tolerarse los vestidos apretados. Sed con deseo de agua fría. Deseo de algún estimulante como brandy, cerveza, etc. Eructos crasos.

KALI MUR.—Desarreglos gástricos ó biliosos, con

capa blanca, gris ó mapeada en la lengua. Dispepsia, dolor ó sensación de peso en el lado derecho bajo del hombro, especialmente si repugnan los alimentos grasosos ó repugnan á la vista. Flatulencia, con pereza del hígado y capa gris ó blanca de la lengua. Gastritis, si es causada por tomar bebidas demasiado calientes, se da luego este remedio. Segundo período de la gastritis. Indigestión con lengua blanca, siendo la causa el tomar alimentos su culentos ó grasosos. Sabor amargo. Sensación de náusea después de tomar grasas; vómito de un mucus opaco. Dolor de estómago acompañado de constipación.

KALI PHOS.—Sensación de hambre excesiva poco después de tomar alimento. En todo desorden nervioso con depresión ó debilidad; «sensación de desfallecimiento.» Flatulencia con angustia en el corazón ó simplemente sobre el lado izquierdo del estómago, dolor molesto en el mismo lado; debilidad del corazón. Gastritis crónica con condiciones asténicas. Indigestión con gran depresión nerviosa. Dolor de estómago por un susto ó emoción. Ulcera ó cáncer del estómago. Mucha sed; sensación de vacuidad mordicante en el estómago aliviada por comer. Eructos de gas que tienen un sabor amargo y agrio. Dolor constante en un lugar limitado del epigastrio.

KALI SULPH.—Catarro crónico del estómago, cuando hay en la lengua una capa amarilla. Indigestión con ese mismo aspecto característico de la lengua.

Dispepsia, CON SENSACIÓN DE PRESIÓN COMO DE UN PESO Y PLENITUD EN LA BOCA DEL ESTÓMAGO, CON CAPA AMARILLA SOBRE LA LENGUA. Sensación de languidez en la boca del estómago. Indigestión con dolor, acumulación de agua en la boca (después de *Natrum mur.* y de *Kali mur.*), dolor en el estómago justamente encima del ángulo de la cresta ilíaca en una línea hacia el ombligo, profundizando interiormente, cerca de la cadera derecha. Dolores cólicos en el estómago cuando *Magnesia phos.* no ha producido alivio.

MAGNESIA PHOS.—Dolores en la boca del estómago, pellizcos, retortijones, con eructos insuficientes de aire que no alivian, lengua limpia. Calambre en el estómago como si estuviese una venda atada fuertemente ó muy tirante alrededor del cuerpo. Flatulencia con dolor, no alivian los eructos. Indigestión con dolor espasmódico y de calambre, lengua limpia. Constricción dolorosa de los músculos de las paredes del estómago, juntamente con las aplicaciones calientes. Hipo convulsivo. Disposición marcada á las regurgitaciones inmediatamente después de comer. «En la gastralgía es de un efecto mágico, detiene con frecuencia un estado calambroide del estómago cuando han fallado todos los otros remedios. «Cólico de los caballos.» (Duffield). El paciente desea el azúcar.

NATRUM MUR.—Indigestión con dolor y acumulación de agua en la boca con vómitos de un líquido acuoso, espumoso y claro, ó de saliva viscosa. Do-

lor de estómago con mucha afluencia de saliva en la boca; pirosis; un líquido acuoso, no ácido, sube á la garganta, acompañándose frecuentemente este síntoma de constipación. Aliento desagradable, hambre voraz. Pierde el deseo de fumar, aversión para el pan. Sed violenta. Sabor agrio. Sensación de gran debilidad y hundimiento en la boca del estómago. Manchas rojas sobre la misma región del estómago.

NATRUM PHOS.—Acidez, regüeldos agrios, exceso de ácido láctico. Pérdida del apetito, perturbaciones ligeras de la indigestión. Al levantarse por la mañana presenta la lengua una capa húmeda, delgada, con un depósito cremoso en la parte posterior, como si se hubiese comido un pedazo de azúcar amarilla. Flatulencia con regüeldos agrios. DESARREGLOS GÁSTRICOS CON SÍNTOMAS DE ACIDEZ. Ulceración gástrica, dolor é indigestión, sabor agrio en la boca. Indigestión y dolor severo después de tomar alimento, ó como dos horas después, con acedías. Dolor de estómago cuando la presencia de las lombrices es acompañada de regüeldos ácidos. Ulceración del estómago, dolor en un lugar fijo después de comer y algunas veces regüeldos agrios, pérdida del apetito, cara roja y abotagada, pero sin que exista calentura. Cardialgía y acidez, vómito de líquido obscuro, semejante á los asientos del café. Pirosis. Trastornos gástricos después de comer alimentos grasos. *Natrum phos.* hace que la grasa llegue á emu cionarse.

NATRUM SULPH.—Temperamento bilioso, exceso

de bilis, sabor amargo de la boca, vómito de líquido amargo, lengua morena ó gris-verdosa, ó bien diarrea de un verde obscuro, evacuaciones biliosas, dolor de cabeza, vértigos y lasitud. Desarreglos gástricos con sabor amargo por la mañana. Eructaciones ácidas, cardialgía, abundante producción de gas y agravación por los alimentos farináceos. La flatulencia llega á encarcelarse en la S ilíaca y y en el colon ascendente, y produce un cólico violento que es aliviado por el massage y los borborigmos, dolores punzantes en el hígado. (Laird, *N. A. J. H.*, Feb., 1888.) No puede llevar las ropas apretadas alrededor de la cintura.

CALCAREA PHOS.—Este remedio en su esfera de acción, es útil como un intercurrente en la fiebre gástrica. Dolor después de tomar aun la más pequeña cantidad de alimento. Cardialgía, dolencia de estómago á la presión, DESEO VEHEMENTE POR COMER TOCINO, JAMÓN, CARNES SALADAS Y AHUMADAS. Dolor de cabeza con gusto amargo en la mañana. Dispepsia, con dolor en el estómago, aliviado temporalmente por tomar alimento y expulsar el aire. «Casi es un infalible remedio para la excesiva acumulación de gases en el estómago.» (Foster.)

Calc. phos. 1ª x, en agua, administrada media hora después de comer, es eficaz en la falta de asimilación del alimento. Dispepsia con mucha congoja, aliviada temporalmente por la comida.

CALCAREA FLUOR.—Vómito de alimento sin dige-

rir; hipo con expectoración de mucus, el que debilita y vuelve de nuevo durante el día.

CALCAREA SULPH.—Deseo por la fruta, el té, el clarete y los vegetales verdes y ácidos. Gran sed y apetito. Náusea con vértigo. Dolor en el paladar mientras se come, ardor en el estómago.

SILICEA.—Induración del píloro. Dispepsia crónica, con eructaciones ácidas, cardialgía y calosfrío. Disgusto por la carne y la comida caliente. Hambre excesiva. Intolerancia de los estimulantes alcohólicos.

CASOS CLÍNICOS.

La Sra. B., de 58 años, anémica y de temperamento nervioso, ha estado sufriendo por espacio de diez años de ataques severos de neuralgía del estómago que le duraban de cuatro á diez horas, y consistían en una serie de paroxismos, cada uno de los cuales persistía cinco ó diez minutos, con un correspondiente intervalo de quietud entre ellos. Su padecimiento era excesivo. Hasta el momento en que la ví no se la había administrado más que un tratamiento paliativo, principalmente las inyecciones hipodérmicas de morfina.

Cuando por primera vez la visité, hacía una hora que estaba padeciendo. Desde luego le administré cinco granos de *Magn. phos.* 3ª x en agua caliente, repitiendo la dosis cada quince minutos. Después de la tercera dosis disminuyó el dolor. Aquel ataque fué dominado. En seguida prescribí el mismo remedio en dosis de diez granos, al terminar cada comida, y después de tres ataques moderados no tuvo más molestia en lo de adelante por espacio de tres años seguidos. (Dr. B. A. Sonders, Winterset, O.)

Ataques repentinos de indisposición mortal en el estómago, no presentándose en una época precisa sino aun declarándose en el sueño y durando de media á una hora, apetito escaso. *Ferrum phos.* curó y el apetito llegó á ser devorador. (Raue, *Rec. Hom. Lit.*, 1875.)

KALI SULPH. EN EL CATARRO DEL ESTÓMAGO.—El Sr. M., de 38 años, había estado padeciendo del estómago por varios años. Tenía una capa amarilla sobre la lengua y mucha plenitud y presión en la boca del estómago. No podía recordar que hubiese dejado de tener más ó menos dolor en el estómago. Las bebidas calientes lo ponían peór y nunca tuvo sed. Su epidermis estaba seca generalmente, y con alguna frecuencia caliente y áspera, y el abdomen se sentía frío al tacto.

Si se resfriaba tenía dolores cólicos en el estómago, los que se extendían á los intestinos. De cuando en cuando había abombamiento del abdomen. Le fué dado *Kali sulph.* 3ª x, con algunas instrucciones relativas á su manera de vivir, y en unas cuantas semanas estuvo bien. No estando acostumbrado á esta forma de medicina se sorprendió mucho cuando se encontró aliviado. (Dr. O. A. Palmer.)

Un oficial sufría por largo tiempo dolores en el abdomen, juntamente con presión y plenitud en el estómago y constipación. La lengua estaba cubierta de una substancia amarillo-viscosa. Había sido tratado durante tres semanas por un alópata sin resultado alguno. Los intestinos estaban tan constipados, que solamente podía tener desahogo tomando un fuerte purgante. *Kali sulph.* 6ª x., tres papeles disueltos en agua, una dosis cada dos horas. El resultado fué sorprendente. La mañana siguiente tuvo el paciente una evacuación natural, y el malestar abdominal casi había desaparecido. En dos semanas estuvo enteramente curado, habiendo tomado solamente dos papeles de la medicina.—*Pap. Zeit.* Diciembre, 1885.

Un joven con dispepsia crónica.—Después de ensayar sin resultado varios remedios, descubrí, al examinarle la boca, una capa delgada, amarilla y cremosa sobre la parte blanda del paladar; esto me indujo á dar al enfermo *Natrum phos.*, que lo curó en un corto espacio de tiempo.

El siguiente caso es un resumen del que se encuentra en *A. H. Z.* 82, pág. 51: Hacía cinco años que una mujer sufría de dispepsia. Después de comer tenía náuseas y vómitos de alimento; el vómito era tan agrio que le producía dentera; no podía tolerar cosas ácidas. Los vómitos tenían lugar en la mañana y después de comer, acompañados de cefalalgia. Sensación de martilleo tan violenta en la frente y los

temporales que la enferma tenía miedo á un ataque de apoplejía. El flujo menstrual se presentaba abundante cada tres semanas. Sueño agitado, interrumpido por ensueños ansiosos. Siente cansancio en la mañana, y los vestidos tan apretados que necesita aflojárselos. *Ferrum phos.* 6ª, tres veces al día, una dosis antes de cada comida, curó el caso. Muchos síntomas indicaban el uso del *Natrum phos.*, pero á la totalidad de ellos convenía *Ferrum phos.*

Notas tomadas de cartas dirigidas á Schüssler por un doctor de Paderborn (*A. H. Z.* 1882, p. 102): He tenido recientemente un caso exactamente parecido al precedente, curado en diez días con *Ferrum phos.* 10ª después de haberlo tratado en vano cinco semanas con *Natrum phos.*

Un joven se quejaba de tener un apetito anormal. Comía casi cada hora, experimentando un deseo inmoderado de tomar alimento, y sin embargo de esto, se sentía débil y agotado. No tenía ningún otro síntoma: la lengua era limpia, no había aumento de la orina, evacuaciones normales. *Kali phos.* curó al paciente en el término de dos días. (De Schüssler.)

El arrendador B. me consultó acerca de una rara afección. Toda clase de alimento ácido le producía un ataque que principiaba con un fuerte calofrío, seguido por fiebre y sudores profusos y debilitantes. *Natrum mur.* 6ª Después de catorce días me dió noticia de que los ataques habían cesado enteramente, y que cuando tomaba alimentos ácidos no le causaban la más pequeña incomodidad. (Dr. Luesse.)

Un hacendado de 44 años me escribió hace unas cuantas semanas: "He tomado la medicina con mucha regularidad y por largo tiempo, observando estrictamente mi dieta. A pesar de esto, no estoy mejor de mi padecimiento, y casi puedo decir que he empeorado. Las condiciones en que me encuentro son éstas: 1. Siento casi constantemente un sabor como de bilis. 2. Mi lengua está cubierta con una capa amarga y espesa. 3. Durante el día, con especialidad después de tomar alimento, sufro eructaciones de gases, que tienen ó bien un gusto amargo ó son completamente insípidas. 4. El color de mi piel es más bien amarillo. 5. Muy poco apetito y nada de sed; mi bebida favorita, la cerveza, me es desagradable. 6. Soy propenso al calofrío y me siento con cierta languidez. 7. Mi cabeza no está sino débilmente afectada,

sin embargo siento una opresión constante sobre uno de los ojos. 8. Las evacuaciones son normales, pero escasas, á causa del régimen frugal que observo. El estado todo en que me hallo revela que tengo bilis en el estómago." He aquí la propia relación del paciente, á la que puedo agregar, que el enfermo en cuestión había ya tomado, conforme á mis prescripciones, *Nux. vom.* y *Pulsat.* Había usado las aguas de Marienbad el verano anterior, según la recomendación de otro médico. Le envié entonces *Natrum sulph.*, con el encargo expreso de tomar diariamente tres dosis de este polvo. El caballero citado vino seis ó siete días después á mi consultorio para darme las gracias por la preciosa medicina que le mandé. "El polvo," dijo, "ha obrado realmente maravillas. Todos mis padecimientos han desaparecido como por efecto mágico, y me siento, por fin, perfectamente bien. (De Schüssler).

El Dr. Mossa Bamberg, refiere: "Hacia el fin del año pasado recibí una carta con los siguientes detalles, y suplicándome enviase alguna medicina:

"Mi chico, niño de 7 años, sano y robusto hasta ahora, ha estado padeciendo de dolores en el estómago por algunas semanas. De poco tiempo acá vomita todo su alimento, algunas veces inmediatamente después de tomarlo, y otras no, sino hasta que llega la noche. El niño ha llegado á estar ahora muy extenuado. La última semana estuvo frecuentemente calenturiento. Este estado, sin embargo, no ha vuelto desde que toma la medicina que nuestro doctor de aquí le ha propinado. El niño se queja de mucho agotamiento." Formar un diagnóstico científico del caso en virtud de tales informes era evidentemente imposible; pero, como no tuve oportunidad de examinarlo personalmente, hice, lo mejor que pude, con los detalles proporcionados. La naturaleza de los dolores abdominales indicando el infarto, y el aumento de volumen de los órganos abdominales, hígado, bazo, etc., así como también los ataques de calentura, reprimidos probablemente por la quinina, y el vómito de los alimentos, todo estaba de acuerdo con mi suposición. Como estaba considerablemente indeciso para la elección de la medicina, decidí entonces darle doce papeles con *Ferrum phos.* para que tomase uno en la noche y otro por la mañana.

La noticia que se me dió algún tiempo después fué muy favorable. La fiebre no había vuelto; el vómito de alimento y los dolores en el

estómago habían cesado por completo poco después de tomar la medicina. El chicuelo estuvo tan vigoroso que asistió de nuevo á la escuela. (De Schüssler.)

W. Watson, de 40 años. Ulceración del estómago, vomitaba todo su alimento, y en un período más avanzado las materias expulsadas llegaron á tener el aspecto de asientos de café. Sufría de vómitos é indigestión con más ó menos intensidad desde hacía catorce años, lo habían visto muchos doctores, y había tomado también muchas medicinas sin provecho. Le aconsejé tomase *Ferrum phos.* 6ª y *Natrum phos.* 6ª, en cantidades acostumbradas, una cucharada cada dos horas alternativamente por espacio de quince días. A la segunda visita estaba libre de los vómitos, tenía poco dolor y se sentía muy mejorado. Continuó otros diez días con los mismos remedios, y volvió completamente bien. Haciéndole un interrogatorio especial para saber si nada le molestaba, dijo: "No; la única cosa que algunas veces me inquieta acerca de mi enfermedad, es el pensar si sentiré la misma molestia que antes después de tomar cualquiera especie de alimento, pero esto no sucede." Su curación ha sido permanente: de esto hace ahora cerca de dos años, y se conserva bien. (M. D. W. De Schüssler.)

Un paciente con ardor desagradable y molesto en el estómago después de comer y que continuaba hasta la hora de la próxima comida; el dolor se desarrollaba una ó dos horas después de tomar los alimentos; la lengua ligeramente gris, no tenía sabor ni sensibilidad, la evacuación de los intestinos era regular, falta de sed, el ardor era tan molesto que lo mantenía despierto por la noche. *Natrum phos.* curó. (Med. Era.)

Un niño con indigestión después de la fiebre tifoidea. Todo se le agriaba en el estómago, el aliento era también agrio, vómitos de leche coagulada y de líquidos con olor agrio, deposiciones verdes alternando con constipación, era molestado con cólicos, capa blanca sobre la lengua y alrededor de la boca, colérico, malhumorado é inquieto. *Natrum phos.* curó. (Med. Era.)

Un anciano, representando como 60 años, vino á verme; los doctores le habían dicho que tenía "dispepsia." Extenuado, pálido, de color negruzco, sin apetito, desasosegado, con inercia intestinal, evacuaciones á veces de color claro, y de cuando en cuando estreñido, lengua

con una capa espesa de un tinte amarillo-moreno, sabor amargo, conjuntiva azulada, piel arrugada, y el vientre retraído y encogido, como doblado, y padeciendo un dolor, en el estómago, de carácter quemante después de comer; en vista del estado general del caso, se comprendía que la asimilación era muy defectuosa. El individuo había estado, y estaba tomando en aquel momento *Argentum* en forma de píldoras, según prescripción de un médico titulado, tres dosis al día, y ya llevaba más de un año de seguir ese mismo tratamiento que para todo había sido inútil, menos para apresurar la extenuación. Después de observar la situación y tomando en cuenta todas las circunstancias, lo puse desde luego bajo la acción de *Natrum sulph.* 6ª x, tres dosis al día antes de las comidas, y *Kali phos.* 6ª x, como un remedio para los nervios. Estos dos remedios curaron perfectamente la "dispepsia" y todos los otros trastornos, de manera que en cerca de tres semanas fué un hombre sano; el *Natrum sulph.* corrigió toda molestia hel hígado y estómago y el *Kali phos.* levantó el estado de abatimiento de las fuerzas nerviosas. (Dr. A. P. Davis.)

GLÁNDULAS, AFECCIONES DE LAS.

KALI MUR.—Este es el principal remedio en los infartos glandulares, en la infiltración de las glándulas foliculares de la garganta. Las glándulas del cuello están infartadas (se aplica también exteriormente). Infarto escrofuloso de las glándulas, aumento de volumen de las abdominales, algunas veces con diarrea.

NATRUM MUR.—Inflamación crónica de las glándulas salivales, con los síntomas correspondientes, exceso de saliva, etc. Tumefacción crónica de las glándulas linfáticas. Infarto de las glándulas sebáceas.

NATRUM SULPH.—Infartos sicósicos glandulares.

SILICEA.—En la supuración de las glándulas, para abreviar el proceso morboso, también para la induración de origen escrofuloso y el infarto de las glándulas, con ó sin inflamación.

CALCAREA PHOS.—En el infarto crónico de las glándulas, como un remedio intercurrente. Infarto escrofuloso de las glándulas cervicales. Broncocele, bocio. Tabes mesentérica incipiente con diarrea fétida.

CALCAREA SULPH.—Las glándulas linfáticas secretan pus (compárese abscesos). Ulceración de las glándulas.

CALCAREA FLUOR.—Si es muy dura la hinchazón glandular. Dureza pétrea de las glándulas. Adenitis crónica. Induraciones en los ligamentos capsulares de las articulaciones. Nudosidades y concreciones en los senos de las mujeres. Ganglium tendinosum.

FERRUM PHOS.—Período agudo de la adenitis.

NATRUM PHOS.—Bocio. Es un remedio importante en todas las hinchazones glandulares.

CASOS CLÍNICOS.

Natrum phos. 3ª x alivió la opresión en trece casos de bocio, tomando una dosis tres veces al día; la opresión fué aliviada en un espacio de tres á cinco días. En algunas ocasiones se efectuó una curación. Es bueno continuar la medicina de cuatro á seis semanas. (Dr. J. S. Skeels, *Hahnemannian Monthly*, 1880.)

Una hinchazón del tamaño de un huevo de paloma que existía debajo de la barba, fué reducido considerablemente por *Kali mur.*, pero

sin embargo había induración (dureza) con una superficie desigual. *Calcarea fluor* tomada por unos cinco días, produjo enteramente su desaparición. Bien pronto después de ésta el paciente tuvo conjuntivitis ligera con hinchazón, la cual pronto curó *Kali mur.* (Dr. K. de Schüssler.)

Granvogl, en su *Manual*, pág. 360, llama la atención acerca del notable resultado obtenido en seis semanas con el uso de *Natrum sulph.* en un caso de hinchazón crónica de los ganglios cervicales, tan extensa que completamente hacía desaparecer el cuello. Todos los tratamientos conocidos en las universidades habían fallado; pero *Natrum sulph.* 3ª x cada dos horas, produjo una rápida mejoría en la hinchazón y en la salud general del paciente.

Calcarea Phosphorica en el crecimiento adenoide.—El Dr. G. H. Martin refirió en la sesión de la Sociedad Médica de California State Hom., un caso de un muchacho, de 12 años de edad, quien tenía una vegetación adenoide que le producía catarro nasal y sordera de un oído á un grado tal que no podía oír el reloj cuando se le colocaba junto á la oreja.

"Por la administración de *Calcarea phosphorica*," dijo, "durante cuatro meses, el paciente puede ahora percibir el sonido del reloj á una distancia de seis pies, y el catarro ha desaparecido casi enteramente."—*Pacific Coast Journ of Hom.*

Calcarea Fluorata para el Infarto Indolente y de larga duración de los ganglios Linfáticos Cervicales.—El Dr. Sybel habla muy lisonjeramente del fluoruro de calcio en el tratamiento del infarto indolente y de larga duración de los ganglios linfáticos cervicales, y especialmente cuando es pronunciada la dureza de los ganglios. Cree que pueden obtenerse idénticos resultados en el aumento de volumen de los ganglios brónquicos y mesentéricos.

Exitos satisfactorios se obtuvieron en una multitud de casos; los tres siguientes son presentados como ejemplos típicos de su acción:

1. Una soltera, de veinticinco años, había tenido por muchos años un grupo de ganglios infartados, los que, situadas bajo el lado derecho de la mandíbula inferior, desfiguraban notablemente su fisonomía. Fuera de un pequeño ganglio de los que formaban la margen del grupo, que mostraba una tendencia á supurar, el conjunto de la masa era

duro, no manifestando inclinación á la inflamación, y no era sensible tampoco á la presión. El ganglio pequeño y supurado curaba, después de secretar una masa caseosa, bajo la acción de Hepar sulph. y Silicea; sin embargo, el infarto ganglionar permanecía sin alteración. *Calcarea fluorica* 5ª x se le dió entonces una vez al día. En tres semanas la paciente experimentó una ligera diminución, que gradualmente fué siendo más pronunciada, hasta que al cabo de seis ú ocho semanas la masa conglomerada se transformó en ganglios aislados, del tamaño de avellanas. La paciente juzgó inútil todo tratamiento ulterior, y tomó estado inmediatamente. El tiempo del tratamiento duró desde el 25 de Abril hasta fines de Noviembre—tiempo relativamente corto si se toma en cuenta lo inveterado de la afección.

2. Un joven robusto, de veinte años, presentaba en la región submaxilar derecha, inmediatamente por debajo de la quijada, una conglomeración de varios ganglios linfáticos indurados, que, por su tamaño, producían un efecto muy desagradable sobre el conjunto de su fisonomía; uno en los bordes, del tamaño de una avellana, estaba aparentemente muy próximo á supurar. Los demás estaban duros é indolentes; se le habían observado desde la infancia, aun cuando hacía solamente cuatro ó cinco años que habían alcanzado su tamaño actual. *Silicea* y *Kali chloratum* reprimieron la supuración, y *Calcarea fluorata* en alternación con el *Chlorato de potasa*, fueron continuados cada uno diariamente. La diminución en el tamaño de los ganglios fué notable en seguida, y al cabo de diez y seis meses habían desaparecido enteramente.

3. Una mujer soltera, de cincuenta años, había soportado por mucho tiempo un ganglio indurado en la región submaxilar derecha del tamaño de un pequeño huevo de gallina, pero que no estaba ni rojo ni doloroso. Había ensayado toda clase de remedios externos sin resultado. *Calcarea fluorata* 5ª x, un papel por la mañana y otro por la noche, y más tarde, solamente uno al día, produjo la desaparición del infarto en seis semanas, tiempo relativamente corto si se tiene en consideración el aumento del volumen ganglionar que había persistido por ocho años.

En un niño de cinco años, quien hacía dos que venía padeciendo de numerosos infartos ganglionares é indurados en la región submaxilar,

la misma droga, á la quinta trituración decimal, los disipó en unas cuantas semanas.—Berliner Zeitschrift.

GONORREA.

NATRUM PHOS.—Este, según la última (25ª) edición de Schüssler, es el remedio principal para la gonorrea.

FERRUM PHOS.—Período inflamatorio de la gonorrea. (N. B.—Evitar la presión á lo largo de la uretra para dar salida al pus, como muy perjudicial, y que retarda la curación.) Igualmente el andar, subir escaleras, etc., es un gran obstáculo para la curación.

KALI MUR.—Este es el principal remedio en la gonorrea. Es, en efecto, un específico para los casos en que existe hinchazón, ya sea debida á exudación subcutánea ó intersticial. Gonorrea crónica combinada con eczema, latente ó visible, ó bien una disposición para las hinchazones glandulares. Vegetaciones.

KALI PHOS.—Gonorrea con secreción de sangre. Balanitis y balano-postitis.

SILICEA.—Casos de larga duración en la gonorrea, con pus fétido y espeso. Sensación constante de calofrío, aun durante el ejercicio. Balanitis.

Lo siguiente debido á la pluma del finado Dr. T. S. Hoyne, tiene una relación directa sobre lo expuesto y en consecuencia lo publicamos íntegro:

SILICEA.—Este remedio es frecuentamente reprobado por los médicos homeópatas, ó al menos se le

estima como de poco valor en el tratamiento de las afecciones crónicas. He consignado abajo unos cuantos casos que pueden ser considerados de utilidad.

El. Sr. A., conductor de carros, de cerca de 48 años de edad, con el cabello y la barba rojos, y más bien de constitución débil, vino á verme afectado de blenorragia, la que había sido constante en él por un período de más de diez años; hubo ensayado durante este tiempo toda clase de remedios con utilidad solamente temporal. Las inyecciones de varias composiciones la habían reprimido por un corto período, pero la secreción reaparecía invariablemente después de la interrupción de la inyección ó aun durante su continuación. La dilatación de la uretra solamente le proporcionaba alivio por unos cuantos días.

La rutina ordinaria de remedios, con ligera mejoría ó agravación, según era el caso, fué continuada con constancia hasta que el paciente llegó á desanimarse y suspendió toda clase de medicación por dos ó tres años.

Obtuve los siguientes síntomas en mi primera y única entrevista con él: Había cada mañana una ligera secreción de la uretra, de carácter acuoso y delgado, también expelía una corta cantidad de líquido prostático mientras hacía esfuerzos al defecar; había escozor y unos cuantos lugares húmedos alrededor del escroto; los intestinos casi constipados todo el tiempo de la enfermedad, consistiendo las evacuaciones en masas duras expulsadas sólo con

gran esfuerzo; únicamente con raros intervalos tenía una defecación suelta. Siendo así que el paciente había sido antiguamente de buen humor, ahora por la causa más ligera se ponía muy irritable, y frecuentemente estaba desesperado. El deseo sexual era muy débil, y después del coito se sentía como si estuviese magullado. Dijo que se resfriaba fácilmente, y entonces estaba expuesto á una tos nocturna.

En consideración á la fuerza de esos síntomas recibió *Sil.* 200ª, y no volví á ver al enfermo. Despues de haber transcurrido algunos meses, otro carretero de la misma línea de carros vino á verme para que le diese algo de la medicina que curó al Sr. A.

El Sr. B., un joven literato distinguido, como de 30 años de edad, vino á consultarme acerca de una blenorragia crónica que era el resultado de una gonorreica mal atendida. Habías eguido por un tiempo regular el tratamiento impuesto por los alópatas y algunos homeópatas. Me dijo que la secreción gonorreica había sido suprimida varias veces por medio de inyecciones, la última vez fueron seguidas de un ataque muy agudo de orquitis, la que lo había postrado en cama por un regular número de días. Entonces ensayó el tratamiento de un médico homeópata, quien le dió una cantidad de remedios sin resultado satisfactorio, y recurrió luego á las inyecciones moderadas, que eran peor que inútiles por convertir los últimos desechos de la gonorrea en una gota militar, la que permanecía refractaria á toda clase de tratamiento.

Encontré que la secreción era delgada y de mal olor, en cantidad muy ligera. Tenía, al contrario, frecuentes emisiones, siendo algunas veces las secreciones teñidas de sangre. La orina era turbia, depositando á la vez una arena amarillenta. No podía contener su orina tan largo espacio de tiempo como anteriormente y tenía necesidad de levantarse una ó dos veces por la noche para evacuarla. Tenía una perspiración fría y desagradable de los pies y la que ordinariamente se hacía general á todo el cuerpo cada mañana. Dijo que se sentía cansado siempre y con repugnancia para hacer cualquier trabajo aunque lo pudiera desempeñar fácilmente. Era, como el paciente del caso anterior, muy sensible al aire frío y se resfriaba fácilmente; su sueño era inquieto y lleno de ensueños espantosos. En la mañana, al levantarse, experimentaba un ligero desvanecimiento.

Diciembre 10, se le prescribió *Sil.* á la 200ª. El día 17 me participaba que la medicina lo había puesto peor al principio, aumentando la secreción y haciéndole orinar con más frecuencia que antes. *Sac. lac.* le fué administrado por dos semanas, pero los síntomas permanecían lo mismo.

Diciembre 31, *Sil.* c. m. se le administró, la que también fué seguida por una agravación marcada de todos los síntomos. Entonces se le prescribió *Sac. lac.* por tres semanas, pero no hubo modificación aparente en sus síntomas hacia la mejoría.

Enero 25, le dí *Sil.* 12ª, la que agravó los sínto-

mas por unos cuantos días, y en seguida desaparecieron gradualmente. El paciente no ha vuelto á sentir más molestia.

KALI SULPH.—Gonorrea con una secreción viscosa amarilla ó verdosa. Gota militar. Gonorreas antiguas.

NATRUM. MUR.—Gonorrea crónica. Secreción acuosa, transparente y viscosa. Este remedio y *Calcarea phos.* se administrarán en alternación para la blenorrea. GONORREA, CON SENSACIÓN DE ESCALDADURA, es un síntoma característico de este remedio; en la gonorrea antigua, en la que queda al último una gota persistente. Uretra dolorosamente sensible á la presión. Después de las inyecciones de nitrato de plata.

CALCAREA PHOS.—Gonorrea crónica con anemia. Hidrocele.

CALCAREA SULPH.—Gonorrea con secreción saniosa, purulenta.

NATRUM SULPH.—Gonorrea crónica con secreción amarillenta, verdosa, con una consistencia espesa. Muy poco dolor. En la gonorrea úsese la tercera decimal cada una ó dos horas, cuatro gotas en una poca de agua. (Grauvogl.) Infarto de la glándula prostática. Vegetaciones.

CASOS CLÍNICOS.

En el Pop. Zeit., Berlin. Verein Hom. Aerzte, Abril, 1886, está recomendado *Ferrum phos.* en los casos recientes de gonorrea seguido por *Kali mur.* y *Kali sulph.*

Un hombre de 70 años, venía padeciendo desde hacía tres años de un flujo de la uretra; la secreción era en pequeña cantidad; el mucus claro; violentos dolores de carácter punzantes y ardorosos al orinar. *Kali sulph.*, *Kali mur.* y *Natrum mur.* no dieron resultado. *Magnesia phos.* 6ª curó el caso en cuatro semanas. El carácter de los dolores fué la indicación propiamente. (Schüssler, Allg. Hom. Zeit., 1875.)

El Sr. K., de 32 años, había tenido blenorrea por cinco años; la secreción era de una consistencia espesa, amarilla, con poco ó ningún dolor. Curó con dos prescripciones de *Natrum sulph.* (Dr. J. A. Harrison.)

HEMORRAGIA.

FERRUM PHOS.—Hemorragia á consecuencia de heridas, administrado al interior y en aplicaciones externas, haciendo uso al mismo tiempo de los medios quirúrgicos. Epistaxis de sangre roja y brillante, sea por traumatismo ó por otros motivos; este remedio es generalmente suficiente, con especialidad en los niños. Hemorragia de sangre roja y brillante, que se coagula rápidamente. Vómito de sangre rojo vivo. Tendencia á la hemorragia nasal entre los niños que se desarrollan con mucha rapidez.

KALI MUR.—Cuando la sangre es obscura, negra, grumosa ó viscosa. Vómito de sangre obscura, coagulada y viscosa. Hemorragia por la nariz, en la tarde.

CALCAREA SULPH.—Epistaxis. Secreción nasal teñida con sangre.

KALI PHOS.—Epistaxis en las personas débiles, de constitución delicada por debilidad, falta de vigor ó vejez, predisposición para la hemorragia de las

encías, nariz, etc. Si la sangre que se pierde es obscura, negruzca, delgada y como asientos de café, no coagulable. Sangre pútrida, causando síntomas de descomposición. Hemorragia séptica.

NATRUM MUR.—Hemorragia, sangre pálida, delgada, roja, acuosa, no coagulada. Epistaxis al inclinarse, cuando se tose, con dolencia en los miembros.

CALCAREA FLUOR.—Hemoptisis; sangre roja brillante; tos con intervalos cortos debida á un esfuerzo excesivo.

NATRUM SULPH.—«He sabido que este remedio produce en varios casos violenta epistaxis cuando es administrado inoportunamente. En un caso reciente la 200ª potencia produjo hemorragia nasal, vómitos y diarrea después de cada una de las dosis tomadas.» (E. H. H.)

CASOS CLÍNICOS.

Hace cerca de doce años comencé á tratar á una muchacha de cuatro años de edad, de frecuentes epistaxis, posteriormente de hemorragia de la lengua y encías, y en la que solamente podía reprimirse la alarmante salida de sangre por la nariz empleando el taponamiento de las fosas nasales posteriores. Durante el año hice esa operación varias veces, aplicando estípticos á la boca y la lengua, dí como mejor pude los remedios indicados: *Ham.*, *Bell.*, *Nit. acid*, *Ipecac.*, *China*, etc. La clasifiqué como una diátesis hemorrágica, y tuve la más grave aprensión por ella cuando llegase á la pubertud y se estableciese la menstruación. Después de tratarla cerca de un año de las hemorragias frecuentes y alarmantes, la dí *Ferr. phos.* 3ª trit. x, tres granos por tres veces al día, y continuó su uso con perfecta regularidad por seis meses. No ocurrieron otros ataques mientras tomaba el remedio. Per-

maneció sana y robusta, la pubertad llegó á los 14 años de edad con el flujo normal. Había sufrido extracción de dientes sin hemorragia, y cuando abandonó la ciudad, hace un año, estaba en buena salud y menstruando normalmente.

En Diciembre del 95, la Sra. B...., de 65 años, recurrió al tratamiento; presentaba manchas equimóticas sobre las piernas y muslos, estado varicoso de las venas y edema de los pies y de las piernas. Recibió *Ferr. phos.* 3ª x, cada tres horas, la mejoría fué pronta, y al cabo de dos semanas se restableció por completo. Hasta ahora no ha vuelto la molestia.

El niño B...., de dos años de edad, volvió, después de una residencia de cinco semanas en la costa, á donde fué llevado, en un estado de marasmo aparentamente desesperado, y presentaba los síntomas siguientes: Excesivo enflaquecimiento y postración, anemia, transpiración de la cabeza, piernas y pies hinchados, manchas equimóticas sobre las piernas, efusión de sangre alrededor de las encías, y á veces diarrea sanguinolenta desagradable, y extremidades frías. La hinchazón de las piernas tenía la apariencia de edema; sin embargo, no dejaba huella á la presión, y el movimiento más ligero le arrancaba gritos de dolor. Las epífisis no estaban aumentadas de volumen, y por consiguiente consideré que la hinchazón y el dolor eran causados por la efusión de sangre en los tejidos más profundos, constituyendo, según mi opinión, un caso de escorbuto. Este niño comenzó á mejorar inmediatamente después de tomar *Ferr., phos.* 3ª x y *Sil.* Accidentalmente se añadían á su comida los zumos de naranja y uva, y esto le produjo un restablecimiento constante y no interrumpido.

La Srita. B...., profesora de una escuela pública, me llamó precipitadamente un día del pasado Agosto. La encontré sufriendo de hemorragia de la nariz y del útero con manchas de púrpura sobre los muslos y piernas. La hemorragia cesó después de la tercera dosis de *Ferr. phos.* 3ª x. Tuve noticia que por algunos años venía padeciendo anualmente un ataque semejante, y conseguí que me prometiera tomar una dosis diaria del remedio, lo que ha hecho hasta el presente. La púrpura desapareció en cosa de diez días y no ha vuelto; me dice que su salud en lo general es mejor que la que ha tenido por muchos años. Espero con ansiedad ver si la púrpura se presenta el año

próximo. Ningún cambio fué hecho en su régimen alimenticio. (Dr. C. E. Gorham Albany.)

Una hemoptisis que había persistido á despecho de los remedios fué detenida por *Calc. fluor.* (M. J. Bleim.)

El Dr. E. B. Rankin, en el *Southern Journal of Homœopathy*, refiere un caso de hemorragia de los intestinos, de sangre negra, obscura, viscosa y profusa, curada por *Kali mur.* 6ª x.

Una señora de 72 años, gruesa y corpulenta, de cabello y ojos obscuros, expuesta á ataques de congestión cerebral apoplectiforme, fué hallada en estado apopletico, con las extremidades frías, sudor pegajoso sobre la frente y la cara; cabeza caliente y aspecto amoratado; pérdida del conocimiento; respiración estertorosa, *Ferrum phos.* 6ª, una cucharadita cada media hora; la inteligencia volvió á las dos horas. Estuvo en pie al día siguiente. El mismo remedio ha sido usado en los ataques subsiguientes con resultados idénticos. La enferma asegura que nunca le habían podido proporcionar un alivo tan rápido y eficaz como cuando yo la asistí. (Dr. F. A. Rockwith, *American Journal Homœopathic Materia Medica*, 1875.)

Dwigth H., de edad de 12 años, ha estado expuesto á la hemorragia nasal hace unos cuantos años. Durante este tiempo se ha puesto muy anémico. Ha tomado diferentes remedios del médico de la familia sin lograr impedir la molesta afección de un modo permanente. Fuí llamado para verle después de un ataque muy intenso, y lo encontré muy postrado y pálido por la pérdida de sangre. Le dí de una vez *China off.* 1ª x en agua, por unas cuantas horas, hasta que pude enviarle algunos papeles de *Ferrum phos.* 6ª, los que tomó en solución por algunas semanas, unas cuantas dosis cada día, con el resultado de contener permanentemente la hemorragia. (C. T. M.)

HEMORROIDES.

NOTA.—En el tratamiento de las hemorroides, se debe fijar la atención en los desórdenes funcionales del hígado, de los órganos digestivos, etc., que por regla general se encuentran presentes y en íntima

conexión con las primeras; de otro modo no puede asegurarse una curación radical de la enfermedad.

FERRUM PHOS.—Almorranas inflamadas, almorranas con flujo de sangre, la que es de un color rojo brillante, fluída, pero con una tendencia á formar una masa blanda, espesa, antes de la induración.

KALI MUR.—En las almorranas sangrantes cuando la sangre es obscura y espesa; fibrinosa, grumosa.

KALI PHOS.—Hemorroides, dolorosas, ulceradas y con picazón.

CALCAREA FLUOR.—Almorranas internas ó ciegas, con dolor frecuente en la espalda, generalmente abajo del sacro. Obsérvese la apariencia de la lengua, etc., la que indicará el remedio que deba alternarse. Almorranas con presión de sangre á la cabeza. Almorranas ciegas internas con constipación, estado de estreñimiento de los intestinos. En las almorranas sangrantes, alternado con los remedios que están indicados por el color de la sangre, etc. Tumores, fibras elásticas relajadas. Hemorroides con hemorragia, la sangre de un color rojo brillante se sigue á una tos corta intermitente ó como fingida por esfuerzo excesivo.

KALI SULPH.—Las almorranas internas y externas pueden necesitar la administración de este remedio en alteración con *Calcarea fluor.*, el principal de todos, cuando la lengua tiene una capa amarilla, viscosa, ó se presentan las secreciones del tipo característico.

CALCAREA PHOS.—Hemorroides crónicas en los pacientes debilitados ó anémicos. Intercurrentemente con *Calcarea fluor.*

MAGNESIA PHOS.—Dolores incisivos, lancinantes, muy agudos, frecuentemente tan rápidos y penetrantes como un relámpago. En las almorranas externas se emplea también en lociones tibias.

NATRUM MUR.—Con escozor, latidos y prolapso del recto, ardor en el ano, herpes alrededor del esfínter, evacuaciones duras, dificultosas y desmenuzadas; punzadas dolorosas en el recto y en la uretra después de la micción.

SILICEA.—Hemorroides intensamente dolorosas, salientes, llegando á estrangularse y á supurar. Mucha picazón y dolor que va del recto á los testículos. Fístula en el ano (Calcarea phos.)

CASO CLÍNICO.

Un joven de 28 años había estado atormentado de hemorroides por algunos años. Las almorranas eran sangrantes, acompañadas de constipación crónica. Mucho esfuerzo al defecar, gran aflujo de sangre á la cabeza y bocanadas de calor, lengua mapeada ó cubierta de una capa blanco-pardusca. *Calc. fluor* 3ª x y *Kali mur.* 6ª x curaron completamente.

HIDROCÉFALO.

Véase también meningitis.

CALCAREA PHOS.—Este es el primer remedio en que se debe pensar para esta enfermedad. Las fontanelas, especialmente la posterior, están abiertas

completamente. Hidrocéfalo crónico; cabeza muy grande. Los huesos del cráneo delgados y friables. Prorrumpe en gritos y se oprime la cabeza con las manos. Cabeza vacilante. Los globos oculares están más prominentes de lo natural. Frialdad de las orejas y de la nariz.

HIDROCELE.

CALCAREA FLUOR.—Hidropesía é induración de los testículos y del escroto.

CALCAREA PHOS.—Como intercurrente en el hidrocele.

SILICEA.—En las formas recientes y crónicas del padecimiento.

CASOS CLÍNICOS.

Silicea 600ª curó dos casos de hidrocele, uno del lado izquierdo en una criaturita de cuatro días, el otro del lado derecho en un niño de cuatro años. (Dr. Guerusey.)

Un hombre padecía de una erupción herpética, para la que tomó *Silicea* con el fin de curarse, y como al mismo tiempo tuviese un sarco-hidrocele de grandes dimensiones, que había soportado por varios años, vió reducirse esta última afección á un tamaño mínimo.—*American Journal Homœopathic Materia Medica*, vol. II, pág. 205.

HIDRÓPICAS, AFECCIONES.

KALI MUR.—Hidropesía ocasionada por afecciones del corazón, hígado ó riñones, cuando se presentan los síntomas característicos de este remedio. Hidropesía por obstrucción del conducto biliar y aumen-

to de volumen del hígado. Hay generalmente una capa blanca sobre la lengua. Hidropesía por debilidad del corazón (en alternación con *Kali phos.)* Hidroposía con palpitación. Hidropesía en la que es blanquizco el líquido extraído, ó se deposita en la orina un mucus blanco. Capa blanca persistente sobre la lengua. Hidrocele.

NATRUM SULPH.—La hidropesía simple invade los tejidos aereolares del cuerpo. Edema prepucial ó escrotal. Edema de las partes internas como también de las externas.

NATRUM MUR.—Hidropesía é hinchazones hidrópicas de cualquiera de los tejidos aereolares subcutáneos del cuerpo. Anasarca. Edema prepucial ó escrotal.

FERRUM PHOS.—Hidropesía por pérdida de sangre ó agotamiento del sistema, alternado con *Calcarea phos.*

CALCAREA PHOS.—Hidropesía por defecto de asimilación. Anemia ó pérdida de sangre ó de los fluídos vitales. Hidropesía de la rodilla.

CALCAREA FLUOR.—Hidropesía causada por enfermedad del corazón, dilatación de cualquiera de las cavidades. Hidrocele de larga duración.

KALI SULPH.—Hidropesía post-escarlatinosa.

CASOS CLÍNICOS.

Hidropesía escarlatinosa en un niño de 4 años; *Digital.*, *Apis*, *Arsen.* y *Apoc.* fallaron. La cantidad de orina evacuada en las veinticuatro horas era muy escasa, y durante las últimas cuarenta y ocho

horas se presentó la supresión de la misma orina. El anasarca estaba muy desarrollado en este enfermo, al que le era imposible estar acostado. *Natrum mur.* 6ª cada dos horas. En veinticuatro horas el niño evacuó dos cuartos de orina y se siguió un rápido restablecimiento. (D. W. M. Pratt.)

El Dr. Goullon Jn., quien usó *Kali mur.* con mucho éxito en una intumescencia de los pies y de las extremidades inferiores, añade las siguientes indicaciones particulares para su uso: El remedio en cuestión aparece indicado en la intumescencia crónica persistente de los pies y miembros inferiores; cuando dicha intumescencia es blanda al principio, en seguida llega á hacerse dura al tacto, sin dolor ó enrojecimientos. Es, sin embargo, acompañada de comezón; y en un período dado puede tener un aspecto blanco como la nieve y brillante. Por último, la hinchazón llega á hacerse menos perceptible en la mañana que en la tarde, pero puede adquirir tales dimensiones que sea causa de gran tensión, con una sensación como si quisiere reventar.

Una muchachita de 9 años, que se había restablecido con facilidad de la difteria y la escarlatina, fué admitida en una sala de convalecencia. De repente comenzó á hincharse sin causa aparente. La cara se puso edematosa, lo mismo que los pies; éstos últimos por encima de los maleolos. La orina disminuyó, no conteniendo albúmina. No había dolor á la presión sobre los riñones. El pulso un poco febril, pero el apetito, el sueño y las evacuaciones se conservaban en estado normal. La dí tres medicinas diferentes—entre éstas, *Acónito*—sin resultado. La hidropesía (anasarca y ascitis) aumentaba rápidamente; la orina era escasa, emitida sólo irregularmente en muy pequeñas cantidades, siendo ligeramente turbia y conteniendo mucha albúmina. No podía asegurarse si en la orina existían deshechos epiteliales. Los riñones ya no estaban ahora sensibles á la presión. En ocasiones se presentaba delirio. *Natrum mur.* sólo curó este caso en cerca de quince días. (Dr. Cohn. de Schüssler.)

HÍGADO, AFECCIONES DEL.

Véanse también desarreglos gástricos.

FERRUM PHOS.—Período inflamatorio de la hepatitis.

KALI MUR.—Ictericia, si la enfermedad ha sido causada por un enfriamiento del que resulta un catarro del duodeno; capa blanca en la lengua, evacuaciones descoloridas, acción perezosa del hígado, dolor algunas veces en el lado derecho, color ligeramente amarillo de las evacuaciones, característico de la falta de la bilis, capa saburral blanca ó pardusca de la lengua y constipación.

KALI PHOS.—Si hay depresión del sistema nervioso.

NATRUM PHOS.—En las más bajas potencias para la ESCLEROSIS del hígado y para la forma hepática de la diabetes, ESPECIALMENTE CUANDO HAY UNA PROPENSIÓN Á PADECER MUCHOS ANTRAX.

NATRUM SULPH.—Hígado irritable, ataques biliosos, si hay demasiada bilis después del estudio excesivo ó del trabajo mental (también está indicado *Kali phos.)* Sabor amargo. Vómitos de substancias amargas ó de bilis. Ictericia ocasionada por vejaciones, con evacuaciones verdes, biliosas, ó capa moreno-verdosa de la lengua, ó piel cetrina; escleróticas amarillas. Congestión del hígado, con malestar y dolores punzantes y agudos. Es el principal remedio.

NATRUM MUR.—Ictericia con somnolencia y cuando se presentan algunos de los síntomas peculiares á este grupo de padecimientos. Dolor en la región del hígado.

CALCAREA SULPH.—Dolor en la región del hígado, en el lado derecho de la pelvis, seguido de debilidad, náusea y dolor en el estómago.

KALI SULPH.—Ictericia por catarro gástrico. Diarrea.

SILICEA.—Abscesos del hígado. Dolor pulsátil y ulcerativo en la región hepática.

CASO CLÍNICO.

El verano pasado volvió mi segunda hija de una visita que hizo á New Jersey, con una inmensa verruga en la mano. A los pocos días cayó enferma con fiebre, la que consideré ser de una naturaleza biliosa; la dí *Natrum sulph* Llegó á estar completamente ictérica y aumentaba la agravación mientras tomaba este remedio. Entonces lo substituí por *Kali mur.* y comenzó á mejorarse inmediatamente, estando bien á los pocos días. Después de que hubo tomado unas cuantas dosis de *Kali mur.* la ictericia comenzó á disminuir y la verruga desapareció. (E. H. H.)

HIPO.

MAGNESIA PHOS.—De naturaleza idiopática ó de origen reflejo después de fallar la morfina y otros remedios. Hipo muy obstinado, siendo la causa de una molestia de larga duración.

NATRUM MUR.—Hipo después del abuso y á consecuencia de la quinina.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. Burnett, en su obra sobre *Natrum mur.*, refiere un caso de hipo de diez años de duración, que tenía efecto por el abuso de la qui-

nina y renovado después de cada dosis, curado de un modo permanente con *Natrum mur.*

Un caso tenaz de hipo (de fiebre tifoidea), casi continuo y tan violento en su carácter que el enfermo lo estaba padeciendo desde hacía tres días. Se habían dado varios remedios sin efecto alguno; se prescribió *Magnesia phos.* El resultado fué notable; en una hora se modificó el sufrimiento, y al día siguiente estaba muy mejorado el paciente, y el hipo cedió rápidamente al uso continuado del remedio. (Dr. John Fearn, *California Med. Journal*, Agosto, 1887)

HISTERIA.

KALI PHOS.—Histeria en las mujeres, ataques nerviosos por emociones súbitas é intensas, ó por una pasión reprimida en las personas sumamente nerviosas y excitables; también cuando hay una sensación como de una bola que sube á la garganta. Accesos histéricos de gritos y de risa. Bostezos histéricos. Espasmos histéricos, con pérdida del conocimiento y delirio de musitación.

NATRUM MUR.—Menstruos dilatados ó disminuidos. Sonambulismo. Gran melancolía, temor, mucho mucus en la orina. Todos los síntomas son aliviados tan pronto como la enferma entra en transpiración. (Lilienthal.) Espamos histéricos y debilidad.

CASOS CLÍNICOS.

La Srita. R., de 16 años, menstruó una vez cuando tenía trece años, y desde entonces no ha vuelto á presentarse el período. Era una muchacha bien constituída y extraordinariamente sana, hasta tres meses antes de que me consultara, cuando comenzó á desmejorar. Enflaqueció, se puso pálida, lánguida y débil, y sufría mucho del estómago.

Cuando fuí llamado para verla, no estaba capaz de mantenerse en pie, y vomitaba tan pronto como tomaba algún alimento; se quejaba de gran dolor en el estómago inmediatamente después de comer, aun las cosas más ligeras; en varias ocasiones causaba el dolor intensas convulsiones histéricas. La lengua no estaba sino ligeramente cubierta de blanco, los instestinos constipados; el abdomen timpanizado y muy sensible á la presión más ligera; *sin fiebre*, pero con mucha sed; el agua, así como el alimento, era expulsado tan pronto còmo lo deglutía. Al principio creí que tenía que tratar un caso de dispepsia nerviosa, pero finalmente adquirí la convicción de que tenía un caso de verdadera histeria; asmismo era sumamente nerviosa é hiperestésica sobre todo, y cuando alguno se le acercaba le producía mucha agitación. También encontré que tenía convulsiones siempre que sus ideas eran contrariadas de alguna manera, y como indicara yo que habría que recurrir al agua fría, si reaparecían las convulsiones, desde luego cesaron éstas. *Ferrum phos.* 12ª x alivió la molestia del estómago en una semana, y *Kali phos.* 12ª x curó todos los otros síntomas en dos semanas ó más, y mi enferma pronto estuvo tan vigorosa y sana como antes de su padecimiento. La menstruación volvió dos meses después, y desde entonces todo ha seguido bien. (Dr. Geo. H. Martin S. F.)

La Srita. B., de 50 años, alta, delgada y morena, había estado padeciendo muchos años de un estado excesivamente nervioso, y llegaba á ponerse histérica á la más ligera provocación. También sufría mucho de retención espasmódica de la orina, y con frecuencia había que recurrir al uso del catéter. Un día vino á verme diciendo que la extremidad del catéter se había roto mientras lo usaba, y el pedazo desprendido estaba aún en la vejiga. Dilaté la uretra con mi índice, y pronto remedié el accidente, la vejiga al mismo tiempo estaba muy llena de orina. No quiso tomar un anestésico, aunque lo aconsejé, viendo que el dolor era intenso. Esa tarde, seis horas después de la extracción del catéter, mandó por mí, diciendo que sentía un gran dolor y estaba muy mala. Cuando la ví la hallé muy nerviosa, y sufriendo mucho de dolor en la vejiga y abdomen, con un gran deseo de orinar. El abdomen estaba enormemente distendido y muy sensible. No había fiebre. La dí *Belladonna* 3ª x y volví á la mañana siguiente. Todos los síntomas eran peores, y sin embargo, no había fiebre. In-

tenté vaciar la vejiga, pero no podía introducirse la sonda elástica, porque era bastante grande el espasmo de la uretra. Dos horas después volví con la metálica. Pensando pudiese haber alguna afección uterina, determiné examinar ese órgano y descubrir la causa del padecimiento. Como era tan sensible, la dí un poco de *cloroformo*. Después de unas cuantas inhalaciones desapareció la timpanitis. Examiné el útero y la vejiga, y no encontré nada anormal, por esto inferí que estaba padeciendo de histeria. Administré *Magnesia phos.* 12ª x la que muy luego alivió los síntomas de la vejiga, y *Kali phos.* 12ª x curó el caso en diez días apenas. Desde entonces no volvió más la molestia, y los otros síntomas de histeria también fueron muy modificados. (Dr. Geo. H. Martín, S. F.)

HUESOS, ENFERMEDADES DE LOS.

CALCAREA PHOS.—Es útil para ayudar el proceso de consolidación en las fracturas. Cuando los huesos son blandos y débiles, cuya blandura esponjosa es debida á la necesidad de las moléculas de fosfato de cal. Raquitis, piernas contraídas en los niños. También para la ulceración y destrucción de los huesos del cráneo. Ulceras fistulosas en los maleolos; bordes callosos, secreción pútrida é icorosa. Dolores á lo largo de las suturas y de las sínfisis del hueso.

FERRUM PHOS.—En las enfermedades de los huesos, cuando las partes blandas están rojas, calientes, dolorosas é inflamadas. Osteitis, periostitis. Enfermedades de la articulación de la cadera.

KALI MUR.—Segundo período de la osteitis.

KALI PHOS.—Atrofia de los huesos con diarrea fétida.

SILICEA.—Está indicada en casi todas las enfermedades de los huesos. Trayectos fistulosos, secreciones de mal olor. Alrededor de las partes enfermas hay dureza, hinchazón y color rojo-azulado; las partes fibrosas de las articulaciones están inflamadas, especialmente la de la rodilla. Ulceración del periostio. Todas las excreciones como el pus, las deposiciones, el sudor, etc., son de mal olor. Enfermedad de la articulación de la cadera.

La SILICEA es la más frecuentemente indicada y la que ha curado más casos de caries y necrosis que cualquier otro remedio.

Es de una acción profunda y mientras más extrecho es el parecido que tiene con *Mercur.* en sus efectos, más cuidado se debe tomar para no administrarla después de aquel, porque puede complicar mucho el caso. Es más conveniente para los casos crónicos, ó después que ha pasado el primer período (Gilchrist). Ninguna otra droga apresura tanto como ésta la eliminación de las partículas huesosas pertenecientes á los más grandes secuestros, y cuya eliminación es tan necesaria para la curación de las enfermedades escrofulosas. En muchas formas de caries, necrosis y en el encondroma de los huesos, Grauvogl recomienda, como un remedio muy popular y muy eficaz, los baños de heno. Su eficacia depende de la presencia de la *Silicea*, la que se ha encontrado como uno de los constituyentes químicos en un estado de solución en los referidos baños (tres dracmas de heno contie-

nen cerca de medio grano de *Silicea)*, por consiguiente, la utilidad de esta providencia local en las enfermedades de los huesos es evidente.

CALCAREA SULPH.—Ulceración de los huesos. Craniotabes.

CALCAREA FLUOR.—Elevaciones duras, ásperas y rugosas sobre la superficie de los huesos. Es útil en el céfalo-hematoma, en los huesos parietales de los recién nacidos. Contusión de los huesos. Exóstosis después de traumatismos. Enfermedades de los huesos; la caries conduce á la formación de abscesos de la pelvis. Afecciones de los huesos nasales, que al desaparecer causan mal olor. Nudosidades é hinchazones duras de los huesos; caries á consecuencia de la sífilis ó el abuso del mercurio. Espina ventosa, osteosarcoma. Mala nutrición de los huesos, especialmente de los de los dientes. Vegetaciones óseas, con especialidad en las articulaciones del carpo y del tarso. Supuración de los huesos.

MAGNESIA PHOS.—Espina ventosa, se alternará con *Calc. fluor*.

NATRUM SULPH.—Sicosis. Dolor en los huesos, crujidos de las articulaciones, rigidez de las rodillas.

CASOS CLÍNICOS.

FALTA DE UNIÓN DE UNA FRACTURA DEL RADIO Y DEL CÚBITO.—El Sr. D., de 23 años de edad, anémico y de constitución débil, sufrió una lesión traumática varios meses antes de que yo lo viera, y cuando las tablillas fueron separadas la dolencia no existía, pero los

huesos no estaban consolidados. Las partes fueron cortadas, los bordes refrescados, puestos en contacto y asegurados, y se le dió *Calcarea phos.* tres ó cuatro veces al día, con muy espléndido resultado. (Dr. O. A. Palmer.)

Encodroma indicis.—Una señora soltera, de 60 años, tenía una tumoración de aspecto lustroso en el índice de la mano izquierda, de la que venía padeciendo hacía ya diez y ocho meses. La parte enferma estaba dura y dolorida y del tamaño de una pequeña nuez hendida, pero más bien aplanada. La paciente estaba muy nerviosa y desanimada. *Calcarea fluor.* 3ª x, seis granos cuatro veces al día.

Después de dos semanas la naturaleza cartilaginosa había claramente disminuido, y la tumoración se había hecho más blanda y pequeña, desapareciendo enteramente á los tres meses. No hubo necesidad de cambiar su alimentación ni el lugar de su residencia. (Dr. J. C. Burnett.)

Traumatismo de la tibia de algunos años de duración; en el sitio de la lesión apareció una vegetación dolorosa. Fué esta diagnosticada como un osteosarcoma por un cirujano prominente, quien aconsejó una operación. *Calcarea fluor* alivió el dolor y redujo la vegetación. (Dr. L. A. Bell, *Hahnemannian Monthly*, Abril de 1887.)

El Dr. Hansen, de Copenhagen, relata en la *Allg. Hom. Zeit.*, de 1886, p. 44, un caso de caries de la tibia, de tres años de duración; el trayecto fistuloso llegaba á la parte inferior del hueso, por el que constantemente salían con las secreciones esquirlas de hueso necrosado, siendo espesa y amarilla la materia procedente de la fístula y acompañándose su salida con dolores nocturnos taladrantes. *Calcarea fluor* 6ª curó completamente en cinco meses.

Encondroma curado por Silicea.—(Tomado del Text—book de Grauvogl). En un muchacho de 14 años, los huesos metacarpianos de de los dedos anular, índice, medio y pulgar de la mano derecha presentaba una tumoración tal, que formaba una superficie uniforme, oval, dura y de masas nudosas; las articulaciones hacía ya seis meses que estaban inmovilizadas y como borradas. Las partes enfermas estaban en varios puntos denudadas de la piel por las superficies ulceradas, debajo de las cuales los huesos producían un sonido áspero al examinarlos con la tienta, existiendo puntos en los que se podía penetrar fácilmente, y

otros que ofrecían obstinada resistencia. El muchacho no tenía apetito, y estaba al servicio de un alfarero que lo ocupaba en conducir arcilla. Se quejaba de mucho dolor en las partes enfermas, somnolencia durante el día, laxitud y depresión. Conforme á las doctrinas de la cirugía, no había otro recurso sino la desarticulación de la muñeca, con pérdida de la mano derecha, puesto que solamente el dedo meñique y sus huesos metacarpianos parecían libres de la enfermedad. *Silicea* 6ª, cinco gotas cada dos horas. En ocho días las úlceras superficiales comenzaron á cicatrizar y las formaciones tuberosas habían disminuido claramente en extensión.

Después de otros catorce días las articulaciones estaban ya movibles, aun cuando el movimiento era excesivamente limitado. Al cabo de otros quince todos los síntomas concomitantes que se habían presentado desaparecían, el apetito volvió, el muchacho cobró vigor y buen humor, y se curó la secreción.

Una niña de 3 años tenía una enfermedad del hueso del índice de la mano izquierda, entre medio del medillo y la articulación contigua. Había una leve secreción blanquizca por una pequeña abertura, y la carne estaba muy hinchada y descolorida en el sitio enfermo, presentando todo el dedo un aspecto desagradable. Un médico, después de haberlo tratado sin éxito, había aconsejado la amputación del dedo, pero la familia, no deseando llegar á este extremo, decidió ensayar otros remedios. La dió *Silicea* 6ª en solución, la que desde luego produjo una mejoría, y en unas cuantas semanas curó la enfermedad en el hueso, é hizo que recobrara el dedo su aspecto natural, quedando sólo una ligera cicatriz. (C. T. M.)

El Dr. C. F. Nichols refiere una multitud de casos de tumores óseos curados y aliviados por *Calcarea fluor*, 12ª (Organon, 1880.)

Reunión tardía de una fractura.—Un hombre de 60 años tenía una fractura del cuerpo del fémur que permanecía movible, á pesar de un gran cuidado, después de dos meses. Le fué administrada *Calcarea phos.* 6ª, al principio cada noche; después cada dos noches. La fractura se consolidó desde luego, y pronto estuvo bien. Esto es ciertamente mejor que la intervención quirúrgica. Diez y ocho meses después sufrió otra fractura del mismo fémur en su porción inferior; se le dió

la droga de la misma manera que antes, pero desde el principio, y estuvo bien en dos meses. (Dr. J. C. Morgan.)

En el caso de una pobre muchacha huérfana, de 14 años, *Silicea* la libró de la amputación de un pie. Había estado mucho tiempo sometida á tratamiento para una enfermedad huesosa. Como su médico no veía remedio para la enfermedad, pues ésta cada vez empeoraba, hizo los preparativos con el cirujano del hospital, á fin de tener todo listo para la operación. Esto fué convenido seis días antes de trasladarla. Sus amigas estaban muy afligidas y recurrieron á los nuevos remedios. Se la hizo tomar con constancia una dosis cada hora de *Silicea*, y al exterior se le hicieron lociones con el mismo remedio. Al quinto día el hueso del tobillo y los tejidos circunvecinos presentaban una apariencia tal de salud que todo motivo de amputación fué desechado. Continuó el tratamiento por un corto tiempo más, y su caso se declaró perfectamente curado. (M. D. W. de Schüssler.)

INFLAMACIONES EN GENERAL.

FERRUM PHOS.—En el período hiperémico, sea cual fuere el órgano afectado, así como la causa de la enfermedad. **Siempre antes que se verifique el exudado.**

KALI MUR.—En el segundo período, estando reciente la proliferación de las celdillas y secreción blanca y opaca.

KALI SULPH.—La inflamación da lugar á una secreción amarilla, crasa, degenerada.

CALCAREA SULPH.—En el tercer período, que es de resolución, con secreción purulenta y profusa.

SILICEA.—En la forma asténica, conviene también para la irritablilidad nerviosa de un carácter tórpido. (J. C. Morgan.)

INFUENZA.—LA GRIPPE.

NATRUM SULPH.—Este es el remedio para la influenza. Puesto que la enfermedad es causada por un exceso de agua en los tejidos celulares. Es también un remedio apropiado para combatir las consecuencias que quedan en esta enfermedad después de la administración de otros remedios. Numerosos casos han sido relatados como curados con esta substancia.

KALI PHOS.—Para la debilidad nerviosa y postración que sigue á un ataque de Grippe. Cansancio en la mañana, sacudimiento de varios músculos y dolores neurálgicos.

MAGNESIA PHOS.—Neuralgías de carácter espasmódico, periódicas y aliviadas por el calor que aparecen como consecuencia de la grippe.

INSOLACIÓN.

NATRUM MUR.—Como las condiciones patológicas de esta afeccción se originan de una pérdida brusca de la humedad de los tejidos de la nuca, el principal remedio de tales condiciones será el Natrum mur. Senos venosos, congestionados, con tendencia á la extravasión; congestión cerebral pasajera.

LENGUA.

CALCAREA SULPH.—Lengua saburrosa, con color de arcilla, amarilla en la base. Blanda; sabor ácido,

acre, jabonoso. Cuando en la inflamacion de la lengua se presenta supuración.

FERRUM PHOS.—Inflamación de la legua con hinchazón de un color rojo-obscuro. Cáncer.

KALI MUR.—Para la hinchazón en la glositis. Capa blanca, seca, blanco-pardusca, viscosa.

KALI PHOS.—Inflamación de la lengua cuando se presenta excesiva sequedad, ó agotamiento. Marchita, morena, con una capa como de mostaza líquida, excesivamente seca en la mañana, como si estuviese pegada al paladar. LENGUA MORENA. Los bordes de la lengua rojos y escaldados. Lengua excesivamente seca en la mañana.

KALI SULPH.—Cubierta amarilla, viscosa, algunas veces con bordes blanquizcos. Gusto pastoso, insípido.

CALCAREA PHOS.—Lengua hinchada, tiesa, entorpecida, cubierta de blanco, granulosa. Cáncer.

NATRUM MUR.—Capa viscosa, clara y acuosa, especialmente cuando se cubren los lados y la punta de pequeñas burbujas de saliva espumosa. Pérdida del gusto, lengua mapeada. Lengua húmeda, limpia. Lengua entorpecida y tiesa. Los niños son tardíos para aprender á hablar. Sensación de un cabello sobre la lengua. Se siente sequedad de la lengua y de la boca, que sólo es subjetiva.

NATRUM PHOS.—Lengua saburrosa y húmeda en en la base, de aspecto cremoso ó de amarillo brillante. Vesículas y sensación de un cabello sobre la punta de la lengua. Cáncer.

NATRUM SULPH.—Capa sucia de un verde-moreno ó verde-pardusco. Sabor ácido y amargo. Lengua viscosa, vesículas ardientes en la punta. Lengua roja.

SILICEA.—Induración de la lengua, dureza. Inflamación que degenera en supuración.

CALCAREA FLUOR.—Apariencia rajada de la lengua, con ó sin dolor. Induración de la lengua; queda dureza después de la inflamación.

MAGNESIA PHOS.—Capa lustrosa, amarilla, especialmente con dolor en los intestinos y presión en el estómago.

NOTA.—La capa de la lengua no siempre tiene completa influencia para la eleción de un remedio en todas las afecciones de los tejidos.

Si alguna persona, que esté padeciendo de un catarro crónico del estómago, se ve acometida de otra enfermedad (aguda), la capa de la lengua no siempre tendrá esa apariencia peculiar que indicará el remedio adecuado para la enfermedad aguda. Si alguna enfermedad, particularmente de una naturaleza crónica, se muestra por sí misma sin síntomas decisivos, entonces la capa de la lengua servirá de guía, en la mayor parte de los casos, para la elección de un remedio apropiado. (Schüssler.)

LEUCORREA.

Véase también enfermedades de las mujeres.

KALI MUR.—Secreción moderada de un mucus blanco-lechoso, sin irritación.

KALI PHOS.—Leucorrea, acre y que escalda, amarillosa, de color de naranja.

KALI SULPH.—Leucorrea, flujo de secreciones amarillas, verdosas, viscosas ó acuosas.

NATRUM MUR.—Leucorrea, cuando es una secreción acuosa, que escalda, irritante, mordicante, que aparece después, ó en el intervalo de los períodos. Verdosa, después de pasear, en la mañana, con cefalalgia, cólico, prurito de la vulva, y presión hacia abajo. Después de la aplicación tópica de nitrato de plata.

NATRUM PHOS.—Leucorrea, secreción cremosa ó de color de miel, ó bien ácida y acuosa, las secreciones del útero tienen un olor agrio acre.

NATRUM SULPH.—Leucorrea, acre, corrosiva, que inflama la parte.

CALCAREA PHOS.—Leucorrea, como un tónico constitucional, é intercurrente con el principal remedio; secreción de un mucus albuminoso. La leucorrea es peor después de los menstruos, parece como clara de huevo, con sensaciones de debilidad en los órganos sexuales, agravada después de evacuar y orinar: las partes laten con sensación voluptuosa. La enferma se resfría fácilmente.

SILICEA.—Leucorrea en lugar de los menstruos, precedida por dolorosos cólicos, también durante la micción y seguida de obstinada constipación. Deficiencia de calor animal. Especialmente para las mujeres enfermizas, excesivamente sensibles, cuya cons-

titución está imperfectamente nutrida debido á la asimilación imperfecta ó deficiente.

CASOS CLÍNICOS.

M. M., joven de 17 años, me consultó á causa de una rebelde leucorrea acre que padecía. Ensayé toda la serie de remedios indicados para tal caso.

Todos quedaron sin efecto, de modo que no podía sino admirar la paciencia y perseverancia de la enferma, á quien veía una vez por semana. En este caso Schüssler de nuevo me ayudó á salir del dilema. *Kali mur.* efectuó una curación violenta y permanente. (Dr. S. De Schüssler.)

LOMBRICES.

Véase VERMES.

MARASMO.

Véase Atrofia.

MEMBRANAS MUCOSAS.

Véase también afecciones catarrales.

El color y consistencia de la secreción debe decidir la elección del remedio. SECRECIÓN albuminosa: *Calc. phos.;* causando dolencia y escoriación: *Natrum mur.*, *Natrum phos.;* clara, transparente: *Natrum mur.;* fibrinosa: *Kali mur.*, *Magnesia phos.;* color de amarillo brillante: *Natrum phos.;* verdosa: *Kali sulph.;* de olor desagradable: *Kali phos.;* purulenta: *Calc. sulph.*,

Silicea; viscosa: *Kali sulph.;* amarillenta, grumosa: *Calc. fluor.*

MENINGITIS.

FERRUM PHOS.—Primer período de la meningitis, fiebre alta, pulso acelerado, delirio, etc.

KALI MUR.—El segundo remedio, cuando aparece el exudado.

CALCAREA PHOS.—El principal remedio en el hidrocéfalo agudo y crónico. Condiciones hidrocefaloides, fontanelas abiertas, planas, deprimidas, etc. Evita el hidrocéfalo en las familias predispuestas á él. Se da una dosis en polvo de la segunda trituración, mañana y tarde. Cuando ya se ha desarrollado, se alterna con *Argent. nit. 6ª.* (Grauvogl.)

NATRUM SULPH.—Dolores violentos de cabeza, especialmente en la base del cerebro y en la nuca. Dolor presivo, como si la base del cerebro fuese comprimida en un tornillo, ó como si algo corroyese en ese lugar. Después de lesiones traumáticas en la cabeza.

CASOS CLÍNICOS.

El Sr. D., de Er., sufría de meningitis, y el pronóstico del alópata que lo asistía fué desfavorable, según parece, pues nada le fué prescrito. El caso era especialmente grave, puesto que en su familia había una historia hereditaria de enfermedades cerebrales, y sus parientes más cercanos habían muerto de ella. En el momento en que fuí llamado, el enfermo ya tenía casi dos días de estar en un delirio espantoso, que aumentó hasta la locura. El conocimiento había desaparecido; tempe

ratura de más de 40°. Ordené *Ferrum phos.* y *Kali phos.* 6ª. Después de una semana encontré al enfermo libre de la fiebre, todavía algo débil, pero subjetivamente restablecido por completo. Para apresurar la convalecencia di *Kali phos.*, y ocho días más tarde el paciente estuvo capaz de salir á su destino. (Dr. Quesse.)

MENINGITIS ESPINAL.

NATRUM SULPH.—Dolores violentos en la nuca y la cabeza. Contracción del cuello hacia atrás y espasmos del dorso, así como irritabilidad mental y delirio. «En la meningitis espinal de hoy, si me fuesen quitados todos los remedios que existen en la Materia Médica y no tuviese más que uno con el que tratar esa enfermedad, escogería *Natrum sulph.*, porque puede modificar el ataque y salvar la vida en la mayoría de los casos. Abrevia la enfermedad maravillosamente cuando es el remedio verdaderamente indicado. La acumulación violenta de sangre á la cabeza que encontramos clínicamente en la enfermedad, es aliviada con prontitud.» (J. T. Kent.)

MENSTRUACIÓN.

Véase también Dismenorrea y enfermedades de las Mujeres.

FERRUM PHOS.—Dolor en los períodos menstruales con bochornos á la cara y pulso rápido, con vómito de alimento sin digerir, algunas veces gusto ácido, congestión excesiva, sangre roja, brillante. Este remedio debe tomarse como un preservativo antes de

los períodos si estos síntomas son periódicos. Menstruos cada tres semanas con presión en el abdomen y en la cintura y dolor en el vértice de la cabeza. Sensación de presión y flujo hacia abajo y constantes dolores pesados en el ovario.

KALI MUR.—Los períodos menstruales son demasiado tardíos ó suprimidos, detenidos, con lengua blanca, etc. Menstruos demasiado anticipados, flujo excesivo, obscuro, coagulado ó glutinoso, negro como la pez. Si los períodos tienen larga duración, demasiado frecuentes.

KALI PHOS.—Retención ó retraso del flujo mensual, con depresión de espíritu, lasitud y debilidad nerviosa general. Cólico menstrual ó gran dolor en la época de los períodos en las mujeres sensibles, pálidas, irritables, propensas al llanto; menstruos demasiado tardíos en algunas, siendo en semejantes condiciones demasiado escasos, secreción demasiado profusa, de un color rojo obscuro ó rojo negruzco, delgada y no coagulable, algunas veces con olor fuerte. Menstruos demasiado tardíos y al mismo tiempo escasos, irregulares y de olor desagradable, con una sensación de peso y plenitud en el abdomen, capa amarilla de la lengua. Menstruos prematuros y demasiado profusos en las personas nerviosas. Cefalalgia obtusa con los menstruos, mucho cansancio y estado soporoso, raquialgía, deseo intenso sexual después de los menstruos.

MAGNESIA PHOS.—El principal remedio en los casos ordinarios de cólico menstrual. Menstruación do-

lorosa ó dolor precediendo el flujo, vaginismo. Hinchazón de las partes externas. Dolores intensos, intermitentes, peores sobre el lado derecho, ALIVIADOS POR EL CALOR. MENSTRUOS DEMASIADO ANTICIPADOS, FLUJO OBSCURO Y FIBROSO, VISCOSO.

NATRUM MUR.—Secreción delgada, acuosa ó pálida; sangre acuosa, delgada. «En las jóvenes, si los menstruos no aparecen, ó cuando son muy escasos y á largos intervalos. Dolor en el estómago, náusea, vómito de alimento, debilidad y sensación de desfallecimiento, deseo por cosas agrias, aversión á la carne, al pan y á los alimentos guisados. De la 12 á la 30ª son las potencias más útiles.» (Sulzer.) Mucha melancolía durante la menstruación, con cefalalgia todas las mañanas. Menstruos demasiado profusos y demasiado anticipados, con sueño interrumpido, ensueños de ladrones, etc. Cefalalgia y dolor en la cintura al levantarse, mejoría por echarse sobre alguna cosa dura.

CALCAREA PHOS.—Menstruos demasiado anticipados en las jóvenes, demasiado tardíos en las personas adultas. Menstruación durante la lactancia. Deseo sexual insaciable antes del período, con gran debilidad y sensación de abatimiento después; la enferma necesita sentarse constantemente, aversión para levantarse y moverse. Dolores reumáticos. Disgustos subsiguientes, susceptibilidad al frío en cada cambio de estación, con dolores penosos en las articulaciones. Para las personas de carnes blandas, flacas, extenuadas.

NATRUM SULPH.—Menstruos acres, corrosivos, la secreción produce escoriación en los muslos, precedida por epistaxis violenta, intermitente, con cólico apremiante en el abdomen y ardor del paladar, como si estuviese denudado y ulcerado. Organos sexuales inflamados, doloridos, hinchados y cubiertos con vesículas. Los menstruos fluyen libremente mientras anda.

SILICEA.—Los menstruos tienen siempre un fuerte olor, siempre se siente un frío glacial durante los períodos con constipación, las materias fecales parece que en cierto modo retroceden. Dolor en la espalda con sensación de parálisis. Prolongación de los menstruos durante la lactancia. Menstruos anticipados pero escasos; rara vez, sin embargo, son profusos.

CALCAREA FLUOR.—Dolores excesivos con sensación de presión hacia abajo, hemorragia uterina.

NATRUM PHOS.—Menstruos demasiado anticipados y descoloridos, acompañados por una cefalalgia en la tarde que se localiza sobre los ojos, con tendencia á suspirar, y dolor en las rodillas como si los tendones estuviesen acortados; también duelen los puños, calofrío y sueño inquieto.

KALI SULPH.—Menstruos demasiado tardíos y al mismo tiempo escasos, con una sensación de peso y plenitud en el abdomen, dolor de cabeza y capa amarilla de la lengua. Metrorragia.

CALCAREA SULPH.—Menstruos demasiado tardíos

duran largo tiempo, con dolor de cabeza, sacudimientos y gran debilidad.

CASOS CLÍNICOS.

Metrorragia de seis semanas de duración, en el caso de una mujer gorda y robusta, de tez morena. Esta persona, que era una lavandera en Grenille, y á la cual ví solamente tres ó cuatro veces en mi despacho, atribuía su enfermedad á su constante permanencia en el agua fría. *Silicea* detuvo la hemorragia casi inmediatamente, y efectuó una mejoría tal en una semana, que apenas la conocí cuando se me presentó de nuevo la segunda vez. No había tomado ninguna otra medicina. (A. Ceste.)

La señorita S., de 22 años, trigueña, baja de cuerpo, gorda, de formas mórbidas, gran inteligencia y actividad cerebral, era atormentada cada mes desde la época de la pubertad con dismenorrea, comenzando varias horas anticipadamente, y durante el primer día de flujo, con dolores intensos en el útero, espalda y miembros inferiores, y éstos eran tan severos que parecían insoportables y amenazaban producir un acceso de histéria. En uno de estos ataques fuí mandado á llamar. Encontré en cama á la enferma, se le había dado baño de piés con agua caliente y de cuando en cuando se le habían aplicado paños calientes en el bajo vientre; pero los dolores no desaparecían. Inmediatamente la dí una gran dosis de *Magnes phos.* 6ª x. En menos de media hora disminuyeron los dolores; repetí la dosis; en pocos minutos la paciente comenzó á menstruar con facilidad, y continuó su curso acostumbrado. Para el próximo mes aconsejé á la enferma que comenzara el día antes del período á tomar tres dosis, y el día en que éste viniese tomar una dosis cada dos horas. No tuvo dolores este mes. Esta operación fué repetida el tercer mes; no más molestias; la paciente está ahora bien, y no le ha vuelto el dolor por espacio de tres años. ("Med. Advance," Dic., 1889.)

Dismenorrea.—En cada período menstrual era expulsada una membrana, la que variaba en tamaño desde una á dos pulgadas de largo. Sus síntomas eran, después de comenzar el flujo, dolores agudos, vivos, intensos hacia abajo en el abdomen, mejoría por echarse encogida en la

cama con un saco de agua caliente sobre el abdomen. Cuando los dolores intensos se mejoraban, aparecía una pesada incomodidad por uno ó dos días seguidos, y al día siguiente é inmediato expulsaba una membrana. Con excepción de este padecimiento gozaba de muy buena salud, Después de uno de sus períodos la dí *Magnes. phos.*, c. m. en agua. una dosis por la mañana y otra por la noche, durante dos días. El próximo período menstrual estuvo casi libre del dolor y los subsiguientes fueron sin dolor, pero era expulsada la membrana de cos tumbre.

Antes de esto había siempre permanecido en cama sin ningún ali vio. Continuó la menstruación sin dolores por seis ú ocho meses, hasta que se mojó los piés precisamente en la época precursora del período, tomó *Mannes. phos.* c. m., y esta medicina la alivió y no ha vuelto desde entonces á sufrir molestias. (S. A. Kimball.)

"Una señora casada, que había tenido un hijo, padecía su menorragia cada mes, menorragia que fué dos veces tan excesiva que la en ferma se vió en peligro de muerte. Examinando el útero lo encontré con descenso é hinchado; toda la vagina llena con el órgano indurado; el orificio del cuello sensible, rojo, dilatado cerca de media pulgada; el interior lleno completamente; el exterior congestionado. Comencé el tratamiento con *Magnes phos.* 6ª x., tres ó cuatro dosis al día. No se presentó hemorragia el mes siguiente. No hubo dolor, y en tres meses el órgano se redujo á su tamaño normal, y despedí curada á la paciente." (*Med. Advance*, Dic. 1889.)

MORFINA, USO DE LA.

NATRUM PHOS.—M. J. Luys refiere el caso de un médico que había estado acostumbrado á tomar cerca de siete granos de morfina diariamente. Pequeñas dósis de *Natrum phosphoricum* fueron administradas en inyecciones hipodérmicas (con glicerina y agua), y á medida que aumentaban gradualmente, el uso de la morfina era disminuido progresivamen-

te. En dos meses la morfina fué interrumpida enteramente, y entonces las dosis del remedio fueron disminuidas de un modo progresivo, y por último suspendidas del todo al cabo de dos semanas más.

No quedó deseo por la morfina.

KALI PHOS.—Una señorita de 20 años, inteligente, linda, viviendo en los círculos más elevados de la sociedad, era no obstante una consumada *morfinomaniaca*. Dos prácticos distinguidos y un especialista habían intentado curarla, pero fallaron completamente, debido, como supe después, á la excesiva postración del sistema nervioso, que llegaba casi al colapso completo.

Comencé el tratamiento con recelo y vacilación. Seguí el método adoptado por nuestros más célebres y afortunados prácticos. Sin embargo, mi enferma estaba, aparentemente, destinada á morir. Había usado uno después de otro todos los tónicos nerviosos que pude encontrar en los diferentes sistemas curativos. Estaba derrotado y me sentía enteramente desanimado.

En mi camino á la casa de la enferma, después de que había yo resuelto abandonar el tratamiento, pensé por casualidad en *Kali phos*. Volví á mi consultorio, cogí una provisión de él y la propuse tomar una dosis cada quince minutos. Al mismo tiempo suspendí todos los otros «tónicos» del corazón y de los nervios. El cambio fué sorprendente. Conseguí con el tratamiento neutralizar el efecto de la morfina y sostuve la fuerza nerviosa. El dolor de

cabeza agudo, intenso, el insomnio, la mirada fija, feroz, la lengua seca, morena, y ése horrible abatimiento, «estado de desfallecimiento,» sensación que cedió con rapidez á la sal de las celdillas, y produjo en ella un considerable restablecimiento. Es ahora, después de cuatro años, una mujer notablemente vigorosa, sana y feliz, sin el más leve deseo por el uso de las preparaciones de opio, y tiene, según se expresa, «un perfecto horror á la morfina.»

Atribuyo el resultado todo de la curación á *Kali phos.* (usé la 3ª potencia decimal); el otro tratamiento no podía haber sido completo si no se hubiese recurrido á la sal de las celdillas. (Dr. B. A. Sonders, Winterset Ohio.)

MUJERES, ENFERMEDADES DE LAS.

Véase también Leucorrea, Dismenorrea y Menstruación.

FERRUM PHOS.—DISMENORREA.—Dolor en la época de los períodos mensuales, con cara abochornada y pulso acelerado, con vómito de alimentos sin digerir; algunas veces existe gusto ácido.

MENSTRUACIÓN.—Congestión excesiva, la sangre es de un color rojo-brillante. Necesita tomarse este remedio como un preservativo antes de los períodos si estos síntomas son recurrentes. Impide la menorragia en las que están predispuestas á eso.

NÁUSEAS MATINALES.—En el embarazo, con vómi-

to del alimento tan pronto como se toma, con ó sin gusto ácido; se vomita el alimento sin digerir.

METRITIS.—En el primer período para hacer desaparecer la fiebre, el dolor y la congestión.

VAGINITIS.—Inflamación de la vagina, vaginismo, dolor en la vagina por el coito. Sequedad excesiva y sensibilidad, espasmos de la vagina.

KALI MUR.—MENSTRUACIÓN.—Los períodos mensuales son demasiado tardíos ó suprimidos, interrumpidos, lengua blanca, etc. Menstruos demasiado anticipados. Secreción excesiva, obscura, coagulada ó glutinosa, negra, parecida á la pez. Si el período se prolonga mucho y se hace demasiado frecuente.

NÁUSEAS MATINALES.—En el embarazo, también vómito de flema blanca.

UTERO.—Ulceración del hocico de tenca y del cuello uterino, con la secreción moderada, característica, blanca, espesa (glandular ó folicular), de la membrana mucosa (alcalina). Congestión del útero, crónica. Hipertrofia, segundo período.

LEUCORREA.—Secreción de mucus blanco-lechoso, moderado, no irritante. Fiebre puerperal, principal remedio.

KALI PHOS.—AMENORREA.—Retención ó retraso del flujo mensual, con depresión de espíritu, lasitud y debilidad nerviosa general.

LEUCORREA.—Escoriante y acre, amarillosa, produce vesículas, color como de naranja.

MENSTRUACIÓN.—Cólico menstrual ó grandes dolores en la época del período en las mujeres pálidas,

propensas al llanto, irritables. Menstruos demasiado tardíos en las mismas, igualmente escasos en semejantes condiciones, secreción demasiado profusa, de un rojo-obscuro ó negruzco, delgada y no coagulada, algunas veces con olor pronunciado.

Hemorragia uterina. Dolor en el lado izquierdo y ovarios. Dolor intenso á través del sacro.

ABORTO.—Amenaza presentarse en las personas nerviosas.

PARTO.—Dolores débiles y deficientes. Manía puerperal. Fiebre de sobreparto.

KALI SULPH.—LEUCORREA.—Secreción amarillosa, verdosa, viscosa ó secreciones acuosas.

MENSTRUACIÓN.—Demasiado tardía y al mismo tiempo escasa, con una sensación de peso y plenitud en el abdomen; capa amarilla de la lengua.

SILICEA.—Se adapta especialmente á las mujeres extraordinariamente sensibles, enfermizas, de compexión débil, músculos laxos, constitución escrofulosa; para las que son nerviosas, irritables, con piel seca; sudores nocturnos por causa de imperfecta asimilación.

MENSTRUOS.—Acres, de olor fuerte, escoriantes, generalmente demasiado profusos. Flujo leucorreico en lugar de los menstruos. Frialdad como de hielo, especialmente en los pies, durante los menstruos. Náuseas durante la comunicación sexual. Ninfomanía. Dolor de espalda con una sensación de parálisis de los miembros. Sudor de pies desagradable. Todos los síntomas se mejoran por el calor.

LEUCORREA.—Se presenta en lugar de los menstruos. Leucorrea dolorosa, que produce escozor durante la micción. Secreción profusa de agua blanquizca con picazón de las partes. Constipación, las heces fecales como que retroceden al ser evacuadas.

PARTO, ETC.—Supuración de las mamas. Trayectos fistulosos crónicos. Infartos duros en los pechos. El niño rehusa la leche ó la vomita tan pronto como la toma. Pezones agrietados y ulcerados.

MAGNESIA PHOS.—CÓLICO MENSTRUAL.—El principal remedio en los casos ordinarios. Menstruación dolorosa ó dolor precediendo el flujo. Vaginismo. Los dolores irradian desde la espina, son aliviados por las aplicaciones calientes y la presión, agravados por el frío. DISMENORREA MEMBRANOSA. Uno de los nuevos descubrimientos de las virtudes de *Magnes. phos.* ha sido encontrarla apropiada, por su acción fisiológica, para relajar la contracción del útero. Administrando 15 granos en agua caliente produce el efecto en cinco minutos, facilitando la expulsión de una placenta retenida.

NATRUM MUR.—LEUCORREA.—Secreción irritante, que escalda, acuosa, se siente escozor después ó en el intervalo de los períodos. Viscosa, corrosiva.

MENSTRUACIÓN. — Secreción delgada, acuosa, ó sangre líquida, clara, descolorida. Demasiado profusa y anticipada al mismo tiempo, con cefalalgia desgarradora, gran melancolía, regüeldos de sabor dulzaino. Después del uso local del nitrato de pla-

ta. «En las jóvenes, si no aparecen los menstruos, ó cuando son muy escasos y á largos intervalos. Dolor en el estómago, náusea, vómito de alimentos, debilidad y sensación de desfallecimiento, deseo por las cosas agrias, aversión á la carne, al pan y á los guisados. De las doce á la treinta son las potencias más útiles (Sulzer).» Presión hacia los órganos genitales en la mañana.

NÁUSEAS MATINALES.—Vómito de flema acuosa, espumosa.

NATRUM PHOS.—LEUCORREA.—Secreción cremosa ó de color de miel, ó bien acre y acuosa. La secreción del útero tiene un olor agrio, ácido.

NÁUSEAS MATINALES.—Con vómito de masas agrias, esterilidad con secreciones ácidas.

PROLAPSO UTERINO.—Con debilidad, sensación de abatimiento que empeora después de la defecación.

REGIÓN UTERINA.—Debilidad y angustia en esa región.

DISLOCACIONES UTERINAS.—Con dolores reumáticos.

CALCAREA PHOS.—LEUCORREA.—Como un tónico constitucional é intercurrente con el principal remedio. Secreción de mucus albuminoso. «En los casos en que la menstruación es demasiado anticipada, muy profusa y de larga duración, llegando con frecuencia á convertirse en metrorragia, especialmente en las mujeres enflaquecidas y debilitadas.» (Mossa, *Allg. Hom. Zeit.*, 1883.) Menstruos demasiado anticipados en las jóvenes, demasiado

tardíos en las adultas, especialmente en las pacientes reumáticas. Latidos en los genitales con sensaciones voluptuosas.

DISMENORREA.—Dolores como de parto, antes y durante el período catamenial. Espasmos uterinos después de la defecación ó la micción. NINFOMANÍA con calor y pesadez sobre el vértice, agravada antes de los menstruos. MENSTRUOS demasiado precoces, cada dos semanas, con sensaciones voluptuosas.

CALCAREA FLUOR.—DOLORES DE SOBREPARTO.—Si las contracciones son muy débiles y ligeras.

ABORTO.—Flujo excesivo, tonifica el poder contráctil del útero.

MENORRAGIA.

MENSTRUACIÓN.—Excesiva, con dolores de presión y afluijo hacia abajo, y hemorragia uterina.

DISLOCACIONES.—Dislocación del útero, descenso del útero, asociado con grande ansiedad mental. Prolapso del útero. Tirantez dolorosa en la región del útero y en los muslos. Metritis crónica intersticial.

CALCAREA SULPH.—Menstruos tardíos, de larga duración, con dolor de cabeza, sacudimientos y gran debilidad. Embarazo, vómito con sabor amargo. *Calcarea sulph.* 6ª es el mejor remedio para la extravasión de pus dentro de los tejidos de la pelvis que no están limitados por alguna membrana piogénica, ó cuando se forma una colección de pus por ruptura de la pared de un absceso sin que encuen-

tre una salida en las vísceras pelvianas. La enferma está descolorida y débil. (Dr. B. F. Betts.)

NATRUM SULPH.—Dismenorrea con cólico y calosfrío, menstruos acres, profusos y con vulvitis vesicular. Hemorragia nasal antes de los menstruos.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. V. W. Connor, de Lansing, Mich., refiere un caso interesante de celulitis pelviana crónica, en que la paciente había estado postrada en cama por nueve años, curada con *Kali mur.* 3ª x. La mejoría comenzó en seguida y ganó en peso 35 libras. El Dr. E. S. Bailey refiere un caso de menorragia curado por *Ferrum phos.* 3ª x. La enferma había padecido de menstruación profusa, el flujo producía la depleción de los vasos sanguíneos, no había dolor ni exageración en la sensibilidad local, en una palabra, sólo la anemia podía considerarse como la causa del mal.—Clínica, 1886, p. 374.

Dismenorrea, menstruos tardíos y escasos: *Kali sulph.*, cada cuatro horas, curó radical y completamente. (Dr. W. M. Pratt, *North American Journal of Homeopathy*, 1883.)

El Dr. Phil. Porter hace relación de un caso de erosión papilomatosa del cuello uterino curado con *Calc. fluor.* 6ª x, en el cual los síntomas locales estaban acompañados por un estado discrásico, aumento de volumen de los ganglios cervicales, extenuación y debilidad. Su prescripción fué basada sobre los cambios constitucionales, las condiciones locales (el aspecto agrietado del cuello) y una abundante leucorrea amarillenta.—*Hahnemannian Monthly.*

Caso de dismenorrea con neurosis, poniendo de manifiesto una hiperestesia neurótica, dolorosa é intensa. Excesivos padecimientos durante los menstruos, cefalalgia, etc., había usado casi todos los remedios homeopáticos, con ningún alivio permanente. *Kali phos.* 6ª x curó. (Dr. D. B. Whittier, *Trans. Mass. State Hom. Med.* Society, 1886).

Una señora solicitó verme precisamente después de una hemorragia intensa del útero; en efecto, cada vez que menstruaba casi se veía

á la muerte por el flujo excesivo. Por el reconocimiento encontré el útero endurecido y tan grande que llenaba completamente la vagina; sin duda había tenido esto principio hacía seis años, desde el alumbramiento de su niño, quejándose en todo este tiempo de un peso creciente en esa región. Comencé de una vez á darle *Calcarea fluor.*, una dosis cada cuatro horas. Esta medicina redujo la induración en cuatro á seis semanas á su tamaño natural, y han pasado ya cinco años y no ha vuelto á sentir más incomodidad. (Dr. A. P. Davis.)

La Señora W., con dos semanas de embarazo, había estado vomitando casi todo lo que comía en ese espacio de tiempo. Solamente el alimento era vomitado, y eso inmediamente después de tomarlo. Dí *Ferrum phos.* 12ª x., cuatro veces al día, una pequeña cantidad de polvo en seco. Lo que deseo indicar de este caso es lo siguiente: La señora W. ha tenido cuatro hijos y con cada uno había comenzado á vomitar casi desde el momento de la concepción, y continuado así todo el tiempo del embarazo: los últimos cuatro ó cinco meses de la gestación se veía obligada á permanecer en la cama, estando tan débil que no podía andar. Cuando la ví ya comenzaba á ponerse en este estado, pero desde que tomó el *Ferrum phos.* en unos cuantos días disminuyeron los vómitos, y al mes habían cesado enteramente, por lo que llegó al término de la preñez en magníficas condiciones. Sin embargo de que no podemos decir de una manera absoluta que habría tenido en este embarazo el mismo padecimiento que otras veces, es natural suponer que lo tendría. (Dr. G. H. Martín.)

La señora E., de 38 años, padecía hacía mucho tiempo de peritonitis y ovaritis crónicas.

Había tenido ataques subagudos, que le duraban por varios meses, postrándola en cama ó por lo menos encerrada en su aposento; apenas salía de un ataque cuando se le presentaba otro por un enfriamiento ó algún ligero esfuerzo. Estaba nerviosa y muy abatida. Una tarde se vió atacada por un dolor muy intenso localizado en las regiones del ovario izquierdo y del útero, extendiéndose á todo el abdomen, el que era muy sensible al tacto más ligero. Pulso, 120; temperatura 104: *Ferrum phos.* 12ª x y *Kali phos.* 12ª x fueron administradas en agua cada quince minutos, en alternación, duran-

te dos horas, después de cuyo tiempo los dolores se hicieron menos intensos. Los remedios fueron entonces propinados cada hora por varios días seguidos, hasta que desapareció todo dolor y sensibilidad. La paciente estuvo sometida al tratamiento por dos semanas más, después de las cuales se vió precisada á salir. Gradualmente aumentó su vigor y mejoría, y al presente ya han transcurrido dos años, sin tener el signo más ligero del padecimiento que había sufrido por tanto tiempo, y está bien y robusta. (Dr. G. H. Martín.)

La Señorita B., de 20 años, había estado padeciendo ya hacía dos años de intensa neuralgía ovárica en los períodos menstruales. Se había sometido al tratamiento de varios médicos que sólo pudieron proporcionarle algún alivio, y eso temporalmente, con la administración de la Morfina. Fuimos llamados para verla á deshoras de la noche y la encontramos sufriendo un dolor intenso en el ovario izquierdo, de un carácter tirante y obtuso, y sin embargo ligeramente intermitente. La paciente era histérica y muy excitable. La dí *Kali phos.* 6ª x en agua cada diez minutos, por media hora, tiempo en que la enferma se durmió, no despertando hasta la mañana siguiente, en que estuvo libre del dolor. La prescribí *Kali phos.* 6ª x, mañana y noche, por un mes; en el próximo período menstrual fuí llamado de nuevo y la encontré sufriendo mucho como antes.

La dí el mismo medicamento á la 12ª x cada diez minutos y se alivió después de haber tomado dos dosis. Siguió tomando esta última preparación *una vez* al día por un mes, y al presente, después de diez y ocho meses, no ha tenido más dolor, y se siente mejor en todos sentidos. (Dr. G. H. Martín.)

Una señora como de 40 años, padecía anteflexión del útero con un estado de excitación nerviosa muy peculiar; se encontraba sumamente inquieta respecto á su salud, débil, agotada por el más ligero esfuerzo. Irritable, se disgustaba fácilmente, lo que no era natural en ella. Había sufrido muchas contrariedades. Hiperemia del cerebro é hiperestesia, cuya condición la hacía las más veces completamente desgraciada. *Kali phos.* la curó enteramente. (Sarah N. Smith, New York.)

NEUMONÍA.

FERRUM PHOS.—Inflamación de los pulmones; ES EL PRIMERO Y PRINCIPAL REMEDIO. Fiebre alta, respiración corta, oprimida y acelerada. Debe ser administrado en el primer período hasta que se establezca una franca transpiración y se restaure la salud. Neumonía, período congestivo. La expectoración es de sangre clara. En la congestión consecutiva á la neumonía. El pulmón sano se pone repentinamente congestionado. Estertores crepitantes. Esputo de aspecto herrumbroso. «Este remedio y *Veratrum viride* me han dado mejor resultado en el tratamiento de la neumonía que cualquiera de los remedios que siempre he experimentado.» (Dr. G. W. Lawrence.)

KALI MUR.—Exudación fibrinosa en el parénquima pulmonar. La lengua está generalmente cubierta de blanco. El mucus es blanco y viscoso.

NATRUM MUR.—Inflamación de los pulmones, si hay gran cantidad de flemas que causan muchos estertores; los esputos son claros, serosos y espumosos, expectorados con dificultad; agravación por la mañana. Tos con cefalalgia pulsativa, orina y lagrimeo involuntarios.

KALI SULPH.—Inflamación de los pulmones con respiración jadeante, si la flema expectorada es amarilla, floja, ruidosa, ó compuesta de una mucosidad acuosa.

TOS ESTERTOROSA, especialmente en los niños. Sensación sofocativa, deseo por el aire frío.

SILICEA.—Neumonía crónica, descuidada, pasando al estado de supuración; dispnea cuando se acuesta de espaldas. Dolor en el pulmón profundamente localizado. Esputo profuso, grasoso, fétido.

CASOS CLÍNICOS.

Caso de neumonía del lóbulo superior izquierdo, con crepitación muy marcada y expectoración profusa de mucus rojizo, espumoso, diarrea acuosa, amarilla, vómitos verdes. *Laches.*, *Lycop.* y *Phosphor.* no dieron resultado. *Ferrum phos.*, cada dos horas, produjo inmediata mejoría; aun cuando la enferma parecía estar ya moribunda (tenía tuberculosis), la diarrea y los vómitos se modificaron. (Dr. W. C. Gooduo. Tomado de Hg.)

El Dr. A. L. Tisher alivió prontamente un niño atacado de neumonía lobular, con elevada temperatura, con *Ferrum phos.* Se le dió *Kali sulph* á causa de la expectoración espesa, amarillenta, acabando por curar rápidamente el caso.—*Hom. Journal of Obstetrics.*

Archibaldo Herbert, sufriendo de bronquitis crónica, tuvo un ataque de neumonía. De oficio limador de hierro, se expuso á un gran calor; se puso á descansar sobre un asiento en estado de completa transpiración, se vió acometido de un fuerte calosfrío, y como consecuencia le resultó inflamación en el pulmón derecho. El caso era grave, por estar complicado con afección bronquial, fiebre elevada, tos penosa, un dolor profundamente localizado en el lado derecho, expectoración adherente, de color herrumbroso. Se le administró *Ferrum phos.*, en alternación con *Kali mur.*, una dosis cada media hora, durante veinticuatro horas, luego se le dió cada hora. Para su estado de postración y falta de sueño le fueron administradas unas cuantas dosis de *Kali phos.* de cuando en cuando. Como cambiasen los esputos haciéndose de color amarillo, tomó *Kali sulph.* en lugar de *Kali mur;* y como este síntoma fué aliviado, *Natrum*

mur. y *Calcarea phos.* completaron la curación en poco más de diez días. Volvió de nuevo á su trabajo; libre de la inflamación y la bronquitis. (Tomado de Schüssler.)

Un caso en que se presentaban los siguientes síntomas: Extensa extravasión, con solidificación, gran dolor, tos dura y extenuante, con la expectoración característica, poco ó ningún sueño. Después de haber sido tratado por cerca de diez días con los remedios ordinarios, *Acon.*, *Bryon.*, *Phosphor.*, etc., sin conseguir la mejoría, y como el caso tomara proporciones más serias que las que por algunos años se me habían presentado, puse al enfermo bajo la acción de *Ferrum phos.* y *Kali mur.* en alternación. A las veinticuatro horas se declaró una asombrosa y marcada mejoría, la cual continuó hasta terminar la enfermedad en una rápida convalecencia. El caso fué de un carácter grave, por motivo de que había permanecido el enfermo tres meses en cama con un brazo fracturado, y se encontraba reducido á muy malas condiciones cuando apareció la neumonía. (Dr. S. Powell Burdich.)

NEURALGÍA.

KALI MUR.—Dolores nocturnos, lancinantes, desde la cintura á los pies, agravados por el calor de la cama. Necesidad de levantarse y sentarse en una silla para sentir alivio.

FERRUM PHOS.—Neuralgía congestiva ó inflamatoria, por enfriamiento ó resfrío, con dolores como si se introdujese un clavo á golpe de martillo. Dolor con ofuscamiento de la vista, de un lado, en la cabeza, temporales, sobre el ojo, ó en el maxilar. Si no es suficiente este remedio, se da *Calcarea sulph.*, y se pone cuidado en los síntomas de la lengua. Neuralgía acompañada de bochornos en la cara,

ardor ó calor difuso, sensación de peso y presión. Dolor de la cara con síntomas febriles. Tic doloroso. Neuralgía á lo largo de la parte interior de la órbita y la nariz. Neuralgía de las glándulas mamarias.

KALI PHOS.—Dolor neurálgico en cualquier órgano, depresión, pérdida de las fuerzas, sensación de incapacidad para levantarse ó permanecer en pie; sin embargo, el dolor se siente menos cuando se está en posición vertical ó se pasea. Neuralgía con mal humor, sensibilidad para la luz y el ruido, mejorada ó no con alguna sensación agradable. Este remedio es necesario para tonificar la substancia gris del sistema nervioso. Dolores neurálgicos en el tejido nervioso cuando amenazan parálisis, con una sensación de claudicación y adormecimiento. Dolores que se mejoran por un movimiento suave, agravados al levantarse; los dolores se sienten más con la quietud y soledad. Dolores neurálgicos y zumbido en los oídos, pérdida de las fuerzas, paroxismos de dolores neurálgicos con el subsiguiente agotamiento. Neuralgía del nervio ciático (véase Ciática). Dolor neurálgico de la cara. Neuralgías del lado derecho aliviadas por aplicaciones frías. Punzadas desde los dientes superiores al oído.

MAGNESIA PHOS.—Neuralgía intercostal de un carácter tirante y constrictivo. Espasmos por el frío y sin que exista estado alguno febril. Neuralgía en la cabeza, dolores muy intensos y lancinantes. Dolores neurálgicos en cualquiera parte del cuerpo,

cuando son demasiado agudos los fenómenos de la sensación; dolor espasmódico ó atormentador, dolores en la extremidad de las fibras nerviosas. Dolores agravados por cualquier movimiento ó por el acto de la masticación. Los dolores se presentan periódicamente, siendo muy agudos, lancinantes y penetrantes á lo largo del trayecto de los nervios. Neuralgía por exponerse á un viento fuerte del norte. Dolores espasmódicos y toda clase de afecciones de la misma especie. Neuralgía todas las noches, y aun en las que se prolongan durante el día. Neuralgías típicas faciales. Una contra-indicación para el uso del remedio es la mejoría por el frío. LAS APLICACIONES CALIENTES ALIVIAN Y ESPECIALMENTE SI SON SECAS. Este remedio obra sobre el lado derecho.

NATRUM MUR.—Dolores nerviosos que se presentan periódicamente con flujo de saliva ó lágrimas involuntarias. Dolores lancinantes, punzantes, á lo largo de las ramas nerviosas con los síntomas indicados. Neuralgía de la órbita con lagrimeos. Irritación del quinto par y también del nervio facial. Dolor de la cara con constipación, peor en la mañana, por leer, escribir y hablar, en las jóvenes escolares.

NATRUM PHOS.—Neuralgía facial, dolores de latido, punzantes, dolencia en el lado derecho del maxilar inferior.

NATRUM SULPH.—Ataques de neuralgía por permanecer en habitaciones húmedas, sótanos, etc. Lengua con capa morena, amarilla, espesa. El

Dr. J. T. O'Connor, de New York, refiere una curación con este remedio.

CALCAREA PHOS.—Dolores neurálgicos localizados profundamente en los huesos. Choques como chispas eléctricas. La neuralgía principia en la noche, volviendo periódicamente. Los dolores empeoran en la noche y con el mal tiempo. Tics. Neuralgía ani, agravada después de la defecación, durante largo tiempo. Dolores con SENSACIÓN DE REPTACIÓN, FRIALDAD Y ADORMECIMIENTO.

CALCAREA SULPH.—Este remedio ocupa un lugar entre los dolores muy agudos de *Magnesia phos.* y los paralizantes de *Kali phos*, (especialmente en las personas de edad, si hay falta de fuerza regeneradora para los tejidos nerviosos).

SILICEA.—En los dolores de los dientes es generalmente usado. Neuralgía lombo-abdominal. Mejoría por las envolturas calientes. Neuralgía tenaz causada por disipación, trabajos penosos, ó por un encierro completo.

CASOS CLÍNICOS.

Neuralgía.—El Dr. Parentau en la última conferencia de la Sociedad Francesa de Homeopatía, se expresó en una memoria como sigue:

En 1887, discutiendo la acción de *Ferrum phosphoricum* en esta sociedad, el Dr. Nimier nos aseguraba que este remedio tenía aplicación en la neuralgía supra-orbital del lado derecho con una agravación matinal

En aquella época tuve una joven paciente de 15 años, una muchacha anémica con menstruación defectuosa, quien, por tres meses me

hizo desconfiar de curarla, debido á la tenacidad de su afección, la cual se resistía á todos los remedios prescritos.

Resolví por consiguiente darla *Ferrum phosphoricum* á la 6ª x, y tuve la sorpresa y satisfacción de notar que se produjo cierta mejoría dos días después de la administración de la primera dosis. Naturalmente insistí con el remedio, y al cabo de ocho días la mejoría era de tal naturaleza que la paciente se creyó curada. Sin embargo, la aconsejé continuar el tratamiento por una semana más, y después informarme. No vino hasta pasados dos meses, pero la cura fué completa y sin recaídas.

Es inútil exponer que cuando encuentro una neuralgía supra-orbital del lado derecho, me apresuro á dar este remedio; pero habiendo sido varios experimentos de esta especie seguidos por absoluta negativa, estuve tentado á creer que mi primera observación era un caso simple de curación espontánea, cuando hace poco tuve sucesivamente dos casos de curación que me convencieron de que la explicación dada por el Dr. Nimier era completamente exacta.

En el segundo caso observado, no se trataba de una muchacha, sino de una joven de 27 años, modista, y quien por algunos meses había tenido ataques de neuralgía supra-orbital del lado derecho con agravaciones matinales ó coincidiendo con los períodos menstruales en los que había mucha irregularidad y hemorragias uterinas, etc.

Después de haber inútilmente ensayado *Nux vomica*, *Chamomilla*, *Belladonna*, *Colocynth.*, *Ignatia*, etc., experimenté *Ferrum phosphoricum*.

Como en el primer caso, antes de que hubieran pasado tres días la enferma volvió muy aliviada. Continué el remedio á la dilución 6ª x por ocho días, seguido por la 12ª x y la 18ª x, y al cabo de tres semanas la cura fué completa y sin recaída.

El tercer caso es semejante á los otros dos y creo estoy autorizado para completar las indicaciones suministradas por el Dr. Nimier.

Ferrum phosphoricum, como él ha dicho, es útil en las neuralgías supra-orbitales del lado derecho con agravación por las mañanas, pero manifiesta especialmente su influencia sobre el sexo femenino y notablemente en las personas jóvenes. Las pacientes sufren irre-

gularidades en la menstruación y frecuentemente tienen desórdenes especiales uterinos con tendencia á las hemorragias. De este estado resultan casi siempre cefalalgias persistentes y anemia, la cual puede ser más ó menos marcada, según el caso.

El caso siguiente debido á la pluma del Dr. C. C. Huff, de Huron, D. T., en el vol. 1, del *Minn. Medical Monthly*, núm. 9, engrandece el uso de uno de estos remedios en la neuralgía:

"Schüssler describe *Magnesia phos.* como un constituyente terrestre de los músculos y de los nervios. Dalton dice que las sales de magnesio se han encontrado en los músculos en más grande cantidad que las de cal. Admitimos, pues, este hecho, y tenemos á *Magnesia phos.* obrando como un remedio para los nervios, y cualquier desorden del sistema que cause un cambio molecular en los elementos nutritivos de esta sal, producirá los dolores característicos de este remedio. Se describen como siendo de un carácter lancinante como relámpago, tractivos y desgarrantes, con tendencia á cambiar de un lugar á otro; además, asumen cierta periodicidad en su retorno, no presentando, sin embargo, completa regularidad. También encontramos estos dolores en la cefalalgia, generalmente frontal, en el dolor de la cara, en la neuralgía del estómago y los intestinos, de los ovarios y á menudo en la de los miembros. Los dolores del estómago frecuentemente irradian desde el ombligo, y son aliviados por la presión (pareciéndose en esto Coloc., Aloes, Caustic., Nux vom., Iris vers. y Sulphur) y el calor, especialmente el calor seco, y más todavía, si se aplica por medio de un plato caliente invertido, envuelto con franela. En Inglaterra usan los agricultores el remedio con buenos y prontos resultados para el cólico flatulento de los caballos.

"Los siguientes casos los he observado en mi experiencia con este remedio, y todos los resultados han sido obtenidos con la 12ª x trituración:

"Caso 1. La Srita. S., de 24 años, estudiante, de tez obscura, temperamento nervioso. Había estado sometida durante dos semanas á un tratamiento para la neuralgía facial, siendo la morfina el principal remedio, pero sin encontrar alivio. Habiendo sido llamado para el caso, encontré á la paciente muy postrada, algún tanto hincha-

dos el lado derecho de la cara y la región supra-orbital, dolores muy intensos, de naturaleza calambroide, punzantes, lancilantes. Había también mucha sensibilidad sobre el lado afectado. Los dolores eran de un carácter intermitente, y parecían interesar diferentes partes de la cabeza y la cara en distintos días. *Magnesia phos.* curó en este caso en doce horas.

"Caso 2. La Srita. B., de 22 años, tez obscura, temperamento nervioso, estatura pequeña, tenía neuralgía, por exposición á un viento fuerte del norte; estuvo bajo un tratamiento adecuado tres días antes de que yo fuese llamado para verla, y había tomado para su afección dosis masivas de *Bromuro de potasio* é *Hidrato de cloral*, sin sentir alivio. La hallé en cama, casi desesperada por el dolor, la cara abochornada, los ojos inyectados, con excesiva fotofobia; el dolor era del lado izquierdo y envolvía la porción supramaxilar del trigémino. El carácter del dolor era lancinante, calambroide, punzante y pulsativo y la hacía gritar frecuentemente. Fué administrada *Magnesia phos.* y dió por resultado su rápido restablecimiento.

"Caso 3. La Srita. S., de 20 años, tez morena, alta y delgada, temperamento nervio-bilioso, dedicada á la tipografía. Fué atacada de una manera repentina por un dolor agudo en el lado derecho de la cara; el dolor ocupaba las regiones supra é infra-orbital, en paroxismos, de un carácter punzante, desgarrante. *Magnesia phos.* la curó de un modo rápido.

"Los casos anteriores han sido tomados de mi libro de memorias y ponen de relieve la acción de este remedio en la neuralgía del quinto par y de sus ramas. También he curado un caso de neuralgía en el estómago donde se presentaban los dolores característicos. He aliviado el cólico en los niños con el mismo remedio, cuando habían fallado *Chamom.*, *Nux vom.* y *Coloc.*"

Caso de prosopalgia que había durado varias semanas aliviado por la aplicación de lienzos calientes y agravado por el frío. *Magnesia phos.* 12ª x curó en tres semanas.—*Allg. Hom. Zeit.*, vol. 88, p. 46.

El Dr. H. C. Allen refiere un caso de neuralgía facial del lado derecho con dolores agudos, vivos, espasmódicos, como relámpago,

sensibilidad al tacto, aliviados por el calor y la presión, acompañados de postración y sudores nocturnos, curado por *Magnesia phos.* 200ª., la que produjo un alivio permanente después de haber fallado otros varios remedios.

Otro caso, también curado por el mismo remedio á la misma potencia en que los dolores eran intermitentes, punzantes, como relámpago, que aparecían y desaparecían súbitamente, aliviados por el calor y la presión, desapareciendo al mismo tiempo una incómoda y molesta constipación.

Rápida acción curativa con *Magnesia phos.*, por el Dr. Goullon: "El 13 de Abril me escribió una enferma diciéndome que hacía nueve días que estaba en cama sin asistencia médica, sufriendo de un dolor enloquecedor. Con motivo de un resfriado le vino una intensa molestia en el oído y en seguida una prosopalgia en el lado izquierdo, afectando el maxilar inferior, también el frontal, y extendiéndose á todo el mismo lado de la cabeza, parte posterior del cuello ó nuca. Fué á ver á un boticario con el fin de que le diese *Bryon.*, pero él le aconsejó *Bellad.*, la que no dió resultado. Se desarrolló un absceso en la parte más profunda del oído y había reventado hacía dos días, con secreción purulenta y después acuosa, tan irritante, que había producido una erupción en toda la superficie que tocó. No cesan los dolores del oído; la prosopalgia permanece como antes. El dolor es enloquecedor y hay fiebre alta con insomnio; no duerme en la noche y solamente consigue hacerlo una ó dos horas en el día. Transpira copiosamente, lo que es poco habitual en ella. Ayer tuvo un dolor intenso en la cadera derecha, como resultado de un baño. No tuve oportunidad para ver á la enferma, que estaba en aquella época viviendo en Leipsic, y sin embargo necesitaba atenderla inmediatamente. ¿Qué le prescribiría? *¿Silicea?* La agravación nocturna convenía á este remedio, pero el absceso en el oído estaba terminado; sin embargo, quedaba el dolor facial. *¿Spigel?* Había indicación para esa substancia, pero sabía que estaba algo afectado su corazón. Había tenido anteriormente dolores en la articulación de la mano, en el brazo y el costado, más intensos en el corazón. Los describía como si este órgano se le torciese, con una palpitación como si alguna cosa fuese desenredada.

Quizá era un reumatismo, localizado en la cara, pero aun para esto estaba indicada *Spigel*. En este caso está *Arnica*, la que ha sido recientemente ensalzada como un específico. Además, tenía alguna confianza en *Stannum*, el que para mí había curado muchas neuralgías que habían resistido aún al gran remedio nervioso: la *Quinina*.

La PERPLEJIDAD PARA ELEGIR LA MEDICINA aumentaba sin cesar. Podía darse *Chamom.* teniendo en cuenta el dolor insoportable. Del mismo modo estaba indicado *Mercur.* por motivo de la predisposición al sudor, y *Arsenic.* á causa de la inquietud.

"Haciendo á un lado, sin embargo, todos esos remedios, elegí la *Magnesia phos.* de Schüssler, humedecí un poco de polvo de azúcar de leche con la 6ª dilución y se lo mandé para que lo disolviese en medio vaso de agua, para tomar una cucharadita cada tres horas. El 17 de Abril tuve la satisfacción de leer las siguientes líneas: "Doy á Ud. los agradecimientos más sinceros por su bondadosa y rápida asistencia. Tuve inmediato alivio, soy feliz y al mismo tiempo agradecida. El dolor horrible desapareció de mi cara; el cuero cabelludo está todavía sensible, y en un lugar que indudablemente está en conexión con el oído existen aún dolores. El oído mismo duele algo y hay alguna secreción todavía."—Pop. Zeit. f. Hom., XVII, 13 y 14.

Neuralgía facial derecha, dolor incisivo, como de sacudida, dientes sensibles; peor después de recogerse en la cama. *Merc.* no produjo alivio. *Magnesia phos.* en agua hizo desaparecer pronto el mal y ha obrado igualmente bien dos veces después. Este remedio no dió resultado administrado en otro caso de neuralgía facial del lado izquierdo. Produjo, no obstante, sudor profuso, con temor de descubrirse. (Dr. W. P. Wesselhœft, de Hg.)

Chas. M., de 47 años, tiene ya hace una ó dos semanas un dolor intenso, desgarrante, en la región de la escápula derecha, extendiéndose á la parte superior del brazo del mismo lado y bajando por el antebrazo hasta el dedo pulgar, con adormecimiento, particularmente de dicho dedo, pero sin pérdida del movimiento ó del uso del brazo. El dolor se presenta en paroxismos, y se alivia por la fricción áspera y machacamiento del tejido muscular; molesta tanto

durante el día como en las noches. Ha tomado varios remedios, principalmente *Rhus tox.*, y recibido toques eléctricos diarios por espacio de una semana ó más, sin resultado. Después de tomar *Calcarea phos.* 6ª por unos cuantos días, el dolor y adormecimiento fueron muy aliviados, y habiendo continuado el remedio, la molestia fué curada en cerca de tres ó cuatro semanas. Cualquiera recaída de la enfermedad era aliviada prontamente por este remedio.

Un caso parecido en una joven de 20 años, fué curado por el mismo remedio, aun cuando tenía casi completa parálisis de la mano. (C. T. M.)

Neuralgía. Dolor supra é infra-orbital, extendiéndose á todos los dientes incisivos del lado derecho, intermitente, penetrante, punzante, como relámpago y mucha sensibilidad al tacto; aliviado por el calor y la presión, viene y desaparece repentinamente y se acompaña de postración y sudores nocturnos. *Magnesia phos.* 200ª alivió prontamente.—*Med. Advance*, Dic., 1889.

Una señora de apariencia sana sufría ya hacía varias semanas de dolor de la cara, irradiando á la mitad de la misma, durando cinco ó seis horas. Aliviado por la aplicación de lienzos calientes. Agravado por el frío, *Magnesia phos.* 12ª, cada tres horas, hizo desaparecer el dolor en tres días.

Una señora de 30 años sufría hacía varias semanas dolores en la cara y dientes, lado derecho, que cambiaban de lugar. Aparecían cada dos ó tres horas y se propagaban como un relámpago. *Magnesia phos.* 12ª, una dosis cada tres horas, curó en dos días.

Una señora de 42 años, apariencia hética, escaso flujo menstrual, frecuentemente suprimido. Desde hace dos años padece dolor taladrante sobre el ojo derecho; después de unos cuantos minutos se extiende sobre todo ese lado hasta el maxilar inferior, haciéndola salir violentamente de la cama. Pereza intestinal, poco apetito. *Magnesia phos.* dominó por completo la enfermedad en cuatro días. Este remedio regularizó el período catamenial y todos los ataques subsecuentes. (Dr. A. Plate.)

Kali phos. 12ª curó un caso de neuralgía en el lado derecho de la cara, originado por dientes picados, *aliviada por las aplicaciones frías*, *Magnesia phos.*, administrada al principio, no produjo alivio,

probablemente porque no había mejoría por el calor. Diferente á *Phosphor.* ó *Kali*, pero semejante á *Pulsat.* (Dr. W. P. Wesselhœft.)

La Srita. Margarita S. sufría de neuralgía, verdadero dolor de la fibra nerviosa, que como saeta atravesaba su cabeza á lo largo de los nervios. Lo había padecido de un modo intermitente por tres días. Dos dosis de *Magnesia phos.* la curaron completamente. (Dr. W. De Schüssler.)

Un caso de neuralgía aguda en la cabeza. La señora á quien se refiere viajó sesenta millas para asistir á un concierto, y se vió precisada á guardar cama á consecuencia del dolor. Después de estar sufriendo por varias horas, fuí llamado y la alivié completamente en una hora con *Magnesia phos.* 6ª x, una dosis cada diez minutos. (E. H. H.)

Ada D., niña sana, robusta, de 8 años de edad. Su síntoma era únicamente un dolor intenso en la parte inferior del sacro, que tenía lugar después de defecar y duraba todo el día, hasta que se metía en la cama, que era cuando cesaba. El dolor era tan agudo, que le impedía andar ó aun estar en pie: *Calcarea phos.* dió inmediato alivio. (Dr. R. T. Cooper.)

Magnesia phos. alivió un caso de neuralgía ciliar, interesando el ojo izquierdo, extendiéndose hacia abajo del cuello, con dolores como relámpagos, aliviados por la presión y el calor. Este caso presenta un síntoma semejante á *Mezereum*, á saber: sensación como si una corriente de aire frío soplase sobre el ojo. (Dr. G. P. Hale.)

El Sr. S., hombre delgado, de talla mediana, trigueño, pelo negro, y ojos muy obscuros, muy trabajador y no bien alimentado, se presentó en mi consultorio, quejándose de un dolor atroz en la cara, sobre el lado derecho, aparentemente interesaba el hueso malar. Mientras me esperaba tuvo un paroxismo agudo, siendo muy intenso el sufrimiento de este hombre. Lo describía diciendo que era de carácter taladrante, como un barreno, y después que se presentaban los dolores no podía describirlos sino como si fuesen choques. Le fué administrada *Mag. phos.* 30ª x, y se dirigió á su trabajo al día siguiente, y no ha sido molestado desde entonces por el padecimiento.

La Srita. C., mujer alta, delgada, de formas angulosas, de cabello castaño y algún tanto pálida; soltera y como de 35 años de edad. Pa-

dece un ataque agudo de neuralgía en el maxilar inferior del lado derecho, siendo muy común en ella esta afección. La cara está hinchada y muy dura; sensible al tacto y muy susceptible á la impresión del aire frío. El dolor es agudo, lancinante, penetrante, y cambiando de una parte á otra; puede conseguir algún alivio por el calor, aplicaciones secas. La dí *Mag. phos.* 30ª x, y fuí llamado para verla al día siguiente. El dolor cesó por completo, la hinchazón excesivamente disminuida y se manifestaba una marcada mejoría. Se continuó el tratamiento y las condiciones exteriores desaparecieron por completo. Se quejaba de un diente que le producía alguna molestia, diciendo que estaba muy flojo, y cuando se lo comprimía había una sensación de latido, con una impresión dolorosa. Se le dió *Silicea*, c. m., y ésta hizo desaparecer por completo la molestia restante, y ha permanecido desde entonces libre de todos los ataques neurálgicos.

La Sra. Mc., mujer delgada, de hermosa tez morena, cabello muy negro, casada, con cuatro meses de embarazo. Mientras sufría de un ataque de influenza, tuvo, como complicación, una neuralgía del lado derecho, localizada sobre el ojo é interesando el párpado superior, el cual se estremecía y temblaba cuando era intenso el dolor; tenía frecuentes dolores que, como relámpago, bajaban desde la región supraorbitaria á la parte interna del párpado superior. *Mag. phos.* 30ª x, alivió este caso en un tiempo muy corto. (Dr. Chas. C. Huff)

Casos que vienen á ilustrar la acción de Magnesia Phosphorica como un anodino en las neuralgías:

Caso 1º (Enero 21, 1895).—La Srita. G., de 48 años, encargada de una casa de huéspedes, de poco tiempo acá padecía mucha fatiga. Ha estado expuesta á ataques de dolores neurálgicos en la espina, pero durante dos años no ha tenido ninguno. Después de un ligero ataque de influenza se le desarrollaron dolores intensos en la región lombar; bajaban al nervio ciático derecho y subían á la espina. Sensibilidad á la presión con una sensación de entorpecimiento en las partes afectadas. Los dolores cambian de lugar, se mejoran por la quietud, empeoran en la noche. De cuando en cuando le acometen paroxismos, haciéndola gritar. La enferma está muy afligida y con gran inquietud por los dolores; su pulso es débil é indica depresión de la vitalidad. Se vió obligada á guardar cama por diez días, y fué tratada con Rhus,

Actæa racemosa, Bryonia y Arsenicum, pero sin resultado. Entonces le fué administrada *Magnesia phosphorica*, 3ª x trituración, gr. V., por mañana y noche, y cada hora cuando los dolores fuesen intensos. Disminuyeron luego éstos y la paciente observó que el polvo la mejoraba y que cada dosis la aliviaba. Estuvo de nuevo bien en unos cuantos días.

Caso 2º—La Sra. X., de 58 años, dama vigorosa y sana aparentemente, hasta hace dos años, en que sufrió, en los momentos en que se hallaba fuera de su casa, de vagos dolores neurálgicos alrededor del cuerpo, los cuales aumentaban gradualmente hasta llegar á ser muy intensos. Cuando la ví, en el pasado mes de Junio, tenía muy disminuida su vigorosa constitución. Los dolores eran mucho peóres en la noche, afectando varias regiones nerviosas, principalmente en la cintura. Variaban de dirección; había sensibilidad sobre las partes afectadas, y, finalmente, no conseguía dormir por la noche, sino que la pasaba andando y torciéndose las manos con desesperación. Había entorpecimiento de los dedos de los pies, y el estado en que se encontraba hacía pensar en el principio de una lesión espinal profundamente localizada. *Arsenicum*, *Quinina y Phosphorus* mejoraron el estado general; pero nada modificó los dolores hasta que fué administrada *Magnesia phosphorica*. Esta le produjo varias noches buenas y tranquilas, y continuada por un espacio de tiempo apaciguó los dolores. La enferma á poco abandonó Bournemouth, y según he oído decir, no ha vuelto á enfermarse. No se había esperado que *Magnesia phosphoca* pudiese curar un estado semejante, pero sus efectos en aliviar temporalmente el dolor y procurar el sueño fueron evidentes, tanto para la enferma como para sus parientes.

Caso 3º—La Srita. F., de 36 años, víctima de la nefritis crónica, ha mejorado mucho con el tratamiento. Después de algún trastorno mental, le comenzó una intensa neuralgía facial del lado izquierdo, irradiando de un molar superior que antes le había molestado, por inflamación recurrente de la raíz. El dolor era mejorado por el calor y la presión sobre el lado afectado, agravado por la conversación. *Phosphorus* al principio hizo desaparecer el dolor, pero pronto dejó de producir sus efectos. En seguida le fué administrada *Magnesia phosphorica*, la que alivió mucho. Aunque el dolor se presentaba de nuevo

irregularmente por algunos días, unas cuantas dosis de esta droga siempre lo hacían desaparecer, y no era necesario otro remedio.

Caso 4º—La Sra. W., anciana de 74 años, bastante pobre. Había estado curándose de un ligero eczema con constipación y dolores de estómago. Estos padecimientos se mejoraron. En 10 de Septiembre se quejó de neuralgía furiosa en el maxilar superior y en la cara. El dolor bajaba rápido del agujero infra-orbital á la parte interior del maxilar superior y á lo largo del hueso malar derecho. Era peor en la noche, aliviado por el calor, agravado por el más pequeño frío. El dolor era constrictivo y latente; había durado una semana. *Magnesia phosphorica* alivió casi de una vez, y no fué menester otro remedio.

Caso 5º—La Sra. B., de 50 años. Neuritis óptica progresiva, á causa de cuya afección está ahora completamente ciega. Ha sido sometida al tratamiento médico por dos años, y por algún tiempo fué atajado el progreso de la enfermedad por varios remedios, y pudo leer, hasta hace nueve meses, los caracteres grandes de imprenta. Desde entonces nada más ha conseguido. Ha tenido con frecuencia neuralgía supra-orbitaria del lado derecho. La visión del ojo izquierdo se ha perdido desde antes que yo la viese. Esta neuralgía era mitigada por *Actea racemosa*, y cuando era muy intensa por dosis accidentales de polvo de antipirina. En Septiembre del año pasado el dolor volvió de nuevo con gran intensidad. *Magnesia phosphorica*, 3ª x, 5 granos tomados en agua caliente, dos ó tres veces en un día, producían, cuando se agravaba el dolor, inmediato alivio. Quince días después manifestaba que los dolores habían enteramente cesado, y este polvo los había hecho desaparecer con más rapidez que alguno de los anteriormente prescritos.

OÍDOS, ENFERMEDADES DE LOS.

FERRUM PHOS.—Otalgia inflamatoria por enfriamiento, con dolor ardoroso y pulsátil. Sensibilidad para el ruido. Otitis en el período congestivo. Otalgia con dolor agudo, punzante. Ruidera en los oí-

dos, ocasionada porque la presión de la sangre pone en estado de relajación los vasos, no circulando este fluído convenientemente. Estados inflamatorios, dolores irradiantes, sensibilidad, especialmente en las afecciones del oído que se presentan en los sujetos anémicos. Uno de los síntomas clínicos es «Pulsación perceptible en el oído; cada uno de los movimientos del corazón se siente en este lugar, latidos en el oído y la cabeza; pueden contarse las pulsaciones.» (Houghton). Catarro crónico, sin supuración, del oído medio, cuando está engrosada la membrana del tímpano, y hay probable anquilosis de los huesecillos.

Para su uso son también indicaciones las siguientes: «1ª Una marcada tendencia para que sean difusos en lugar de circunscritos los procesos inflamatorios. 2ª El color de las partes es obscuro y como de carne rojiza. 3ª Una secreción moco-purulenta y una tendencia á la hemorragia. 4ª El completo establecimiento de la secreción no es seguido por el alivio del dolor. 5ª Se distingue el dolor por su carácter de paroxismos.» (Wanstall, *American Institute Transactions*, 1886, pág. 389.)

Son también indicaciones: la ausencia del exudado, los dolores irradiantes, la sensibilidad y el estado de anemia y debilidad general del paciente. Sordera por acción inflamatoria ó supuración, cuando los dolores son incisivos, con tensión, latidos ó calor, zumbido en los oídos por aflujo excesivo de sangre en ese lugar. Inflamación del tímpano, espe-

cialmente cuando la membrana está seca, y sus vasos sanguíneos congestionados. Inflamación difusa del canal auditivo externo y afecciones agudas del oído medio. (H. C. F.) Afecciones catarrales de las trompas de Eustaquio. «Para los dolores de oídos después de exponerse á un tiempo frío ó húmedo no tengo otro remedio mejor.» (R. S. Copeland.)

KALI MUR.—Dolor de oído, con saburra gris ó blanca de la lengua é hinchazón de las glándulas, hinchazón de la garganta. Trompas de Eustaquio hinchadas, ruido de chasquido en el oído cuando se traga. Sordera por hinchazón de las trompas de Eustaquio. Es también el principal remedio para la sordera por hinchazón del oído externo. Sordera con hinchazón de las glándulas ó ruidos de chasquido al sonarse; lengua blanca. Dermatitis crónica. Exfoliación húmeda de la cubierta epitelial del tímpano. En las ulceraciones, cuando el pus es blanquizco; estado granular del meato y de la membrana del tímpano; granulaciones excesivas. «Es uno de los más eficaces remedios que siempre hemos usado para la inflamación crónica catarral del oído medio, especialmente la forma llamada «prolífera.» Sensación de obstrucción, sonidos subjetivos, sordera, obstrucción naso-faríngea, faringitis granulosa, oclusión de las trompas de Eustaquio, membrana timpánica retraída, etc., paredes del meato externo atrofiadas. Parece afectar más decididamente la trompa derecha de Eustaquio. En el proceso supurativo crónico reduce la proliferación, de-

tiene la granulación y acelera el restablecimiento. (H. C. Houghton.)

«*Kali mur* es, sobre todo, adecuado al segundo ó á los últimos períodos de los estados catarrales de la mucosa naso-faríngea y trompa de Eustaquio, que, por continuidad de la membrana mucosa, se extiende á la cavidad misma del oído medio. El estado de la faringe, como se ve por la simple inspección, es el de una *membrana mucosa engrosada* con inflamación presente de forma subaguda ó crónica, y comunmente concentrada alrededor de los folículos, dando á la superficie una apariencia toscamente granular. Lo que indica su uso no es tanto la membrana intensamente roja, cuanto su aspecto pálido, como si del estado hipertrófico activo se pasase á otro atrófico pasivo ó menos activo. La presencia de manchitas de exudado blanquizco serían, además, una indicación para su uso, y también el estado de la lengua, si la capa es blanca ó gris. El estado nasal que acompaña al padecimiento está caracterizado por la hinchazón de la membrana mucosa, la obstrucción y la secreción espesa y amarilla, ó más tarde por una mucosidad espesa y blanquizca. Está indicado su uso para disminuir la susceptibilidad de estos estados catarrales.

«Esta misma condición, extendiéndose al interior de la trompa de Eustaquio, da lugar á un engrosamiento tal de la membrana mucosa, que la trompa, por determinado tiempo, está parcial, y algunas veces enteramente obstruída. Los síntomas auricula-

res que resultan de este estado de la trompa son bien conocidos, consistiendo en sordera en diferentes grados, sonidos subjetivos en grado correspondiente, y de cuando en cuando aquellos estallidos estremecedores y desagradables en el oído, que provienen de la repentina abertura parcial de la trompa durante la deglución, por la que se ve obligado á pasar á la cavidad timpánica, remediando de esta manera el vacío parcial que resulta siempre cuando el tímpano llega á ser una cavidad cerrada, y tiene lugar la rarificación del aire contenido. Por consiguiente, si en tales condiciones se hace el examen especular, puede percibirse una retracción más ó menos marcada de la membrana timpánica. En esta condición de la trompa el remedio conviene menos á los estados que son recientes y agudos que á los crónicos, ó las formas inflamatorias que desde el principio han sido menos activas y su acción se dice ser más marcada sobre la trompa de Eustaquio del lado derecho que sobre la del izquierdo.

«En la cavidad timpánica misma parece ser indicación para este remedio el proceso de proliferación lenta, con engrosamiento intersticial y consiguiente sordera, gradualmente progresiva, con ó sin ruidos subjetivos, y sin dolor. Es también útil, especialmente á la terminación de los ataques más activos y dolorosos, para disipar los restos de la inflamación é impedir, hasta donde sea posible, su pernicioso efecto, que ocasionaría el engrosamiento de la membrana mucosa timpánica y los cambios permanentes de

los delicados órganos contenidos dentro de la cavidad timpánica. En las afecciones supurativas del oído este remedio está menos frecuentemente indicado que en los procesos catarrales, pero se emplea algunas veces en los casos en que la granulación es excesiva, para contener la exuberancia de su desarrollo y favorecer la resolución, mientras su utilidad para la terminación de las afecciones supurativas del oído medio, se ha encontrado ser muy grande para modificar la tendencia á las adherencias que constituyen uno de sus principales peligros.

«Finalmente, en el oído externo el uso de este remedio ha sido, hasta ahora, raro, comparativamente, siendo sus principales indicaciones una proliferación seca y escamosa de la epidermis del meato externo, con tendencia á la atrofia de las paredes. Una tumefacción de las glándulas que rodean el oído y el ángulo del maxilar y de las del cuello, indicarían, además de eso, su elección.

«Mi propia experiencia con *Kali mur.* me ha hecho aplicar este remedio frecuentemente á los estados catarrales crónicos del oído medio, y después de llevar un cuidadoso registro de su acción en doscientos de estos casos, poco más ó menos, en mi práctica privada, estoy persuadido de que es uno de los más útiles agentes que poseemos para este tratamiento. Nos ayudará eficazmente á mejorar muchos de aquellos casos inveterados, de larga duración, cuya persistencia va de mal en peor á causa de la más ligera provocación, y que no hay es-

peranza de curar. Sus más satisfactorios resultados se han obtenido en aquellos casos que han ido gradualmente progresando, pero que no han dado lugar todavía á aquellos cambios permanentes en los tejidos que aparecen siempre en el último período de la enfermedad.» (Prof. H. P. Bellows.) Otitis externa con engrosamiento y estrechamiento del meato y secreción delgada, vedijosa del oído.

«*Kali mur.* favorece la apertura de la trompa de Eustaquio. Después de su uso llega á facilitarse el ensanchamiento.» (R. S. C.)

NATRUM MUR.—Sordera por hinchazón de la cavidad timpánica, con estados predispuestos á las secreciones acuosas. Rugidos en los oídos, lengua cubierta de burbujas, saliva profusa, etc. Catarro de la cavidad timpánica y de la trompa de Eustaquio, secreción purulenta de los oídos. Picazón y ardor en el oído. Dolor punzante en el mismo.

KALI PHOS.—Entorpecimiento del oído con ruidos en la cabeza. Sordera por ausencia de percepción nerviosa, ruidos en la cabeza con debilidad y confusión. Picazón en el canal auditivo; oído muy sensible, no puede tolerar ningún ruido. Debilidad, agotamiento general de los nervios ó del sistema nervioso. «Ulceración de la membrana del tímpano, supuración del oído medio, siendo el pus acuoso, sucio, obscuro y MUY FÉTIDO. Ulceración tenaz que sangra fácilmente, mostrando poca tendencia á la granulación ó á secretar pus loable. Es útil, especialmente para los viejos. Estados atróficos en los

ancianos, tejidos enjutos, se llegan á cubrir de escamas, poniendo de manifiesto la falta de vitalidad.» (Houghton.) Si los ruidos y zumbidos en los oídos no se disipan por *Kali phos.*, aun cuando esté indicado, se conseguirá con *Magnes. phos.*

CALCAREA SULPH.—Secreción de pus del oído mezclada algunas veces con sangre. Sordera con supuración del oído medio, hinchazón de las glándulas, etc. Hinchazones sensibles detrás del oído, con tendencia á la supuración.

CALCAREA PHOS.—Sensación de frío en la parte exterior de los oídos. Los huesos que rodean al oído se sienten estropeados, y duelen. Dolor de oído con padecimientos reumáticos, acompañado con tumefacción de los ganglios en los niños escrofulosos. Otorreas crónicas en los niños acompañadas de dentición dolorosa. (H. C. F.)

MAGNESIA PHOS.—Sordera ó entorpecimiento del oído por enfermedad de las fibras nerviosas auditivas. Sirve de suplemento á *Kali mur.* Enfermedad prolífera del oído medio. (Dr. Rounds.) Otalgia, puramente nerviosa en su carácter.

KALI SULPH.—Dolor de oído con secreción de líquido espeso, amarillo, verdoso, después de la inflamación. Dolor agudo, incisivo, abajo de los oídos. Punzadas, dolor tensivo y penetrante debajo del apófisis mastoides. Secreción de un pus acuoso amarillo. Sordera con afección catarral de la garganta, ocasionando hinchazón de la trompa de Eustaquio y oído interno con secreción amarilla, acuosa

y capa amarilla sobre la lengua. La sordera empeora en una habitación caliente. Otorrea de mal olor. Excrecencias polipoideas que cierran el meato. En la inflamación supurativa del oído medio cuándo la secreción es espesa. (H. C. F.)

SILICEA.—Entorpecimiento del oído con hinchazón y catarro de lás trompas de Eustaquio y de la cavidad del tímpano. El oído externo inflamado, hinchazón del meato externo. Afecciones del apófisis mastoides (véase el caso clínico de abajo). Exceso de sensibilidad para el ruido. Otorrea fétida. Los oídos se abren de cuando en cuando con estallido. Otitis supurativa cuando la secreción es delgada, icorosa, de mal olor y acompañada con destrucción del hueso.

NATRUM PHOS.—Oídos doloridos, la parte exterior cubierta con costras blandas, delgadas, como crema, depósito amarillo sobre la lengua. Un oído rojo, caliente, con frecuente picazón acompañada por desarreglos gástricos y acidez. Secrecion de pus por los oídos.

NATRUM SULPH.—Otalgia con sensación como de que algo quiere salir por el oído. Agravación con el tiempo húmedo. Campanilleo en los oídos.

CALCAREA FLUOR.—Enfermedad del apófisis mastoides cuando está afectado el periostio, más bien que el mismo hueso. (Houghton.) Depósitos calcáreos en el tímpano.

CASOS CLÍNICOS.

Un muchacho que hacía siete años venía padeciendo una afección catarral del oído, y que de cuando en cuando padecía dolores y zumbidos frecuentos, actualmente está padeciendo de un ataque subagudo de inflamación catarral del oído medio con ligero dolor. *Ferrum phos.* alivió éste; la próxima vez que fué observado quedaba todavía estrechez de la trompa de Eustaquio; la membrana mucosa de la faringe estaba pálida. *Kali mur.* disipó enteramente este síntoma, y recobró la audición normal.

Un muchacho de 15 años tenía enfermo un oído hacía ya doce años, y sufría la supuración del oído medio, como resultado de la fiebre escarlatinosa. Actualmente están inflamados ambos oídos; no tiene dolor, pero sí ruidos subjetivos, la audición muy disminuida, el pus llena el meato, la trompa de Eustaquio está dilatable, la membrana del tímpano derecho está granulosa y la del izquierdo perforada, la faringe con una capa espesa. *Calcarea sulph.* comenzó desde luego á producir una mejoría que siguió acentuándose con la continuación del medicamento; desapareció la apariencia granulosa de la membrana del tímpano derecho y la mejoría fué casi fenomenal.

Inflamación crónica supurativa del oído medio por fiebre escarlatinosa, supuración de ambos oídos, los conductos están llenos de pus de un color obscuro y de carácter fétido. *Kali phos.* curó enteramente. (Houghton, *Clinical Otology)*

El Profesor Houghton, en su excelente tratado sobre *Clinical Otology*, presenta muchos casos notables ilustrativos de la acción de estos remedios. Los arriba indicados fueron escogidos por no haberse empleado otros que los ya indicados; pero en la expresada obra se encuentran muchos ejemplos de la acción benéfica que en la práctica aúral pueden obtenerse con Ferr. phos., Kali mur. y Calc. sulph.

Inflamación aguda del oído medio, principiando por una sensación de plenitud en el oído y audición entorpecida. El dolor se presentaba ejecutando el procedimiento de Vasalva. Este estado, cuya agravación aumentaba rápidamente, se continuó por cuarenta y ocho horas, hasta que el médico fué solicitado y encontró lo siguiente: El dolor

se presentaba en paroxismos, había sensación como de un tapón en el oído, la membrana timpánica inyectada y alterada, pero sin señal de exudación en la cavidad timpánica. La pared posterior del meato auditivo, de un color rojo brillante, el oído muy sensible á las manipulaciones, *Ferrum phos.*, 6ª x, cada hora. La mejoría fué inmediata. El remedio se suspendió á las cuarenta y ocho horas.

La Sra. X., de 45 años, Febrero 16, 1887. Hace cerca de tres años que comenzó á sentir dolor molesto y ruidera en el oído izquierdo, agravado considerablemente en la época de los menstruos; el dolor de carácter severo y neurálgico se extendía sobre el lado izquierdo de la cabeza. El ruido subjetivo que percibía parecía despertado por algunos sonidos efectivos que llegaban al oído, y persistía algunas veces por algunas horas. Desde los últimos seis meses no había tenido ese dolor en el lado izquierdo, pero es constante la sordera. El lado derecho comienza ahora á estar sordo, pero sin dolor y ruidos. Esto ha ido aumentando en el mismo lado por varios meses. La salud, en lo general, es excelente, con excepción de un enrojecimiento, plenitud y deseo de rascar y desgarrar la piel alrededor del cuello, con hinchazón marcada á la vez de las glándulas del mismo, por unos cuantos días después de presentarse los menstruos. Esto solamente ha sido observado durante la época en que los oídos han estado embarazados. Las vibraciones del tono ó diapasón se perciben mejor en el lado izquierdo á través de los huesos, y en el derecho por el conducto auditivo. El meato del tímpano está seco y deprimido. La trompa de Eustaquio izquierda casi obstruída, la derecha más libre. Ardor frecuente del pabellón de la oreja sobre el lado izquierdo. *Kali mur.*, 6ª x, curó. (Dr. H. P. Bellows, en *N. E. Med. Gaz.*, Noviembre, 1889.)

Una mujer caquéctica, débil, padecía ya hacía tres ó cuatro días de otalgia y dolor en el lado derecho de la cabeza. El oído ha estado fluyendo por tres días, pero no se mitiga el dolor, que es muy intenso y se irradia por todo el órgano auditivo; la membrana del tímpano tiene el aspecto de carne roja, hinchada y perforada, la secreción es profusa y moco-purulenta, el meato rojo, hinchado é inflamado. *Ferrum phos.*, 2ª x, en agua, cada hora. A los tres días estuvo mejor en todos sentidos, menos dolor y secreción. Una semana más tarde todos los síntomas inflamatorios habían desaparecido.

El Dr. Wanstall refiere otros tres casos curados por el uso de *Ferrum phos*, desde la 2ª x á la 12ª x trituración, con resultados de lo más lisonjeros, reprimiendo la elevada temperatura, el delirio y el dolor que acompañaba la inflamación aguda del oído medio. *Transactions American Institute of Homoeopathic*, 1886, p. 398.

Caso de una joven de constitución delicada, escrofulosa, con secreción del oído derecho, obscura y de mal olor. Una vegetación ó excrecencia en forma de pólipo cerraba el meato cerca de su abertura. Durante ocho semanas había estado enteramente sorda de este oído. habiendo gradualmente aumentado la sordera por cuatro meses. *Kali sulph.*, 12ª, se le administró. En dos semanas el mal olor había enteramente desaparecido. Por medio del examen se encontró el pólipo reducido á una masa pequeña, negra, dura. La audición ha vuelto por completo, quedando sólo un ligero ruido silbante. Le fueron administradas dos dosis del remedio cada tres días. Este caso fué curado enteramente. (Dr. W. P. Wesselhœft, De Hg.)

Otitis externa.—El Dr. Stanley Wilde refiere un caso de otitis externa con subsiguiente otorrea y sordera, resistiéndose esta última á varios remedios como *Merc. sol.*, *Hydrastis* y *Sulphur*. El caso presentaba un estado de condensación y estrechamiento del meato, con una secreción poco espesa del mismo, la percepción para un reloj de bolsillo era de 4 pulgadas. *Kali mur.*, 3ª x, detuvo la secreción y llegó á ser normal la audición. El Dr. Wilde ha usado este remedio con buen éxito en la sordera por afección de la trompa de Eustaquio en los niños, debida á hipertrofia crónica de las amígdalas.—*Hom. review.*

El Dr. Goullon refiere el caso de un caballero de edad, quien sufría mucho de un zumbido en los oídos, el que aumentaba en grado considerable en una calle ruidosa. El enfermo tenía repetidos ataques de reumatismo inflamatorio, y el zumbido era probablemente de origen reumático. Mucha depresión mental. Audición dificultosa. Después de unos cuantos días del uso de *Kali phos.* 6ª, todos los síntomas, incluso el estado mental y la audición dificultosa, desaparecieron de una manera permanente.—*Pop. Hom. Zeitung.*

Un caballero me escribió los síntomas de otitis de un niñito de 4 meses de edad, quien tenía una fuerte secreción por uno de los oídos,

de un carácter repulsivo, delgada, icorosa, produciendo una erupción por donde quiera que el pus se ponía en contacto con los tegumentos. En seguida le envié *Kali phos.* 6ª x., ordenando le diesen una dosis cada seis horas. A los tres meses el escurrimiento había cesado enteramente, y la audición era perfecta. Uso frecuentemente la *Silicea* en alternación con *Kali phos.*, cuando está interesado el tejido conectivo. (Dr. A. P. Davis.)

Otro caso de "otitis catarrhalis internus," observado en mi consultorio; el individuo de quien se trata me vió después de gastar cosa de $600 con los llamados "regulars." El caso era de lo más notable que jamás había observado ó tratado. El sujeto era alto, delgado, sanguíneo; su temperamento nervioso podía servir de modelo del género *homo*, rudo, ignorante, salvaje, de aspecto imbécil, estúpido, un término medio entre el orangután, el mono y el chimpanzé, pero dotado de sensación, movimiento y reflexión, justificando á mi opinión el que fuese un hombre por "estas únicas facultades." Conseguí, pues, confirmar el estado exacto patológico del trastorno que había encontrado por medio de un examen suficientemente escudriñador. Había una enorme protuberancia que envolvía toda la región mastoidea, la piel estaba roja y reluciente, blanda, pulposa, mostrando signos evidentes de una induración y ruptura del tejido conectivo, y la masa toda llena de pus y exhalando un olor repugnante como de carne corrompida. De un solo golpe introduje un bisturí en el apófisis mastoides, del que brotó como cosa de una media pinta de sangre y pus. Después de desinfectar el tumor con Eucalyptus, limité los bordes de la herida, dejando en ella un tubo de drenaje. Curé la herida todos los días, poniendo al enfermo bajo la acción de Silicea, una dosis cada dos horas. Con el tratamiento dicho tuvé la satisfacción de verlo mejorar de día en día, y á las cuatro semanas cesó toda clase de molestia. No hubo recaída, sino que la cura avanzó regularmente hasta estar perfectamente. Este caso fué declarado como desesperado por varios médicos alópatas. (Dr. A. P. Davis.)

Wm. McKee, de 27 años, padecía de sordera, á consecuencia de catarro crónico del oído medio, sin supuración. Como era joven y se encontraba vigoroso, salía muchas veces por la noche con el objeto de pasear y bailar, y se entregaba á este placer con exageración, hasta

acalorizarse mucho y entrar en profusa transpiración, exponiéndose á las corrientes del aire y quitándose la levita sin precaución alguna.

De esta manera contrajo un resfriado, y luego otro, otro más, hasta convertirse en una persona siempre víctima del catarro crónico de la nariz y la garganta, siendo la secreción continua y muy molesta. En este tiempo (hace cerca de seis años) observó el principio de un ruido en los oídos, que aumentaba gradualmente, por lo que llegó á comprender que su audición estaba alterada. Entonces comenzó á atender su enfermedad, y cambió de médico, no consiguiendo inmediato alivio con su primer doctor, y pronto substituyó de nuevo al segundo; de este modo acudió á varios facultativos, algunos de ellos especialistas de la antigua escuela, quedando por consiguiente desalentado, y dejando á la enfermedad seguir su curso sin impedimento. Cuando vino á verme (en el pasado Marzo) dijo que era incapaz de oír, pues sólo percibía ruidos confusos, por más recio que se le hablara, y que estaba así desde hacía cinco años. Es de mediana estatura, más bien delgado, con el pelo rojo; tiene ojos azules, tez blanca, y aspecto ligeramente anémico Describe el ruido que siente en los oídos como obscuro y prolongado si no fija la atención particular en él; pero si concentra su imaginación, le parece que escucha toda clase de ruidos. Deseo mencionar un síntoma que era absolutamente notable, y que desapareció prontamente bajo la acción del remedio, á saber: el que fuese despertado en la noche por un sonido que tenía el carácter de estallido estrepitoso y después lo imposilitaba para continuar el el sueño "por el ruido confuso que le quedaba en sus oídos." Había una multitud de síntomas nerviosos en el caso, que me indujeron á consultarlo con el Dr. Bartlett: 1°. Ligera melancolía; permanecía solo y preocupado por su enfermedad durante varias horas. 2° Parecía vacilar cuando andaba. Hallé muy disminuidos sus reflejos tendinosos en la rodilla y al sostenerse en pie con los ojos cerrados se dejaba caer en mis brazos, no podía dar tres pasos, al menos hacia adelante, con los ojos cerrados, sin exponerse á caer. Lo puse sin vacilar bajo la acción de *Ferrum phos.*, y la mejoría se hizo notable. Pudo oír cada una de las palabras del más largo período levantando ligeramente la voz cuando le hablaban á varios pies de distancia.

Los ruidos disminuyeron mucho, dormía bien, y los síntomas ner-

viosos pronto desaparecieron. He insuflado continuamente el oído medio por el método de Politzer, una vez cada semana. (Dr. F. W. Messerve).

PERIOTITIS DEL MASTOIDES.—SILICEA.—El Dr. A. T. Sherman, de Minnesota, refiere el caso de un hombre que había padecido durante seis días de dolor en la región mastoidea. Por medio del examen encontré la membrana timpánica sumamente inyectada, se oía el diapasón ó tono indistintamente en cada lado cuando se apoyaba contra los huesos parietales; la audición alterada en el lado afectado. Temperatura 102. Muy débil, nervioso; parálisis muscular completa del lado derecho de la cara. El estado del sentido de la audición precedía á la enfermedad cerebral. No había dificultad en la deglución ú otra manifestación de parálisis de los músculos de las fauces, por lo cual el trastorno patológico no tenía por origen ninguna alteración del nervio petroso. No había alteración del sentido del gusto ó de las glándulas salivales, lo que indicaba que el mal no tenía que ver nada con la cuerda timpánica. Diagnosticó periostitis del mastoides con presión sobre el séptimo nervio, inmediatamente á su salida del acueducto de Falopio. Sacando la lengua se ve algunas veces desviada hacia el lado afectado. Mientras estaba pensando hacerle una incisión, el citado enfermo refirió que había encontrado algún alivio y conseguido dormir un poco la mañana anterior *colocando en la cabeza una cataplasma caliente de harina de maíz.* Dí *Silicea* 200ª,

una dosis cada tres horas. A las cuarenta y ocho horas había cesado todo dolor y la temperatura era normal. *El alivio por el calor húmedo* fué la guía sintomática para la elección del remedio.

Enfermedad del Méniere.—El Dr. Fellows hace relación en la «Clinique» de dos casos de esta enfermedad muy rápidamente aliviados por *Silicea* 3ª x y 6ª x, administrada varias veces al día.

La Sra. N...., de 34 años. Marzo 30, 1886. Por varios años ha estado padeciendo de cuando en cuando, de sordera en el oído del lado derecho, acompañada de sonidos como de campana y con dolor accidental de carácter pulsativo. El meato ligeramente deprimido y engrosado sobre el lado derecho. Catarro nasal en grado leve.

El oído derecho percibía el ruido del reloj á una distancia de 22 pulgadas, y después de haber practicado dos veces el cateterismo á la de 29. *Calc-phos.*, 2ª x, mañana y noche.—Pulverizaciones de las fosas nasales, con una solución débil y caliente de sal común.

Abril 7. Percepción del reloj por el oído derecho á 21 pulgadas=31 pulgadas después de practicar 3 veces el cateterismo. Kali mur. 6ª x, mañana y noche.

Abril 14. Percepción del reloj por el oído derecho, 22 pulgadas=52 pulgadas después de practicar 3 veces el cateterismo. Kali mur. 6ª x, mañana y noche.

Abril 21. Percepción del reloj por el oído derecho,

36 pulgadas=6 pies después de 3 cateterismos. Ha desaparecido el tinnitus. Kali mur. 6ªx en la noche.

Abril 27. Percepción del reloj por el oído derecho, 46 pulgadas=7 pies después de 3 cateterismos. Nada de tinnitus. Kali mur. 6ª x cada tercer noche.

Han pasado tres años desde que atendí á esta enferma y al terminar los dos primeros años tuve noticia de que no había vuelto á presentarse ninguna molestia. Como ha transcurrido otro año sin tener algunas noticias, indudablemente continúa la mejoría de un modo permanente. Es inútil decir que las pulverizaciones con la solución de sal solas no habrían sido suficientes para lograr la curación sin la ayuda del cateter y más si se considera la duración del alivio.

Para terminar mis notas sobre el uso de *Kali mur.* en la citada enfermedad aural, expondré simplemente que mi experiencia está de acuerdo con la observación de otros de que este remedio obra particularmente bien siguiendo á *Ferrum phos* ó *Merc. dulcis*, y él mismo es seguido especialmente con buen resultado por *Calcarea sulph.* (Dr. H. P. Bellows, en *N. E. Med. Gaz.*, *Nov.*, 1889).

SILICEA EN LA OTITIS SUPURATIVA.—El Dr. Bellows recuerda el caso de una cefalalgia periódica muy frecuente y penosa que parecía ser consecuencia de supuración crónica del oído medio. El tímpano estaba perforado. *Silicea* 3ª tomada por algunos meses agotó la secreción, curando el tímpano, y hacien-

do normal la audición; en cuanto á la cefalalgia pronto desaparecía.—*N. E. Med. Gazette*, Feb., 1893.

OJOS. ENFERMEDADES DE LOS

FERRUM PHOS.—Inflamación de cualquiera de las partes de los ojos sin secreción de moco ó de pus. Dolor en el globo del ojo, con agravaciones por el movimiento de los ojos. Sensación de quemadura en los mismos. Aparecen inflamados y rojos. Retinitis. Grande enrojecimiento con dolor severo, sin mucosidad ó supuración. «Conjuntiva congestionada, y con una sensación como si hubiese granos de arena bajo los párpados, visión confusa, las letras se borran mientras se lee, aun cuando sea normal la refracción, ó si existe cualquier defecto, éste se haya corregido por los lentes, ó bien cuando hay insuficiencia de los músculos del recto interno tanta cuanta puede determinarse. La fotofobia es peor por la luz artificial.» (Dr. H. F. Ivins).

El Dr. Robert Cooper hace relación de haber observado tres veces la aparición de un orzuelo en el párpado inferior del ojo derecho en los pacientes que estaban tomando este remedio por causa de debilidad. «*Ferrum phos.* conviene especialmente para la conjuntivitis con grande relajación de esa membrana, y es mejor que *Acónito* en la mayoría de las inflamaciones superficiales agudas de los ojos. En la retinitis, con mucha congestión de los vasos

de la retina. Se ha encontrado ser de grande utilidad.» (Dr. H. C. French).

KALI MUR.—Afecciones del ojo con secreción de moco blanco ó de materia amarillo-verdosa (también *Kali sulph.)*. Sensación de arena en los ojos. Costras amarillas, purulentas, sobre los párpados, manchas de pus. Vesículas en la córnea. Inflamación del iris. Ulcera plana superficial después de la formación de una vesícula. Retinitis. Keratitis parenquimatosa. Es muy útil aun en el principio del mal. "En la keratitis difusa intersticial en la cual la córnea está abigarrada en una grande extensión de su superficie con ligeros depósitos, encontramos el remedio de mucha utilidad. Verdaderamente, creemos que este remedio posee una influencia específica sobre muchos de los cambios patológicos de los ojos. Se ha encontrado que obra bien en los abscesos crónicos de la córnea.» (Dr. H. C. French).

En el *North American Journal of Homœopathy,* Sept., 1885, p. 14, el Dr. Geo. S. Norton escribe acerca del uso de este remedio en las ulceraciones de la córnea. Lo ha encontrado útil en las úlceras de un tipo claramente asténico, inflamaciones de mal carácter, casos de larga duración, en los que el enrojecimiento de la conjuntiva no es muy marcado. La fotofobia, el dolor y el lagrimeo son muy moderados ó no existen en manera alguna. Cualquiera parte de la córnea puede ser el asiento de la úlcera, pero lo más común es que aparezca primero en la periferia y se extienda de allí al centro. La base de

la úlcera tiene un aspecto blanco-sucio ó amarillo, frecuentemente vascular, y es muy marcada la inflamación alrededor, secreción moderada y de moco blanco; algunas veces hay infiltración purulenta extendida entre las láminas de la córnea (onix) ó dentro de la cámara anterior (hipopión), pero aun en este caso es asténica. Algunas veces la enfermedad simula un absceso que al abrirse se convierte con el tiempo en una úlcera. La lengua tendrá comunmente una capa delgada, blanca. (Véanse Casos Clínicos). En la CATARATA después de *Calc. fluor.* El Dr. Norton nos comunica lo siguiente: *Kali mur.* se adapta especialmente á la variedad no vascular de la inflamación parenquimatosa de la córnea. (*Aurum mur.*, *Cannabis y Merc.*, á la vascular y activa); puede existir alguna fotofobia y lagrimeo, pero nunca tan fuertes como con *Calc. phos.* Los dolores no son intensos, sino siempre moderados. Se presenta el enrojecimiento (pero nunca es excesivo) rojo-brillante ó encendido. Tracoma.

KALI PHOS.—Debilidad de la vista por un estado de agotamiento del organismo, después de la difteria. Sensación de arena ó basuras en los ojos. Dolencia de los globos de los ojos y de los bordes de los párpados. Ardor en los ojos como si estuviesen llenos de humo. Latidos dolorosos en los ojos, llegando á borrarse la vista, manchas negras ante los ojos. Fotofobia.

La apariencia fija y animada de los ojos es un síntoma de trastornos nerviosos durante el curso de

una enfermedad; caída de los párpados, estrabismo no espasmódico, ojos vizcos después de la difteria. Astenopia muscular y acomodativa é incoordinación de los músculos oculares, especialmente por trastornos de la inervación. (H. C. F.)

KALI SULPH.—Párpados cubiertos con costras amarillas, la secreción de los ojos es de materia amarilla ó verdosa, purulenta, pegajosa ó amarilla, acuosa. Catarata, opacidad del lente cristalino *(natrum mur.)* Oftalmía neonatorum, secreción delgada, amarilla ó icorosa, con membrana fuertemente adherida sobre la conjuntiva palpebral. Es útil cuando fallan otros remedios. Encontramos que *Kali sulph.* es un agente precioso en los abscesos de la córnea, y superior á *Kali mur.* en los casos en que existe pus en la cámara anterior (hipopión). Dos ó tres veces he visto disiparse el mal con una prontitud sorprendente bajo la acción única de este remedio á la 3ª x. (Dr. H. C. French).

MAGNESIA PHOS.—Caída del parpado, afecciones de los ojos con sensibilidad á la luz, ó pupilas contraídas, visión afectada, se ven chispas, colores ante los ojos, latido doloroso de los párpados, estrabismo espasmódico, visión entorpecida por debilidad del nervio óptico, estrabismo. Diplopia, neuralgía supra-orbital, aliviada por el calor. Hiperestesia de la retina con llamaradas de luz y manchas negras ante los ojos, con excitabilidad nerviosa general. (H. C. F.) Retinitis pigmentosa. (R. S. C.) La neu-

ralgía ciliar ha sido curada frecuentemente con este remedio.

NATRUM MUR.—Astenopia muscular; el más importante remedio. Vesículas en la córnea, secreción de moco claro de los ojos ó flujo de lágrimas con obstrucción de los conductos lagrimales, dolores neurálgicos que vuelven periódicamente con flujo de lágrimas. Ojos lacrimosos, la secreción causa escaldadura de la piel ó erupción de pequeñas vesículas; granulaciones en los párpados sin secreción de lágrimas. El tarso muy engrosado y rojo. Manchas blancas sobre la córnea. También puede hacerse diariamente la aplicación exterior de una solución de este remedio valiéndose de una jeringa. Las moléculas de la sal que quedan sobre la mancha causan por sus propiedades higroscópicas un estado de humedad gradual y de absorción de la mancha. Neuralgía ciliar. Catarata incipiente. Tritis. *Natrum mur.* es más conveniente cuando se aumenta la cantidad de los humores del globo del ojo, lo que produce una presión interna. «Tiene verdadero valor en el glaucoma.» (R. S. C.)

NATRUM PHOS.—Secreción de materia cremosa, de color amarillo brillante. Conjuntivitis con secreción de materia cremosa, amarilla. Hipopión. Párpados aglutinados por la mañana; téngase en cuenta el estado de la lengua, paladar, la presencia de eructos ácidos, etc. Lagrimeo ardiente, ojos inyectados. Vista opaca, como si un velo estuviese colocado ante los ojos. Oftalmía escrofulosa; estrabismo causa-

do por irritación intestinal, lombrices, etc. Oftalmía de los recién nacidos; también al exterior como lavatorio. «Oftalmía, secreción profusa, cremosa, viscosa y opacidad de la visión, especialmente en las mujeres de edad, también cuando se acompaña con diarrea.» (Duffield). Se ven chispas ante los ojos. Dolores terebrantes en los ojos, de origen reumático.

NATRUM SULPH.—Dolor en los ojos. Conjuntivitis granulosa. Fotofobia en la oftalmía escrofulosa. «No hay un remedio, con excepción quizá de *Graphites,* que tenga tan extraordinaria sensibilidad á la luz, en las oftalmías crónicas» (H. C. Allen). Color amarillo de la conjuntiva. Grandes granulaciones, como flictenas, con lagrimeo ardiente, sensación de quemadura en los bordes de los párpados. Hipopión.

SILICEA.—Orzuelo en los párpados; se usa también en loción para hacer desaparecer y apresurar la secreción indolente. Si hay mucha inflamación, *Ferrum phos.* Abscesos de la córnea profundamente localizados. Hipopión. Fotofobia, paroxismos violentos de nictalopía. Ambliopía y catarata después de suprimirse el sudor de los pies. Diviesos y tumores quísticos alrededor de los párpados. Córnea opaca. Neuralgía ciliar sobre el ojo derecho. Concreciones é induraciones de los párpados. Oftalmía escrofulosa.

CALCAREA PHOS.—Afecciones espasmódicas de los párpados, si falla en su acción *Magnes phos.* Que-

ratitis parenquimatosa en la diátesis escrofulosa. Util para detener los progresos de la catarata. Inflamación sin secreción de los ojos durante la dentición. Fotofobia. Opacidad de la córnea. No se usa cuando la conjuntivitis palpebral está muy acentuada. Ambliopía congénita en los niños de constitución raquítica y diátesis escrofulosa, con los síntomas generales que son característicos de la droga. Es útil en la forma no vascular de la queratitis difusa con fotofobia más marcada que la de *Kali mur.*, y acompañada por la bien conocida caquexia escrofulosa. La catarata aparece con el lupus, el cáncer ó la tuberculosis, la gota, etc.

CALCAREA SULPH.—Ulceras penetrantes en la córnea, oftalmía, pus espeso y amarillo. Inflamación de los ojos con secreción de materia espesa, amarilla. Abscesos de la córnea profundamente localizados *(Silicea)*. Hipopión para producir la reabsorción del exudado purulento en el ojo (después se administrará *Silicea)*. Retinitis. Sensación de cuerpo extraño; necesidad de emplear un vendaje, después de los traumatismos. Pus en la cámara anterior. Queratitis flictenular y conjuntivitis, aumento de volumen de los ganglios cervicales. Inflamación de las comisuras de los párpados. «Me ha prestado servicios para reducir la secreción purulenta en la oftalmía neonatorium.» (H. C. F.)

CALCAREA FLUOR.—Llamaradas y chispas fluctuantes ante los ojos, manchas en la córnea, conjuntivitis, CATARATA. Induraciones en los párpados.

Aumento de volumen de las glándulas de Meibonius. Este remedio ha sido encontrado útil en los casos de ceguera parcial. Obscurecimiento de la visión por esfuerzo excesivo de los ojos.

«He prescrito *Calcarea fluor.* últimamente en mi clínica, en una multitud de casos. En uno de catarata senil en el que fué usado, proporcionó ciertamente gran mejoría en la vista.» (R. S. Copeland, Prof. Ophthalmology, University of Michigan).

CASOS CLÍNICOS.

Los siguientes casos fueron proporcionados para esta edición por el Dr. T. M. Stewart, de Cincinnati:

1. Un niño débil, de 2 años de edad, cráneo delgado, fontanelas abiertas, catarata blanda del ojo izquierdo. *Calcarea fluorica* 6ª x; en tres meses de observación mostró cerrada la fontanela anterior, y muy mejorado el niño en su salud general. No hubo cambio en la catarata.

2. Los penosos síntomas siguientes no enteramente aliviados por el uso de anteojos convenientemente acomodados para arreglar el astigmatismo hiperópico, fueron completamente curados. Los anteojos se le prescribieron en Junio y el enfermo dió cuenta de su resultado en el siguiente mes de Noviembre. Se quejaba de picazón y ardor, la vista se borraba accidentalmente, manchitas flotantes delante de los ojos, todos los síntomas agravados por la luz. Kali phos., 6ª x, curó.

3. Epifora por error refringente no enteramente aliviada por el uso de ateojos á propósito. *Calcarea fluor.* 6ª x, alivió enteramente los siguientes síntomas: Prurito de la superficie mucosa de los párpados, ojos llenos de lágrimas y sensación como si soplase aire sobre los ojos después de usar los anteojos.

Queratitis parenquimatosa, inflamación de la córnea derecha extendiéndose sobre toda su superficie, de tres meses de duración; el paciente sólo podía hacer cuentas con los dedos; algún dolor, ligera foto-

bia y enrojecimiento, la pupila se dilataba lentamente bajo la acción de *Atrop.*, pero prontamente se contraía de nuevo. *Aurum mur.*, *Cinnabar*, con las instilaciones de *Atrop.*, no obraron bien. *Kali mur.* 6ª x, curó. Casos de corio-retinitis curados por *Kali mur.* —Allen & Norton, *Ophthalmic Therapeutics*, p. 106.

En la *Homœpatische Monatsblätter* de 1882, p. 95, existe una relación de trece casos de catarata *curados* (once con *Calcarea fluor*). La mejoría se manifestó en ocho días. Los otros dos casos necesitaron *Kali mur.* después de *Calcarea fluor.* Los siguientes casos del *N. A. J. H.*, de Septiembre de 1885, p. 15, relatados por Mr. George S. Norton, manifiestan la admirable acción de *Kali mur.* en la ulceración de la córnea:

Caso de úlcera de la córnea en gran tamaño, aumentando regularmente en extensión, base vascular, enrojecimiento moderado, no hay dolor, ligera fotofobia, lagrimeo profuso, nariz dolorida, ángulos ulcerados, *Kali mur.* 6ª La mejoría se declaró en seguida, y la úlcera comenzó á sanar; en cinco días desapareció la vascularización, y á los diez, el ojo estuvo perfectamente bien.

Caso de úlcera de la córnea con bordes elevados y base vascular, como consecuencia de queratitis flictelunar; á pesar de todo tratamiento había regularmente aumentado; la córnea nublada alrededor de la úlcera. *Kali mur.* 6ª La úlcera comenzó luego á sanar, y en dos semanas todos los síntomas inflamatorios habían desaparecido.

Ulcera de la córnea de la misma causa que la anterior, también aumentando rápidamente la infiltración purulenta entre las láminas corneales. Fotofobia muy marcada; enrojecimiento moderado y no hay dolor. Varios remedios fueron administrados sin éxito. *Kali mur.* 3ª fué prescrito, y se siguió una cura rápida.

Un niño con úlcera cerca del centro de la córnea, la cual era profunda; considerable infiltración. Pus en la cámara anterior; moderadamente roja, no había dolor; *Atrop* en instilación. Desaparición del hipopión, y se siguió un rápido restablecimiento en veinticuatro horas bajo la acción de *Kali mur.* 3ª

La Sra. B. L., de C., vino á verme con motivo de una hinchazón en el ojo derecho, hinchazón que apareció súbitamente. Había aconsejado un especialista la operación; la abertura palpebral, que se abría

con dificultad, estaba llena de una masa saliente, verde-amarillenta. La conjuntiva estaba infiltrada y la vista perdida. *Kali sulph.* 6ª hizo desaparecer la hinchazón y los síntomas inflamatorios de una manera completa y permanente en uno y medio días. (Quesse).

La Sra. M. N., de 46 años, me fué enviada para su tratamiento en Mayo 9, 1892, por el Dr. Boericke, con queratitis, interesando el tercio nasal inferior de la córnea izquierda. La inflamación había existido desde la Navidad anterior, y se la había sometido á un riguroso tratamiento alopático, sin mejoría alguna. Toda la conjuntiva bulbar y palpebral estaba extensamente inflamada. La superficie corneal era vascular, con un marcado círculo de leucocitos alrededor de los bordes de la córnea, limitado por la área enferma. Había una opacidad irregular blanca, densa, extendiéndose hasta el interior de los elementos intersticiales, ocupando el centro del territorio afectado, y abarcando una área de cerca de un octavo de pulgada cuadrada. El territorio obscurecido se extendía al eje de la visión. Podía distinguir con dificultad los objetos grandes colocados sobre el lado temporal, pero no había visión central. En 9 de Mayo la puse bajo la acción de *Kali mur.* 3ª x, cada tres horas. Hubo una marcada mejoría durante las primeras veinticuatro horas, y poco á poco se fué suprimiendo el uso de un astringente que se estaba usando contra la conjuntivitis. Después del séptimo día el *Kali mur.* fué propinado á la 6ª x cada cuatro horas, y se continuó así mientras existió la secreción. A los 23 días la visión era de $\frac{5}{20}$. La parte más grande de la área obscurecida había aclarado, y el leucoma casi desapareció, y con seguridad se puede pronosticar un restablecimiento completo de la visión en unas cuantas semanas bajo la influencia de *Kali mur.* (H. C. French).

Un niño de 8 años, con opacidad de una y otra córnea, con reciente ulceración é infiltración, sin enrojecimiento. Sanó la ulceración, y se disipó rápidamente la infiltración bajo *Kali mur.* 6ª.

Una úlcera en el borde exterior de la córnea ligeramente excavada, congestionada, mejoró rápidamente con este remedio.

Puede ser que se encuentre útil *Kali mur.* en los casos de ulceración evidente y ausencia de infiltración. Merece ensayarse.

Una muchacha tenía, en el borde inferior de la córnea izquierda,

una pequeña flictena, de la que partía un haz de vasitos sanguíneos. Sensación de arena en el ojo. Los bordes de los párpados estaban cubiertos de costras. *Kali mur.* 12ª, interior y exteriormente, cada seis horas por tres días, curó la córnea en diez días, y en tres semanas el estado costroso de los párpados, que había tenido durante dos años, casi desapareció. (Dr. W. P. Wesselhift, de Hg.)

El Dr. Koch escribe: Una anciana de 72 años vino á verme. Había usado una visera verde sobre los ojos, según recuerdo, desde la época de mi juventud, cuando como estudiante pasaba las vacaciones en Simbach con mis abuelos. Esta persona se quejaba de una constante sensación ardorosa en los ojos, causando un flujo continuo las lágrimas acres. Este padecimiento comenzaba á las ocho de la mañana y duraba hasta ponerse el sol. Durante la noche estaba mejor. Tenía mucha sed, pero poco apetito. La conjuntiva palpebral presentaba exteriormente un estado crónico de inflamación. A cada lado de la nariz había escoriación y eczema de la piel, ocasionada por la acritud del flujo de las lágrimas. Los puntos lagrimales estaban dilatados, pero los cónductos no se encontraban obstruidos. Vacilé si la daría *Natrum mur ó Arsénico;* pero la mención especial que del *primero* hace el Dr. Schüssler, por lo que respecta á esas secreciones de lágrimas excesivo, me determinaron á elegirlo, y dí *Natrum mur.* en agua, una cucharadita tres veces al día. En tres semanas todos los síntomas disminuyeron mucho, y poco tiempo después desaparecieron completamente. (De Schüssler).

He dado hasta ahora solamente *Natrum phos.* en los sujetos escrofulosos, y únicamente cuando fallan mis viejos remedios, Calcarea carb., etc. Un caso fué particularmente notable á causa de haber sido tan rápidamente curado. En el pasado Mayo me fué traída una muchachita, de 8 años de edad quien sufría de conjuntivitis severa, con gran temor á la luz. Había sido tratada durante algún tiempo por un práctico ordinario, pero sin resultado. Me aseguré de que la afección de sus ojos databa desde el tiempo en que había tenido sarampión, algunos años antes. *Calcarea carb.* y otras medicinas se mostraron ineficaces. El aumento de volumen de las glándulas del cuello y la secreción cremosa de los párpados, me indujeron á ensayar *Natrum phos.* del cual administré una dosis tres veces al día. Transcu

rrió una semana, y me fué traída la niña, sus ojos estaban brillantes y perfectamente curados. (De Schüssler).

Luis G., de 19 años, vino á mi oficina, en Julio 3 de 1886, por consejo de su médico, el Dr. Nichols, de Hoboken, N. J. El joven era de buen físico y aparentemente gozaba de perfecta salud.

Declaró que su ojo derecho había estado "inyectado de sangre" por una semana, y que la visión se había ido debilitando desde hacía cinco días.

Examinando el ojo mostró fotofobia moderada, lagrimeo, enrojecimiento conjuntival é inyección ciliar. La córnea estaba muy nebulosa, presentándose como enteramente deslustrada en toda su extensión, pero no estaba vascularizada; su superficie estaba clara. La facultad de la visión estaba reducida á contar los dedos á la distancia de seis pulgadas de los ojos. La historia del caso, aunque no evidente, indicaba más bien un origen estrumoso que sifilítico. Se le aplicó *Atrop.* en instilación y *Kali mur.* al interior. Bajo la influencia de sólo este tratamiento mejoró de un modo rápido y constante hasta verse libre del padecimiento; el 19 de Agosto la visión era de $\frac{15}{40}$. Lo volví á ver el 27 de Diciembre, cuando la visión con el ojo derecho era perfecta ($\frac{15}{15}$). Sin embargo, la enfermedad fué apareciendo de nuevo en el ojo izquierdo, como lo demostraban los síntomas inflamatorios, y la nebulosidad de la córnea en los bordes exteriores. V. I. $\frac{15}{30}$. Fué prescrito el mismo tratamiento que había sido empleado antes tan felizmente, pero durante dos semanas la opacidad de la córnea fué creciendo cada vez más, el enrojecimiento aumentó, llegó á ser más marcado el dolor, como si hubiese algún cuerpo extraño en el ojo, la fotofobia y el lagrimeo se hicieron excesivos, y la visión disminuyó hasta contar los dedos á la distancia de seis pulgadas. *Rhus tox*, 6ª x, fué alternado entonces con *Kali mur.* 6 x, cambiando pronto el tipo asténico de la enfermedad, y minorando los síntomas inflamatorios, después de lo cual, bajo la acción únicamente de *Kali mur.*, la mejoría continuó tan marcada que á las ocho semanas su visión era de $\frac{15}{40}$, y por fin llegó á ser completa.

El Dr. Koch nos informa que vino á verlo el criado de un arrendatario, y le dijo que no podía ver. Algún tiempo antes de esto, un fragmento de madera le había dado un golpe en el ojo. Había sido aten-

dido por ese accidente; tomado purgantes, se le habían hecho aplicaciones de sanguijuelas, de agua fría, y al presente su vista está completamente perdida. Las particularidades del caso son éstas: El bulbo estaba infiltrado con infarto vascular. La conjuntiva hinchada, y el párpado también estaba irritado é inflamado. La córnea estaba opaca, con un aspecto humoso de la cámara anterior (es decir, entre la córnea y el iris), y algo de materia veíase flotar con perfecta claridad. No encontré cuerpo extraño alguno. Los resultados subjetivos eran severo dolor ardiente en el ojo, como si fuese producido por un cuerpo extraño, y un continuo flujo de lágrimas. El hombre tenía que conservar el ojo vendado. Su apetito era bueno, y el pulso normal. Para establecer el tratamiento, tuve evidentemente que combatir dos afecciones diferentes: hipopión (materia en el ojo), y conjuntivitis. Primeramente dí *Ferrum phos.*, una dosis cada dos horas, y en una semana eran menos el dolor ardiente y el lagrimeo del ojo. Una semana después de esto el paciente se quejaba de que su vista no había mejorado. Ahora se me presentaba el trabajo de la absorción de la materia, así como la aclaración de la córnea. Para obtener la primera condición dí *Hepar sulph.*, pero después de unos quince días no reconocí progreso especial. Consideré el caso un poco difícil, en tanto que no tuviese lugar la absorción. Trayendo á la memoria una expresión del Dr. Quagleo, que consideraba la *Calcarea sulph.* de Schüssler, una de las más poderosas medicinas hasta el presente, administré algo de la misma *Calcarea sulph.* para tomar en agua en tres dosis. Habiendo transcurrido apenas una semana, vino el hombre á verme, muy complacido, diciendo que podía ver resplandores de luz en el ojo derecho. Positivamente, encontré la córnea menos nublada, y pude observar que algo de la materia había sido absorbida. Le dí ahora sólo una dosis por la noche y otra por la mañana. En tres semanas la absorción fué completa, y el obscurecimiento de la córnea desapareció enteramente, y su vista se restableció. Además de esto, fué también curada toda la inflamación de la conjuntiva. (De Schüssler).

Una mujer, de 56 años, de Simbach, quien siempre usó anteojos azules, vino á verme, pues comenzó á perder la vista en el ojo derecho. El origen y padecimientos consiguientes fueron como sigue: Hacía tres años, durante un medio día en el invierno, tuvo que caminar

de Arustorf á Simbach. Toda la pradera estaba cubierta de nieve, sobre la cual el sol brillaba espléndidamente, ocasionando una fuerte refracción. De repente sintió un dolor severo en el ojo derecho, é inmediatamente se dió cuenta de que había perdido la vista de él. Cogió nieve y se la aplicó sobre el ojo, lo que se imaginó le haría bien. Llegando á su casa envió por el doctor, quien le puso una sanguijuela en la región temporal derecha y le dió un fuerte purgante. Tuvo que guardar cama por tres semanas. El dolor se apaciguó, pero su vista no volvió de nuevo. Algún tiempo después, recorrió todo el camino de Passau, para consultar al Dr. E., el oculista. La dió un laxante y un ungüento, para frotarlo á todo el rededor del ojo (*Ungt.* hydrarg). Como el ungüento afectó las encías y aflojó los dientes, dejó de usarlo, no habiendo mejorado su vista.

Posteriormente, cuando supo que el Prof. Rothmund había operado de catarata al pastor de Landau, fué á verle. "Si esta medicina no os alivia, quedaréis ciega para siempre," tales fueron las palabras del Profesor. Su prescripción fué *Yoduro de potasio.* Después de haber consumido la prescripción tres veces, y usádola con constancia, no sintió mejoramiento y estaba completamente inconsolable. Con el ojo derecho no veía nada; todo parecía ahumado y nebuloso; y el otro ojo llegaba á hacerse más y más débil de mes en mes. El examen exterior mostró intacta la conjuntiva, como también la córnea, el iris, etc. Todo indicaba una enfermedad de los medios interiores del ojo. Pero pude ver, sin embargo, en la retina, como si existiese una especie de nube sobre ella, la que parecia extenderse desde el humor vítreo sobre el fondo del ojo. Introduje los rayos de luz en diferentes direcciones, y por este medio pude obtener mejor la visión de la retina. Aparecía opaca y nublada, las venas se veían claramente, formando una red obscura. En algunos lugares había indistintamente manchas bien marcadas, unas más grandes que otras, apareciéndoseme como el residuo de sangre extravasada. Las arterias eran apenas visibles, y las veía pálidas y más contraidas que en el estado normal. El tratamiento terapéutico necesario claramente indicado para mí, era producir la absorción de la substancia exudada, que era la causa del entorpecimiento de la vista. Conforme á la opinión del Prof. Rothmund, la inflamación de la retina tiene siempre lugar en el tejido conectivo, y

como esta substancia exudada parece de una naturaleza coagulada, la que á no dudar es fibrinosa, y, como es bien sabido, puede hipertrofiarse, y es capaz de degeneración grasosa, encontré que uno de los remedios en que podía fijarme, por ser de los más á propósito parecidos, era *Kali mur.* Dí entonces á la mujer ocho papeles, conteniendo cada uno dos centígramos; el polvo se disolvería en medio vaso vinero de agua, para tomarse una cucharada por la noche y otra por la mañana. Unos quince días después, la paciente volvió de nuevo, diciendo: "no creo encontrarme algo peor. Sírvase darme más de esos polvos." Recibió una docena, con las mismas instrucciones. Una mañana me mandó llamar muy temprano, y me dijo con grande alegría que al levantarse esa mañana pudo ver el bastidor de la ventana, distinguiéndolo perfectamente. Ensayé su vista en diferentes distancias, y encontré que la enferma había realmente mejorado. "Puedo ver medianamente al través de la nube," dijo. *Kali mur.* fué continuado en pequeñas dosis, y en cuatro meses su vista se restableció. (Tomado de Schüssler.)

Una muchacha, de 16 años, con queratitis recurrente. El ojo izquierdo muy inflamado, fotofobia ligera, obscuridad de la córnea, la que se veía atravesada de rojos vasos sanguíneos; zona enrojecida. *Calcarea phos.* 3ª x restableció completamente á la enferma. Nunca la he encontrado de alguna utilidad cuando la conjuntiva palpebral está muy congestionada. (R. T. Cooper).

Un tenedor de libros, de 28 años. Hace grandes esfuerzos con los ojos. "Los siente como congestionados," necesita limpiarlos con frecuencia y restregarlos con violencia. Es métrope, aun cuando puede leer los caracteres del núm. 15 á la distancia de quince pies con dificultad á causa de borrársele las letras, no mejora con los anteojos. Una bujía colocada á la distancia de doce pulgadas parece doble, y la imagen izquierda es vista con el ojo derecho, por consiguiente, tiene astenopia por paresia de los músculos recto-internos. *Natrum mur.* 200ª curó. (T. F. Allen).

El finado Dr. Kafka consignó un caso de lagrimeo incesante del ojo derecho, causado por exposición á un viento fuerte del norte, y dependiente de la obstrucción hiperémica de los conductos lacrimales. *Natrum mur.* 6ª curó en cuatro semanas, y fué igualmente eficaz

cuando, en otra última ocasión, volvió de nuevo la molestia.—*Hom. Recorder*, Enero, 93.

ORQUITIS.

FERRUM PHOS.—Orquitis que se presenta después de la supresión de la gonorrea.

KALI MUR.—Remedio principal si es debida á gonorrea suprimida.

CALCAREA PHOS.—Puede necesitarse más adelante.

CALCAREA FLUOR.—Induración y dureza de los testículos.

PARÁLISIS.

CALCAREA PHOS.—Frialdad, entorpecimiento, reptación y debilidad en las extremidades inferiores. Postración nerviosa. Sensación de magullamiento en el dorso después de enfermedades que producen agotamiento y por permanecer en la humedad.

KALI PHOS.—Parálisis facial, pérdida del poder estimulante sobre algunos músculos. La boca está desviada, levantándose hacia el lado no paralizado. Parálisis que se extiende paulatinamente, en la que es lento el progreso de la enfermedad; hay tendencia á la consunción, con pérdida del sentido del tacto, etc. Parálisis de locomoción, pérdida de movimiento del poder estimulante. Parálisis de las cuerdas vocales, pérdida de la voz por estado de relajación ó parálisis de los músculos de la laringe. Parálisis atrófica, y en la que está disminuido el poder vital

y las deyecciones tienen un olor pútrido. Todas las variedades de parálisis requieren este importante remedio, tales como parcial, paraplegia, hemiplegia, facial ó ptosis. Parálisis que se presentan de un modo repentino. Parálisis infantil.

MAGNESIA PHOS.—El enfermo está LÁNGUIDO Y AGOTADO, incapaz para levantarse. Padecimientos por permanecer en el agua fría *(Calcarea)*. Parálisis agitante, sacudidas involuntarias y temblor de las manos y miembros, ó de la cabeza, en las afecciones de los músculos. Parálisis muscular causada por una perturbación ó condición enfermiza de las diferentes fibras nerviosas, las cuales transmiten el poder estimulante á los músculos. Parálisis de la substancia blanca de las fibras nerviosas.

NATRUM PHOS.—Debilidad de los miembros inferiores desde las rodillas para abajo. ¡Las piernas de la enferma ceden á su peso cuando camina. (Farrington, *Pennsylvania Homeopathic Medical Society, 1875.)*

SILICEA.—Parálisis por tabes dorsalis. Temblores en los miembros. Debilidad. Dolores erráticos. Debilidad paralítica de las articulaciones. Esclerosis progresiva de los cordones posteriores.

CASOS CLÍNICOS.

A. G. tuvo una contrariedad amorosa, y, con intención de suicidarse, tomó un veneno, que la dejó con parálisis de las manos y los pies. Dí á la enferma seis papeles de *Calcarea phos.*, y cuatro semanas más tarde me escribió que podía andar alrededor del cuarto, apoyándose

en los muebles. Recibió seis papeles más, los que completaron su restablecimiento.

PAROTITIS.

FERRUM PHOS.—En el período inicial con síntomas febriles.

KALI MUR.—Este remedio curará sin ayuda de ningún otro, á menos que haya fiebre.

NATRUM MUR.—Con mucha saliva ó hinchazón de los testículos, ocurriendo como una metástasis de la parotitis.

CASOS CLÍNICOS.

He tratado, durante el año pasado, á lo menos una docena de casos de parotitis, y nunca he tenido tan satisfactorios resultados con otros remedios. En un caso había fiebre violenta, delirio constante, mucha hinchazón, dolor, etc. La fiebre fué absolutamente disminuida en cinco ó seis horas, y la hinchazón y todos los otros síntomas fueron enteramente aliviados, en tres ó cuatro días, por el uso alternado de *Ferrum phos.* y *Kali mur.* Dos casos que se presentaron en una familia, con condiciones semejantes, fueron tratados de la misma manera con idénticos resultados. (Dr. S. Powelle Burdick).

PICADURAS DE INSECTOS.

NATRUM MUR.—Cura rápidamente. Humedeciendo la parte dolorosa y aplicando á ella *Natrum mur.*, 6ª trituración, friccionando en ese lugar. Cesa en seguida el dolor. (Schüssler).

FERRUM PHOS.—Inflamación de la piel cuando existe también fiebre, calor, dolor, latido ó enrojecimiento; granos, calor y congestión de la piel.

KALI MUR.—ACNÉ. Barros en la cara con contenido blanco espeso, causados por una perturbación funcional de las glándulas foliculares.

ECZEMA.—Crusta lactea, erupciones costrosas en la cabeza y cara de los niños pequeños. Caspa. Este es el principal remedio en alternación con *Ferrum phos.*, en los padecimientos de la piel ocasionados por la vacunación con una linfa impura. Eczema que resulta de un desarreglo en las funciones uterinas, lengua característica, seca, escamas como harina sobre la piel. Secreción albuminoide de la piel con lengua blanca. Eczema vesicular, secreciones ó contenido albuminoide.

ERUPCIONES.—Acné, pústulas, barros, etc., combinados con desarreglos del estómago, lengua blanca acompañada de perturbaciones en los períodos menstruales, secreciones de carácter sero-fibrinoso.

ERITEMA.—Después de *Ferrum phos.* si se presenta hinchazón.

HERPES ZONA.—Sarpullido, las vesículas rodean la mitad del cuerpo como un cinturón, lengua blanca, LUPUS.

VERRUGAS.—Sobre las manos, también se aplica exteriormente.

SICOSIS.—Remedio radical.

JUANETES.—Sabañones y lupus, remedio principal.

KAI PHOS.—ECZEMA. Si se acompaña de irritación nerviosa y exceso de sensibilidad. Costras grasientas con olor desagradable; secreciones de la piel, irritantes, causando dolencia en las partes enfermas, comezón con una sensación de reptación, la fricción suave es agradable, el exceso de ella causa dolor, piel escoriada, sanguinolenta, secreciones acuosas, excesivas, perspiraciones desagradables. Comezón del cuero cabelludo; occipucio dolorido como si el cabello se arrancase. Carbunclos.

SABAÑONES.—En los dedos de los pies, las manos y orejas, zumbidos y comezón dolorosa. Casos recientes, cuando no hay supuración.

PÚSTULA MALIGNA.—Ampulas y vejigas sobre todo el cuerpo, conteniendo líquido acuoso, piel seca y arrugada.

KALI SULPH.—Sequedad de la piel por supresión de enfermedad en la misma. Temor á las bebidas calientes.

ECZEMA.—Secreción de una materia delgada, amarilla, eczema suprimido repentinamente con otros síntomas correspondientes de esta droga.

ERUPCIONES.—Retrocesión violenta por un enfriamiento ó por otra causa. Estado enfermizo de las uñas, crecimiento interrumpido, la piel se descama libremente, dejando una base viscosa. Ulceras en la piel, con secreción amarilla, acuosa, en partes limitadas, con desprendimiento de epidermis.

PSORIASIS.—Se han referido casos severos de esta afección como habiendo sido curados con este remedio.

CASPA.—Escamas blancas ó amarillentas sobre el cuero cabelludo (también se emplea como un lavado), caída del cabello, el labio inferior está seco y escamoso.

«El uso interno de *Kali sulph.*, una dosis cada cuatro horas, ha curado invariablemente todos los casos de tinea capitis. Confío exclusivamente en este remedio, no usando lavatorios ó cualquiera clase de ungüentos.» (A. P. Davis). Efectos de la hiedra venenosa. Las erupciones papulosas producen escozor, ardor. Urticaria.

MAGNESIA PHOS.—Escozor producido por hacerse la barba; erupción herpética con escamas blancas. Caspa, pústulas y granos sobre el cuero cabelludo. Sarpullido parecido á las picaduras de insectos, peor alrededor de las rodillas, tobillos y codos.

NATRUM MUR.—ERUPCIONES. Con contenido claro, acuoso, vesículas pequeñas ó ampollas incoloras, el líquido que contienen es acuoso, formando dentro escaras ó costras delgadas, las que se separan para formarse prontamente de nuevo. Erupciones pustulosas en la frente. La piel de las manos, especialmente alrededor de las uñas, está seca y rajada.

ECZEMA.—Escamas blancas, erupciones con contenido acuoso que se presentan por comer demasiada cantidad de sal.

INTERTRIGO.—Padecimientos de la piel en los ni-

fios con los síntomas de secreciones acuosas, escamas blancas sobre el cuero cabelludo. Intertrigo entre los muslos y el escroto con secreción acre y escoriación.

PÉNFIGO.—Es como agua el fluido que contienen las vesículas y ampollas.

RUPIA.—Flictenas, erupciones que no son pustulosas.

SICOSIS.—Si corresponden á esta afección los síntomas con secreciones acuosas.

CASPA.—Escamas blancas sobre el cuero cabelludo.

VERRUGAS.—En las palmas de las manos.

URTICARIA.—Especialmente alrededor de las articulaciones.

HERPES ZOSTER.—Segundo remedio, las erupciones herpéticas ocurren por causa de alguna enfermedad.

Efectos producidos por las picaduras de insectos (exteriormente), verrugas en las palmas de las manos. Urticaria y erupciones miliares.

NATRUM PHOS.—Dolencia, escaldadura de la piel en los niños. Hinchazón de las glándulas sebáceas; erupciones por la vacunación. Bocio.

ECZEMA.—Con síntomas de acidez, secreciones cremosas, como la miel, costras de un color amarillo brillante. Crusta lactea alrededor de las orejas de los niños recién nacidos.

LUPUS.—Se emplea interior y exteriormente.

ERITEMA.—Roseola (alternado con *Ferrum phos*),

placas doloridas en la piel, secreción cremosa, amarilla, varicela, escozor sobre todo el cuerpo como picaduras de insectos.

NATRUM SULPH.—Escaldadura de la piel en los niños con síntomas biliosos. Sabañones.

ECZEMA.—Vesículas; las erupciones contienen una substancia amarillenta, secreciones acuosas. Escamas amarillas.

PÉNFIGO.—Ampollas ó vesículas con contenido seroso sobre todo el cuerpo.

DIVIESOS.—Conteniendo una secreción amarilla acuosa. Edema de la piel.

VERRUGAS.—Extrae el agua de la base de las verrugas y causa una contracción de las mismas.

SILICEA.—Exantema pruritoso, pequeñas pústulas llenas de linfa, que se secan pronto. Las llagas ó heridas pequeñas supuran profusamente. Ulceras fagedénicas, carbunclos. Procesos supurativos en la piel. Acné, ardores por el día. Pénfigo, zona, ragades, pústulas de color rosado. Erisipela con supuración. Los diviesos se presentan como despuntados. Pústulas malignas. Enfermedades de las uñas de los dedos, se ponen frágiles, etc.

CALCAREA PHOS.—Piel escaldada, escoriación, escozor de la piel.

ECZEMA.—Erupción de la piel, con costras amarillentas y vesículas (albuminosas, con una substancia como clara de huevo), anemia, palidez de la piel.

PECAS.—Disminuyen por el uso de este remedio.

HERPES.—Escozor agudo ó crónico, intercurrentemente.

LUPUS.—Si es una manifestación parcial de escrofulosis.

PRÚRIGO.—Prurito, desagradable escozor de la piel, que se presenta frecuentemente en los ancianos (4ª x tr.), alternándolo con *Kali phos.*

ACNÉ.—En las personas jóvenes durante la pubertad.

TRANSPIRACIÓN.—Demasiado frecuente ó excesiva, especialmente si se presenta alrededor de la cabeza, flictenas vesiculares con contenido albuminoso, tubérculos en la piel.

CALCAREA SULPH.—Tiña de los niños, si hay secreciones purulentas ó costras de pus amarillo, enconadas, etc. Granos, si la materia se forma en su parte superior, pústulas, nódulos, costras purulentas que supuran, supuración de la piel, úlceras que secretan pus ó materia saniosa. Erupciones herpéticas, escozor sobre todo de las plantas de los pies.

SABAÑONES.—Secreciones de pus.

CALCAREA FLUOR.—Grietas, hendiduras de la piel, también se usa exteriormente con vaselina, fisuras en las palmas de las manos, fisuras del ano, piel callosa, supuración con endurecimientos, bordes duros. Carbunclos.

ECZEMA.—Debido á hiperemia venosa, agravación con la humedad del tiempo, mejoría por la noche. Eczema escamosa con engrosamiento y hendiduras

de la piel. Eczema en el año como consecuencia de las hemorroides.

CASOS CLÍNICOS.

Eczema en un niño sobre las mejillas, la barba y detrás de las orejas, con piel hinchada é inflamada, que cubría unas partes induradas. Las pústulas que se desarrollaron al principio, fueron curadas en una semana por *Kali mur.* 6ª x, cada cuatro horas. (Dr. D. B. Whittier.)

El Dr. H Goullon refiere en el *Pop. Zeit. für Hom.*, Abril, 1885, un caso de sicosis curado por *Calcarea sulph.* 6ª en el que se encontraban las condiciones de pus amarillo indicadas para este remedio. El Dr. S. escribe: La Sra. S, de 24 años, de Regensburg, había estado padeciendo por varios años de liquen, é hizo uso de varias de las medicinas ya conocidas, las que no le produjeron ningún alivio. Ensayé varios remedios, y al fin la curé. Hace unos cuantos meses volvió nuevamente á verme, y el liquen era peor que nunca. No tuvo efecto mi primer remedio que apliqué anteriormente; y con otros varios, como Arsen., etc., no se mejoró. La propiné *Calcarea sulph.*, mañana y noche, en cantidades tan grandes como del tamaño de una haba, y en unos quince días la curación fué completa. (Tomado de Schüssler.)

Caso ilustrativo de la saludable acción de *Calcarea sulph.* en el pénfigo foliáceo.—*Allg. Hom. Zeit.*, 1882, p.42.

Julia C., de 3 años, erupción sobre toda la cara y en las manos, las que se mantienen cubiertas para impedir el que se rasque; ha estado sufriendo este padecimiento hace ocho meses y en todo eso tiempo ha sido sometida al mejor tratamiento alopático sin resultado alguno. La dí al principio *Kali mur.* 6ª, en solución. Este remedio fué continuado por algún tiempo, pero sin obtener resultado satisfactorio. Entonces la administré *Calcarea phos.* 6ª, en solución. Este remedio produjo un cambio hacia la mejoría en una semana, y continuándolo curó el caso en dos meses. El calor del siguiente verano pareció ocasionar una recaída, cuando volvió de nuevo á curarla el mismo remedio, y permanece bien. (C. T. M.)

Caso de enfermedad de la piel con algunos años de duración, compuesta de granitos rojos, y, cuando era muy intensa, los granos se juntaban, presentando la superficie una hinchazón roja en apariencia, destilando copiosamente un líquido fuertemente alcalino; después de esta exudación calmaba la inflamación, y la epidermis se desprendía en láminas delgadas. La erupción producía picazón y comezón intensas, y aun cuando anteriormente aliviada por el agua fría la irritación llegó á ser mejorada últimamente por el calor. Hizo uso también del *acetic acid.*, excepto sobre la cara, el cual mitigaba la comezón y enrojecimiento. Tomó el año pasado la solución de *Arsenic* de Fowler, pero sin conseguir alivio. Los ataques eran peores en el otoño y la primavera, y la erupción se localizaba ordinariamente sobre la cara, brazos y pecho. Se presentaba constipación. Después de usar *Kali sulph.* unos cuantos días, comenzó á tener diviesos y se le presentaron muchos, después de lo cual la piel estuvo mejor de lo que había estado, por algunos años; los intestinos también mejoraron.

En otro caso, mucho peor que el citado, teniendo el padecimiento veinticinco años de duración, la erupción era escamosa, ordinariamente en los brazos; aliviada por el agua caliente, desaparecía enteramente, pero volvía de nuevo un año después, cuando empleaba el mismo remedio en dosis repetidas de la 30ª, por último la 200ª, produjo el alivio. (O. Hg.) *Kali mur.* 12ª, administrado por una gonorrea en la que la secreción tenía un aspecto lechoso, no produjo efectos sensibles sobre el flujo, pero aumentó de una manera muy marcada la caspa en la cabeza, la que caía en laminitas blancas sobre el cuello de la casaca, acompañándose de escozor. (Dr. W. P. Wesselhœft, tomado de Hg)

Una señora de 20 años, rubia, y por consiguiente blanca. Consultó al que esto escribe para un eritema que padecía. Hacía dos días que las mejillas estaban hinchadas, coloradas y ardientes como el fuego, no tenía prurito, erupción ó aspereza. Una dosis de *Ferrum phos.*, *M. M. (Swan).* En treinta minutos desapareció el enrojecimiento ardiente, y no volvió á presentarse, siendo completa la curación. (Boardman, *London Homœopathic World*, 1883.)

Caso en que había padecido por ocho meses á consecuencia de los malos efectos de la hiedra venenosa (Rhus tox.) Fué tratado prime-

ramente por los remedios externos, pero ha brotado de nuevo repetidas veces bajo la forma de pequeñas vesículas herpéticas, duras, formando además una costra delgada, con escozor y algo de humedad. La erupción aparecía en la axila izquierda, alrededor del cuello y sobre la cara dorsal de ambas manos.

Tiene la enferma una sensación de languidez en el estómago y siente abrumada la cabeza, temiendo perder la razón. Ensueños muy vivos. *Sulphur*, *Rhus* y *Sepia* no dieron resultado satisfactorio. Dos dosis de *Kali sulph.* 12ª, tomadas en agua por mañana y tarde, durante cuatro días, curó el caso en cuatro semanas. (Dr. W. P. Wesselhœft, tomado de Hg.)

Caso que presentaba los siguientes síntomas: Mancha de calvicie tan grande como una moneda de á peso sobre el lado izquierdo de la cabeza. El pelo se desprendía fácilmente cuando se peinaba, tanto la cabeza como la barba. Este padecimiento vino hace un año después de la gonorrea, y ha tomado probablemente mucho yoduro de potasio. *Lycop.*, Natrum mur., no fueron de ninguna utilidad durante cuatro ó cinco meses. Después de haber tomado *Kali sulph.*, 12ª., cada tercer día un papel por tres semanas, cesó la caída del cabello, y la mancha de calvicie se cubrió de pelo. (Dr. W. P. Wesselhœft, tomado de Hg.)

Th., de 15 años, eminencias compactas de pápulas sobre la frente, la cara y ambas manos, rojas en apariencia, *picazón y ardor en el día solamente.* Las manchas en la frente son mucho más marcadas cuando se quita el sombrero. No siente absolutamente molestia en la tarde en que hace calor, ó por la noche. La erupción desapareció por completo en menos de quince días bajo la influencia de Silicea 200ª (R. A. Cooper.)

PLEURESÍA.

FERRUM PHOS.—Para la fiebre, el dolor, punzada en el costado, dificultad de la respiración y tos entrecortada. Respiración breve, oprimida y acelerada.

KALI MUR.—Es el segundo remedio cuando hay exudación plástica. Completará la curación.

NATRUM MUR.—Cuando tiene lugar la exudación serosa durante y después de su curso.

CALCAREA SULPH.—Empiema, formación de pus en la cavidad de la pleura ó en los pulmones.

CASOS CLÍNICOS.

Un muchacho de edad de 5 años, con punzada pleurítica del lado derecho, peor cuando tosía y en la inspiración profunda. Dolores reumáticos en la articulación del hombro derecho. Calor general del cuerpo, muy poca sed. *Bryon.* no obró bien. *Ferrum phos.*, 12ª, cada dos horas, alivió completamente al segundo día. Advertí una agitación anormal en el niño al día después de haber tomado *Ferr. phos.* Solicitaba salir de la cama y pretendía correr alrededor, pero estaba demasiado débil y se dejaba caer, mostrándose muy alegre y locuaz.

Una agitación semejante observé en un muchacho de 7 años, á quien había dado *Kali mur.* durante una fiebre gástrica, con gran resultado. (Dr. W. P. Wesselhœft, tomado de Hg.)

La Srita. G. R., de 20 años. Fuí llamado á la media noche para ver á esta señorita, la que me dijo estar sufriendo de un dolor en el costado. La encontré padeciendo de los síntomas comunes á un ataque de pleuresía, fiebre elevada y dolor intenso en el lado izquierdo del pecho. La dí Bryon. 3ª en agua. Llamado á la mañana siguiente, hallé la fiebre algún tanto disminuida, pero no aliviado el dolor, continué la *Bryon.* 3ª. Volví á las 4 p. m.; estaba casi lo mismo, el dolor todavía intenso; la dí *Ferrum phos.* en solución; me llamaron á las 9 p. m., la calentura había disminuido y era mucho menos el dolor. A la mañana siguiente en que fuí llamado para verla, no tenía calentura y el dolor casi había desaparecido. Continuó mejorando, y después de unos cuantos días estuvo en estado de salud. (C. T. M.)

QUEMADURAS.

KALI MUR.—Quemaduras de primer grado, así como para las de segundo. Cuando se forman flictenas, también escaldaduras por el agua hirviendo. Puede aplicarse exteriormente. Exudación blanca y pardusca sobre las soluciones de continuidad.

CALCAREA SULPH.—Cuando supuran las quemaduras.

NATRUM PHOS.—Quemaduras con supuración; también se aplica al exterior.

NATRUM MUR.—Cuando se han formado las flictenas.

APLICACIÓN.

El Dr. J. T. Frawley, de Cleveland, O., usa *Ferrum phos.* 2ª x, aplicándolo como polvo sobre las quemaduras, en las que hay mucho calor y enrojecimiento.

RAQUITIS.

CALCAREA PHOS.—En los niños delicados, ocasionada por reblandecimiento, blandura de la substancia esponjosa del hueso por falta de las moléculas de cal. Cráneo blando y delgado, con ruido de crujido cuando se oprime, oclusión tardía de las fontanelas, aspecto terroso de la tez, descolorido, cara cubierta de granos, dentición retardada, extenuación, curvatura lateral, cóndilos hinchados en ambas extremidades, espina bífida, falta de consolidación de los huesos fracturados, discracias sistemáti-

cas. Mal de Pott, niños que presentan contracturas, masas duras sobre el cráneo, diarrea durante la dentición con mucha acumulación de gases, calos-fríos, el niño no puede mantener levantada la cabeza. Sus indicaciones principales son las fontanelas que permanecen completamente abiertas, la diarrea y la extenuación del niño.

KALI PHOS.—Atrofia de los huesos, con olor pútrido de las secreciones intestinales. Indigestión con depresión nerviosa.

NATRUM MUR.—Particularmente útil cuando los muslos están notablemente enflaquecidos y la enfermedad está en sus primeros períodos, con ligera flexibilidad de los huesos. (Gilchrist).

SILICEA.—Fontanelas abiertas, cabeza demasiado grande y enflaquecimiento del resto del cuerpo, con cara pálida, abdomen hinchado, caliente; debilidad en los maleolos, sudor profuso de la cabeza y cuerpo seco, que experimenta la sensación de estar arropado; diarrea de mal olor, las deposiciones contienen alimentos sin digerir, con grande agotamiento, pero sin dolor; inflamación, hinchazón y supuración de las glándulas y los huesos, ulceración y necrosis, inflamaciones celulares, tumores, abscesos, etc., con restablecimiento tardío y consiguiente induración.

NATRUM PHOS.—Este remedio está muy recomendado para los niños escasamente alimentados, quienes están amagados de raquitis y arrojan continuamente deposiciones de color arcilloso. Dosis: 10

granos, cuatro veces al día. Raquítis con excesiva acidez.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. Knüppel, de Madgeburg, refiere (*Allg. Hom. Zeit.*, 1882, p. 4) casos de madres que anteriormente habían dado á luz niños raquíticos, y que desde que empezaron á hacer uso de Calc. phos., 3ª, en los últimos meses del embarazo, vieron nacer á los niños siguientes perfectamente sanos. Un niño, de edad de dos años, presentaba una hinchazón del muslo derecho que alcanzaba un tamaño tres veces mayor que lo natural, desde la articulación de la cadera á la rodilla, tan dura como la piedra y que ya tenía seis semanas de duración. Este mal cedió con rapidez á la acción de *Calc. fluor.* En este caso, aun el simple tacto del miembro era seguido de la más grande congoja, supuesto que el enfermo prorrumpía en gritos prolongados. (Dr. J. W. Ward, M. D.)

REUMATISMO.

Véase también Artritis.

FERRUM PHOS.—Si se tomara este remedio con constancia desde el principio, sería suficiente para curar la fiebre reumática en muchas ocasiones. El reumatismo articular agudo, que es muy doloroso, es una enfermedad febril inflamatoria en su primer período. Reumatismo agudo, cuando cualquier movimiento exalta el dolor ó tiende á aumentarlo. Reumatismo árticular, especialmente de los hombros; el dolor se extiende á la parte superior del pecho, ataca una articulación después de otra. Es el primer remedio en todo padecimiento reumático agudo, muscular, agudo ó subagudo. Agravación al mo-

verse; mejoría por el calor. Dolor de magullamiento en todas las partes del cuerpo, especialmente en las articulaciones; agravación al moverse. Lumbago, rigidez de la espalda, etc. Rigidez del cuello por un enfriamiento. "Dolores, severos especialmente por la noche, impidiendo el sueño. Rigidez marcada al primer movimiento después de la quietud." (Arndt). Agravación por el movimiento ó á la simple idea de él. Manos doloridas é hinchadas.

KALI MUR.—Segundo período de la fiebre reumática, cuando se ha presentado el exudado alrededor de las articulaciones. Este remedio hace desaparecer la hinchazón, restableciendo la estructura de las celdillas que no funcionaban, normalizando su acción excretoria y absorbente. Dolores reumáticos, gotosos, si empeoran con el movimiento y si hay una saburra blanca ó gris en la lengua. Hinchazón de las partes enfermas. Dolores que solamente se sienten durante el movimiento ó aumentan por el mismo, si *Ferrum phos.* no los ha hecho desaparecer del todo. Reumatismo crónico con hinchazón, ó cuando todos los movimientos son la causa del dolor. Capa blanca ó gris de la lengua, ó secreciones blancas.

KALI PHOS.—Reumatismo agudo y crónico con dolores que desaparecen al moverse, severos en la mañana después del reposo, y que principian levantándose de una posición sentada. Reumatismo muy doloroso, las partes se sienten tiesas al hacer los primeros esfuerzos para levantarse, mejorando pau-

latinamente, pero se aumentan por todo esfuerzo ó fatiga. Rigidez, tendencia paralítica. Dolores como por estropeo, mejorados por un ejercicio moderado.

NATRUM PHOS.—En una nota reciente dirigida al Dr. Goullon, Schüssler llama la atención sobre *Natrum phos.* como remedio para el reumatismo inflamatorio, habiéndolo usado felizmente en varios casos con resultados rápidamente curativos. Mientras que *Ferrum phos.* conviene á los casos simples, sin complicación, no puede ponerse en duda que *Natrum phos.* corresponde de una manera más directa á aquellos casos que están caracterizados por la CAPA AMARILLA DE LA LENGUA, los síntomas ácidos, ó cuando existe una tara escrofulosa. Dolores reumáticos en las articulaciones, con sudor profuso de olor agrio. Gota aguda, gota crónica, reumatismo articular crónico. *Natrum phos.* obra sobre el ácido úrico de las celdillas al que hace inofensivo. "Gran rigidez y chasquido de las articulaciones. Agravación hacia el anochecer." (Dr. J. W. Ward).

KALI SULPH.—Fiebre reumática cuando los dolores articulares son ambulantes ó erráticos. Cefalalgias reumáticas. Dolores en las articulaciones, agudos ó crónicos, que cambian aquí y allá. Reumatismo articular agudo de carácter errático, localizándose en una parte y después en otra. Reumatismo crónico de las articulaciones, LOS DOLORES EMPEORAN AL PRINCIPIO DE LA NOCHE Y EN EL AIRE CALIENTE, mejoran en el aire frío. Dolores en la espalda, nuca ó miembros. "He experimentado muchas veces *Kali*

sulph. en el reumatismo errático y he obtenido resultados muy favorables." (Dr. Schlegelman). Casos reumáticos ó neurálgicos; los enfermos se quejan de dolores de magullamiento desde las 3 a. m. hasta que se levantan.

MAGNESIA PHOS.—Reumatismo agudo de las articulaciones, para los dolores violentos, como un remedio intercurrente. Dolores espasmódicos, atormentadores, durante la fiebre reumática. "Los dolores son agravados por el tacto más ligero y mejorados por el calor y la presión fuerte." (Puhlmann).

NATRUM MUR.—Después del segundo remedio (Kali mur.) si los síntomas corresponden. Síntomas de la lengua, etc. Reumatismo crónico de las articulaciones; crujidos en las coyunturas.

NATRUM SULPH.—Dolores reumáticos, dolores y rigidez en la nuca y espalda, dolor en las articulaciones, especialmente de los dedos de los pies y los de las manos y puños, dolor en las articulaciones de la cadera AGRAVADOS CUANDO SE LEVANTA DE UN ASIENTO Ó SE INCORPORA EN LA CAMA. (Perkins).

CALCAREA PHOS.—Reumatismo, el cual es peor en la noche, agravado por el calor ó el frío, empeora en el mal tiempo (también *Ferrum phos.)*, aumenta la agravación por el cambio de estación. REUMATISMO DE LAS ARTICULACIONES CON SENSACIÓN DE FRÍO Ó ENTORPECIMIENTO, sensación de reptación en las partes que se hallan afectadas. Sensación como si anduviesen hormigas en las partes enfermas. Sensación

de torpeza y estropeo. CADA ENFRIAMIENTO OCASIONA DOLORES REUMÁTICOS EN LAS ARTICULACIONES. Dolores en las suturas. Rigidez del cuello por exponerse á la humedad; incomodidad y dolencia en los miembros. Dolores en la sincondrosis sacro-ilíaca, peor con cada cambio de tiempo.

CASOS CLÍNICOS.

La Sra. R, de 22 años de edad, había padecido por algunos años de debilidad é indigestión; tenía mucha propensión á los enfriamientos y á los dolores reumáticos, los que vagaban y mudaban alrededor de todo el cuerpo. Se encontraba generalmente peor en la tarde, en un aposento caliente, pero mejoraba al aire libre y frío. Padecía mucho de neuralgía de la cara, la que era intermitente y cambiaba de sitio, pero mejoraba en el aire fresco.

La lengua generalmente cubierta con una capa amarillenta. Había tenido muchos tumores en la piel, los que comunmente se presentaban después de un acceso reumático. *Kali sulph.* fué de un resultado tan satisfactorio que hizo acopio de la medicina para conservarla en la casa con objeto de usarla siempre si volvían de nuevo cualquiera de los síntomas antiguos. (Dr. O. A Palmer).

KALI MUR.—Este es un gran remedio, y todas sus indicaciones serán dominadas. El caso siguiente pone bien de manifiesto su potencia curativa:

El Sr. M., de 78 años, había estado enfermo por cuatro ó cinco años, y la mayor parte de sus padecimientos eran de los órganos digestivos. Tenía escaso apetito y casi siempre una capa blanca sobre la lengua. Los ojos estaban abultados y saltones. No podía comer alimentos grasos sin aumentar su padecimiento. Tenía flatulencia y dolor de estómago, con constipación y diarrea, alternativamente cada tres ó cuatro semanas.

Ha padecido de reumatismo crónico por algunos años, y muchas de sus articulaciones se conservan más ó menos hinchadas, habitualmente, y empeorando cuando las mueve. Estaba atormentado constantemente de indigestión, y vomitaba de vez en cuando, lo cual le proporcionaba alivio por algunos instantes. Después de darle las instrucciones generales respecto á sus alimentos, baños, etc., le dí *Kali mur.* 3ª x, tres pastillas cada dos horas, las que no solamente aliviaron su estado catarral en general, sino lo mejoraron completamente, de tal manera que en seis semanas pudo andar y se sintió consolado de sus padecimientos.

Me hizo saber que entre todas, era la primera medicina que le había hecho algún bien. (Dr. O. A. Palmer).

El Dr. Feichtman, de Alsó Lendra, en Hungría, refiere quince casos de reumatismo articular agudo, prontamente curados con *Ferrum phos.—Allg. Hom. Zeit.*

El Dr. Schlegelman refiere los siguientes casos:

L., de Regensburg, individuo vigoroso y sano, de 26 años, sufrió un resfriado durante un estado de perspiración y contrajo como consecuencia, reumatismo agudo de las articulaciones (fiebre reumática). Al principio fué atacado el hombro derecho, el paciente tenía dolores violentos y fiebre elevada. *Bryon.*, que era la que parecía aquí perfectamente indicada, no dió otro resultado sino hacer que el dolor á la mañana siguiente hubiese cambiado de sitio, y apareciese en la rodilla izquierda. En este estado continué por algunos días, haciendo uso de varias medicinas. La afección cambiaba de lugar, pasando de una á otra articulación. Los dolores continuaban siendo terribles tanto de día como de noche, y de una manera evidente se encontraba el enfermo muy agotado. Por fin me decidí á ensayar la medicina de Schüssler. Administré *Kali sulph.* El resultado fué muy favorable. Los dolores perdieron su carácter errático y se limitaron al hombro derecho otra vez, pero eran mucho menos violentos que antes. Bajo el uso continuado de esta medicina, desaparecieron gradualmente la fiebre y los dolores. Recobró el sueño y el apetito, y no fué de nuevo afectada ninguna otra articulación. Ocho días después de haberle dado la primera dosis de *Kali sulph.* el paciente fué dado de alta como convaleciente y ya no tuvo ninguna recaída. (Tomado de Schüssler).

El Dr. Schlegelman escribe, Enero, 1876: "Fuí atacado de reumatismo á fines de Noviembre, viajando en ferrocarril, sentado cerca de la ventana de un wagón. A la ida se afectó todo mi lado derecho, y, al regreso, los dolores eran muy severos; agravándose principalmente al hacer cualquier movimiento. *Bryon.* me alivió temporalmente. No llegué á mi residencia sino á la media noche, y el resto de ella lo pasé muy mal. *Bryon.* fué ahora de poca utilidad. A la mañana siguiente me apliqué corrientes eléctricas repetidas veces, pero sin provecho alguno. Entonces tomé un poco de polvo del *Ferrum phos.* y, como si fuera por arte mágico, los dolores desaparecieron y no han vuelto á presentarse." (Tomado de Schüssler).

En el año de 1875, el Dr. Schlegelman refería desde Regensburg: "D. A., de 20 años, dama de temperamento delicado, quien padeció bastante en su infancia de escrófula, fué atacada el invierno pasado de un severo dolor en la espalda, á consecuencia de un resfriado. El espacio comprendido entre la tercera y quinta costillas, estaba muy sensible á la presión. Temblor violento del pie derecho, y al mismo tiempo del brazo del mismo lado, presentándose en el momento en que hacía esfuerzos para mover el brazo ó extender la mano, y de esta manera se le hacía imposible toda clase de trabajo. La enferma estaba en un estado completo de depresión por esta causa, tanto más, cuanto que en su empleo tenía mucho que escribir. Dí varios remedios: *Pulsat.*, *Rhus tox.*, *Bellad.*, *Nux vom.*, *Platina*, *etc.*, todos sin resultado. Envié á la señorita al campo; su estado permaneció lo mismo. No tuvo mejor éxito la administración de nuevos remedios. Por fin creí había encontrado su remedio en *Zinc. met.*, pues no había vuelto á saber de ella durante cuatro semanas. Quedé sorprendido al encontrar á mi enferma, á quien creía curada, entrando en mi consultorio el 30 de Septiembre en un estado más tembloroso que ántes. Preguntándole por qué no me había visto anteriormente, me dijo algo embarazada, que había ido á Mariabrunn para ver á un herbolario, y usado el medicamento durante ese tiempo. El resultado, como podía verse claramente, no había sido satisfactorio, y por eso se sujetaba nuevamente á mi tratamiento. La dije que estaba en buena disposición de hacerme cargo de su enfermedad, y consulté la Terapéutica de Schüssler. Elegí de preferencia *Magnesia phos*, y no tuve motivo para arre-

pentirme de mi elección, pues desde las primeras dosis (tres veces al día, diez granos) se notó una marcada mejoría, de la que me informé el 11 de Octubre, cuando la ví de nuevo. En esta época no podía notarse ni el más leve rastro de temblores. Después de esto había escrito repetidas veces, y aun por entonces no había experimentado temblor ninguno. La curación fué completa, pues hasta la fecha había ejecutado toda clase de trabajos de aguja y había escrito mucho, sin que hubiese recidiva alguna de la enfermedad." (Tomado de Schüssler).

El Dr. Brisken fué solicitado para un caso á los ocho días después de su invasión. Todas las articulaciones estaban hinchadas, y el enfermo había estado imposibilitado de reposar tranquilo una sola noche.

En la mañana recibió para su tratamiento *Kali mur.* con tan buenos resultados que durante la próxima noche se encontró capaz de permanecer tranquilo en la cama, y en el término de doce días estuvo completamente curado. (Tomado de Schüssler).

Un caballero, de 70 años, tenía reumatismo agudo en las articulaciones del hombro y del code. Le habían sido aplicadas unas ventosas que lo pusieron en peor estado. Las articulaciones enfermas fueron envueltas en waldwolle (emplasto de lana y trementina), sin conseguir resultado alguno. No había podido permanecer en cama las últimas dos noches, porque empeoraban los dolores al acostarse. Al tercer día vino á ver al Dr. Brisken para sujetarse á su tratamiento. Después de darle *Ferrum phos.*, cesó la fiebre en unos cuantos días, administrándole en seguida *Kali mur.* En corto tiempo quedó completamente restablecido. (Tomado de Schüssler).

El Dr. Brisken hace mención de tres casos de fiebre reumática. Un caso fué el de un encuadernador, de edad regular, á quien el citado Doctor había asistido tres años antes de esta enfermedad. En aquella ocasión se obtuvo su restablecimiento en ocho ó diez semanas. El paciente fué atacado nueva vez, invadiendo la enfermedad las articulaciones de las manos y de las rodillas; recibió luego *Ferrum phos.* para tomar cada hora, y como disminuyera la fiebre, le fué administrado *Kali mur.* de la misma manera. Al quinto día estuvo en disposición de volver á su trabajo. (Tomado de Schüssler).

Eduardo B., de 12 años, había estado quejándose de malestar hacía algunos días, cuando comenzaron los dolores en todas las principales articulaciones, pero con más particularidad en los puños y en los codos, acompañados de enrojecimiento ó hinchazón, con algo de fiebre; hay más dolor al moverse y tiene que permanecer sentado ó inmóvil para sentir algún consuelo.

Le dí *Ferrum phos.* 6ª y *Kali mur.* 6ª para disolver cada uno en un vaso de agua y tomar, alternados, una cucharada cada dos horas mientras durase la fiebre; luego continuar con *Kali mur.* solamente. Estos remedios lo aliviaron presto, y estuvo libre del padecimiento en unos cuantos días. Un segundo ataque que tuvo lugar el año próximo pasado fué curado con los mismos remedios en corto espacio de tiempo. (C. T. M.)

Roberto D., de 34 años. Este enfermo habitaba en la margen del lago y entraba frecuentemente al agua, humedeciéndose á menudo mientras pescaba y cazaba. Ha tenido dolores, de cuando en cuando, por uno ó dos años. Algunas veces se localizan en una articulación y luego en otra, parecen mudar de dirección de aquí para acullá, y llegan á ser muy molestos, imposibilitándole para trabajar, y por lo mismo desea, si es posible, un remedio. Le doy *Kali sulph.* 6ª, en varios papeles, para disolver cada uno en agua y tomar una dosis cuatro veces al día. Este remedio, después de unas cuantas semanas, cura por completo su padecimiento, y no vuelve á quejarse hasta ahora desde hace un año ó más. (C. T. M.)

Mayo, 1879. J. D., individuo de 69 años, había estado padeciendo por varias semanas de dolores en los miembros, los cuales se fijaban en la pierna derecha, bajando desde la cadera hasta el tobillo, pero eran peores en las articulaciones, siendo de carácter ambulante —intermitente—algunas veces punzantes y lancinantes como relámpago, obligando al enfermo á cambiar frecuentemente de posición. El calor le proporcionaba alivio. No se encontraba capaz de abandonar la cama; estaba casi desesperado, creyendo morirse. *Magnesia phos.*, una dosis cada tres horas. La mejoría que experimentó al tomar este remedio fué rápida y marcada, pero cuando suspendía la medicina se sentía peor otra vez. Per medio de la continuación regularizada de la

Magnesia phos. se consiguió una completa curación. (Tomado de Schüssler).

Fuí solicitado para asistir á una muchacha de 12 años; había tenido, hacía algún tiempo, un ataque de fiebre reumática. Encontré á la niñita, quien se había sentido enferma el día anterior, en la cama. Estaban hinchadas las articulaciones de ambas rodillas, algún tanto rojas y muy dolorosas. Las articulaciones de las vértebras cervicales estaban afectadas, y cualquier movimiento de la posición forzada del cuello y la espalda era muy doloroso. Sus parientes creían que se le aplicaría el ácido salicílico, que ya había sido usado por ellos; pero prescribí *Ferrum phos.* y *Kali mur.* alternados cada tres horas. Al día siguiente, con grán asombro de los parientes, la fiebre y los dolores eran menos y las rodillas estaban libres por completo del dolor. Entonces ordené *Kali mur.* para darlo solo, con el objeto de combatir la hinchazón; y á la mañana siguiente al volver á verla la encontré peor de todos los síntomas. Repetí de nuevo el *Ferrum phos.*, y hubo una rápida mejoría. Pero á proporción que iban cesando los dolores y la hinchazón disminuía, se declaraban dolores espasmódicos en el abdomen, y de cuando en cuando tenía vómitos de materia biliosa. Luego que avanzaron estos últimos síntomas, ordené á la enfermita un poco de *Magnesia phos.* disuelta en agua, en frecuentes sorbos, la que hizo desaparecer todos estos síntomas en veinticuatro horas. *Ferrum phos.* y *Kali mur.* fueron continuados en dosis menos frecuentes. Seis días después de mi primera visita la enferma estuvo en disposición de abandonar la cama y se encontró completamente bien. (Dr. Schlegel).

Julio 29, 1879. Tomado de las noticias dadas por el Dr. Stens, Jr., al Congreso Médico de Dormund:

"Quiero dar cuenta de un caso de reumatismo, el cual fué curado con *Ferrum phos.* en un tiempo muy corto después de haber administrado varios de los más reputados remedios que parecían indicados. Una dama de 42 años (menstrución normal aunque escasa) había sido asistida por mí de pocos años á esta parte. Padecía desórdenes digestivos y algunas veces de ataques violentos de hemicránea.

Esta señora despertó una mañana con un violento dolor en la parte superior del brazo derecho y región del hombro del mismo lado,

siendo dicho dolor de carácter desgarrante. Había paseado la tarde anterior por un prado húmedo y mojádose los pies. Los dolores eran intensos si movía el brazo con violencia, pero moderados si ese movimiento lo verificaba con mucha lentitud. Estaba, por consiguiente, manteniéndolo en constante movimiento. Las partes afectadas estaban dolorosas al tacto. Por varias noches había sido excesiva la perspiración, y después se presentaba todas las mañanas entre dos y tres, hora en que los dolores tenían agravación. También se quejaba la enferma de dolor é impotencia en la mano derecha, lo que la impedía levantar cualquiera cosa pesada; se sentía con frecuencia cansada y tenía que acostarse. La dí nada menos que cinco remedios que me parecieron estar indicados, pero sin resultado alguno. El estado anémico de la señora y la recomendación en cierto modo del Dr. Schüssler, me hicieron pensar en el hierro. Prescribí su propia preparación de *Ferrum phos.* en tanta cantidad cuanta pudiese caber en una moneda de seis peniques para tomar por mañana y noche. El resultado fué que, después de tomar la medicina durante seis días, los dolores, con el cortejo de síntomas que los acompañaban, no volvieron, aun cuando pronto después se declaró la estación húmeda, que era cuando, generalmente, había sentido agravación en sus dolores." (Tomado de Schüssler).

La Srita. A. W., de diez años y medio, tuvo un resfriado el 1º de Enero de 1884. Al día siguiente la encontré con fiebre muy elevada, pulso 120: severos dolores en la espalda y extremidades; náusea y vómitos; las articulaciones, grandes y pequeñas, muy inflamadas; las manos, pies y miembros edematosos. No podía tolerar el que la tocasen ó moviesen. Grande sensibilidad en todas las partes del cuerpo y de los miembros. Los dolores llegaban á ser mucho más intensos por la noche, aumentando á un grado tal que sus lamentos podían oírlos todos los vecinos de la casa. Pide á gritos sin descanso el que se le dé agua fría; vomita el alimento y las bebidas casi tan pronto como las deglute. Lengua cubierta de amarillo, con sabor horrible de amargor metálico. Grande postración. Antecedentes hereditarios: reumatismo gotoso y diatesis hidrópica. Ha tenido por algún tiempo un apetito extraviado y voraz, especialmente por las cosas dulces, de las que ha abusado mucho.

TRATAMIENTO.

Después de emplear mucho tiempo durante la primera semana varios remedios, sin lograr la mejoría, resolví adherirme al sistema de Schüssler. Para la fiebre, los vómitos de alimentos y bebidas, y la inflamación, di *Ferrum phos.* 6ª x. Agravación de los dolores nocturnos, *Calcarea phos.* 6ª x; para la gota reumática, el edema, la hidropesía, la capa amarilla de la lengua con sabor amargo, *Natrum sulph.* 3ª x, como cerca de diez granos en una media copa de agua, una cucharadita cada dos horas en alternación con los dos primeros, los que eran administrados en seco y en el mismo intervalo de tiempo. Desde el principio de este tratamiento comenzó á notarse decidida mejoría, y á los catorce días de su enfermedad estuvo en estado capaz de levantarse. Antes de su enfermedad llegó á estar tan hinchada que no podía inclinarse para abotonar sus zapatos, y apenas podía cerrarle su abrigo en el cuerpo. Realmente, estaba tan mal abotonado que lo tenía abierto casi siempre. Después de su convalecencia le fué fácil inclinarse, y su abrigo le hacía un pliegue de varias pulgadas.—Dr. E. H. Holbrook, en el *Eclectic Medical Journal.*

El Dr. Sulzer, de Berlín, hace relación de un caso de fiebre y dolor violento en la articulación del hombro derecho, alta temperatura, pulso lleno y rápido, sed y falta de apetito. El hombro estaba rojo, hinchado y sensible á la presión. La compresión producida por la almohada era insoportable. *Ferrum phos.* 6ª x curó.—Allg. Hom. Zeit.

REYNAUD, ENFERMEDAD DE.

FERRUM PHOS.—El Dr. H. V. Halbert, de Chicago, refiere un caso en el que, aun cuando al principio, la amputación de las manos y de los pies parecía inevitable, se consiguió la curación y el progreso de ella bajo la constante administración de *Ferrum phos.* 6ª x.

FERRUM PHOS.—En la enfermedad de Bright, cuando hay un estado febril. Período inflamatorio de la nefritis; todo dolor de origen inflamatorio es aliviado por este remedio. «La orina tiene un sedimento mucoso profuso; la sangre es roja y cargada de glóbulos rojos.» (Arndt).

NATRUM MUR.—Tensión y calor en la región renal. Sedimento como de ladrillo molido; hematuria. El Dr. Menninger pretende que esta droga producirá una diminución en la cantidad de albúmina, y un aumento en la urea, y además un aumento también muy marcado en la cantidad de cloruros eliminados. En la enfermedad de Bright lo recomienda como un accesorio para todos los métodos reconocidos de tratamiento.

KALI MUR.—Para la hinchazón, en las enfermedades inflamatorias de los riñones. Nefritis crupal. Asma cardíaca con sensación como si el corazón y los pulmones estuviesen comprimidos. Nefritis parenquimatosa con mucha albúmina en la orina. Sedimento sucio, amarillo.

KALI PHOS.—Para los considerables desórdenes funcionales de los centros nerviosos, en alteración con *Calcarea phos.* para la albúmina. Edema pulmonar, acción intermitente del corazón.

CALCAREA PHOS.—La orina albuminosa es la indicación para el uso de este remedio en alternación con *Kali phos.* Enfermedad de Bright.

CALCAREA SULPH.—Zwingenberg curó un caso de nefritis escarlatinosa con este remedio.

KALI SULPH.—Enfermedades de los riñones después de la escarlatina. Orina albuminosa.

NATRUM PHOS.—Cálculos en los riñones.

NATRUM SULPH.—Ayuda la expulsión de los cálculos por medio del aumento de la secreción de orina.

CASOS CLINICOS.

He tenido dos casos de mal de Bright como consecuencia de la escarlatina. Se presentaban cilindros renales. Albúmina, anasarca general. Debilidad del corazón. Retinitis albuminúrica. Parecía ser extensa la destrucción del tejido, y como los casos presentaban también una profusa descamación, administré para ellos *Calcarea sulph.* 6ª x, que de una manera rápida efectuó la cura. (Dr. C. E. Tisher).

G. S., anciano de 77 años, me consultó para lo que él llamaba "pereza de sus riñones." La orina era, efectivamente, muy escasa y cargada de albúmina. El caso parecía, á primera vista, ser desesperado; el enfermo también era desmemoriado y en extremo nervioso. Le dí *Calcarea phos.* 6ª x tr., una dosis cada dos horas en alternación con *Kali phos.*

Después de seis semanas de tratamiento, la orina estuvo normal, el estado de su memoria fué algún tanto recobrado, y desde hace seis meses no ha tenido de que quejarse. Como dieta, solamente le recomendé tomase espárragos en la cantidad que pudiese á la hora de su comida, y el uso continuo de las medicinas mencionadas. (Dr. E. A. de Cailhol).

RONQUERA.

FERRUM PHOS.—Ronquera dolorosa de los cantores y oradores por esfuerzo excesivo de la voz, por la acción de tragar, por el frío y la humedad. La

ronquera se presenta al principio de la noche. Después de ésta se sigue:

KALI MUR.—Ronquera, pérdida de voz por exposición al frío. En los casos obstinados es seguido de CALCAREA SULPH.

KALI PHOS.—Ronquera con sensación de agotamiento por ejercicio exagerado de la voz, y acompañada con depresión nerviosa, ó si existe afección reumática.

KALI SULPH.—Ronquera por el frío, también por esfuerzo excesivo de los órganos vocales.

SILICEA.—Ronquera con tos irritante.

CALCAREA SULPH.—Ronquera obstinada.

SARAMPIÓN.

FERRUM PHOS.—En todos los períodos del sarampión, principalmente en el inicial y prodrómico, así como para los síntomas inflamatorios en las afecciones del pecho, ojos, nariz ú oídos.

KALI MUR.—Para la tos ronca, para todas las tumefacciones glandulares y el estado saburral de la lengua, con depósito blanco ó gris, viene á ser el segundo remedio. Para los efectos consecutivos al sarampión. Diarrea, blanquizca ó descolorida, deposiciones sueltas, lengua blanca. Sordera por hinchazón en la garganta, etc.

KALI SULPH.—Erupción suprimida, retrocesión súbita de la erupción con piel áspera y seca. Este remedio ayudará á la vuelta de la erupción.

NATRUM MUR.—Para el sarampión, si hay una secreción excesiva de lágrimas ó de saliva, como un remedio intercurrente.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. Köck, de Munich, refiere lo siguiente:

En treinta y cinco casos de sarampión que han estado bajo mi cuidado y tratamiento, el coriza y catarro bronquial fueron muy ligeros en el período prodrómico. La conjuntivitis y la intolerancia consecutiva á la luz, fueron los síntomas más prominentes. Unos cuantos días después aparecía la erupción, durando cinco ó seis, y luego desaparecía. Pero ya fuese durante el período de enrojecimiento de la erupción ó cuando comenzaba á palidecer, se presentaba hinchazón dolorosa de una ó ambas glándulas debajo del oído. Se ponían de nuevo los niños calenturientos, y estaban día y noche gritando y lamentándose. El remedio que en tales casos elegía era *Ferrum phos.*, y según la violencia de la fiebre, ordenaba una cucharada de la solución cada una ó dos horas. Lo daba en el período prodrómico, y cuando ví que probaba muy satisfactoriamente, no me fijé en administrar otro remedio. Para la tumefacción glandular, la rubicundez y adolorimiento exterior, usé la misma medicina, y mis casos tratados terminaron de una manera muy satisfactoria. (Tomado de Schüssler).

SEPTICEMIA.

KALI PHOS.—Hemorragias sépticas de sangre pútrida.

SÍFILIS.

FERRUM PHOS.—Bubón con calor, latidos ó sensibilidad.

KALI MUR.—Chancro blando, el principal entre todos los remedios (3ª x tr.) y también empleado como una loción al exterior; estado crómico de la sífilis. Para la hinchazón blanda en el bubón. Placas mucosas. Ulceración sifilítica en las encías.

KALI PHOS.—Chancro fagedénico y bubón.

KALI SULPH.—Sífilis con los síntomas característicos, como agravación al principio de la noche, etc. Sífilis crónica.

NATRUM MUR.—Sífilis crónica, exudaciones serosas, etc.

NATRUM SULPH.—Condiloma del ano, de origen sifilítico, exterior é interiormente.

SILICEA.—Sífilis crónica con supuraciones é induraciones. Afecciones cutáneas ulceradas cuando ha sido administrado el mercurio con exceso, nodosidades en la sífilis terciaria; caries y necrosis con secreción de pus de mal olor.

CALCAREA SULPH.—Para reprimir la supuración en el bubón (con Silicea). En el período crónico supurativo de la sífilis.

CALCAREA FLUOR.—Chancros duros é indurados.

CASOS CLÍNICOS.

Ulceras chancroides rodeadas por una areola congestionada, la superficie cubierta de exudación pardusca. Profundas excavaciones, más anchas en el fondo, micción dolorosa. *Kali mur* 6ª cada tres horas. Se declaró pronto la mejoría, desapareció el dolor al orinar, y las úlceras sanaron rápidamente. (F. A. Rockwith).

SUEÑO, PERTURBACIONES DEL.

MAGNESIA PHOS.—Insomnio después de agotamiento ó falta de nutrición cerebral. (J. C. Morgan). Insomnio producido por el estado nervioso y las emociones.

FERRUM PHOS.—Insomnio debido á condiciones hiperémicas. Es un admirable hipnótico; pero aquellos que comunmente duermen bien se mantienen despiertos por el uso de este remedio.

Desasosiego por la noche, ensueños acompañados de ansiedad. Somnolencia en la tarde.

KALI MUR.—Estremecimientos al más pequeño ruido. Somnolencia, sueño inquieto.

KALI PHOS.—Insomnio después de los negocios molestos, enfadosos, agitados, y por una causa generalmente nerviosa. Falta de sueño por esfuerzo excesivo. A menudo se acompaña de irritabilidad, gran desaliento y orina frecuente. El verdadero remedio restablece el poder normal estimulante en la substancia gris del sistema nervioso, y la contracción consiguiente de las arterias, que disminuye la afluencia de sangre al cerebro, y da por resultado un sueño normal reparador. Es necesario algunas veces el uso de este remedio. El sonambulismo de los niños requiere un empleo constante de este remedio. Bostezos, pandiculaciones y lasitud. Ensueños constantes de ladrones, incendios, de caídas, de fantasmas, etc. Terrores nocturnos de los niños:

despiertan de un profundo sueño, gritando con espanto. Ensueños lascivos. Sacudimiento de los músculos al quedarse dormido.

NATRUM PHOS.—Sensación de somnolencia, pero sin sueño.

KALI SULPH.—Ensueños muy ardientes.

NATRUM MUR.—El sueño excesivo es señal de un exceso de humedad en la substancia cerebral. Somnolencia; no es suficiente la duración normal del sueño. Deseo constante y excesivo de dormir. Somnolencia, la saliva destila de la boca. Falta de sueño con grande irritabilidad nerviosa, acompañada con frialdad en las piernas. Sueño desasosegado al principio y después tranquilo—estremecimientos frecuentes durante el sueño.

NATRUM SULPH.—La somnolencia se presenta frecuentemente como un síntoma precursor de la ictericia, cuando existe en la lengua una capa gris ó verde-pardusca y algunos otros síntomas biliosos. Hacen despertar los accesos de asma.

CALCAREA FLUOR.—Ensueños vivos, no desagradables; pero en los que se sueña con peligros inminentes, con muertos, con escenas en parajes y lugares nuevos, etc.

CALCAREA PHOS.—Somnolencia en las personas de edad avanzada, con pensamientos sombríos, dificultad para despertar en la mañana, bostezos y pandiculaciones constantes: los niños gritan fuertemente por la noche.

CASOS CLÍNICOS.

KALI PHOS EN EL INSOMNIO.—El Sr. S., de 51 años de edad, había estado enfermo cinco semanas de lo que los doctores llamaron fiebre tifoidea. Se había curado cerca de dos años. Había casi perdido toda su fuerza y constitución muscular, y no podía dormir aun cuando hubo agotado todos los antiguos remedios. Cuando fuí llamado para verle, estaba fatalmente alarmado y muy nervioso. Durante su enfermedad había tenido mucho dolor de cabeza y depresión de espíritu. Su lengua estaba cubierta de una capa moreno-obscura, y su aliento era muy repulsivo. Se quejaba de una "sensación de desfallecimiento" en el estómago. Las evacuaciones eran pútridas y de olor repulsivo, con flatulencia considerable.

Su fiebre no había adquirido mayor intensidad y variaba la temperatura cerca de dos grados desde la mañana hasta la noche. Di *Kali phos.* para el insomnio y la nerviosidad, y *Ferrum phos.* para la fiebre. El resultado fué que durmió bien desde luego, y deseaba saber la medicina que tomó. Hice algunos experimentos para no administrarla todos los días, y encontré que sin ella no podía tener reposo alguno. Lo que probó ser el remedio elegido propiamente para él. (Dr. O. A. Palmer).

"La Sra. C. dice que tenía un dolor severo en el occipucio y en la cabeza, y su estado era tan nervioso que no podía consentir que la hablasen; tampoco podía permanecer quieta ó conciliar el sueño. Una dosis en polvo de *Kali phos.* la alivió en unos cuantos minutos, y pudo dormir como si hubiese tomado morfina, sintiéndose adormecida todo el día que siguió á la noche en que tomó la dosis." El Dr. J. C. Nothingham prescribió el *Kali phos.*, creyendo que los síntomas eran debidos á excesos sexuales.—*Medical Advance.*

Un caballero que ha sufrido de un grande insomnio, depresión y tendencias accidentales á la manía suicida, escribía: No sé cómo daros gracias por la medicina que me habeis dado; me ha hecho muy bien.

He tomado el *Kali phos.* y una que otra ocasión algunas dosis de *Kali mur.*, usando la medicina muy exactamente, y continuaré haciéndolo así mientras me encuentre bien bajo su influencia. (Tomado de Schüssler)

La Sra. V., de 60 años, sufría mucho insomnio con grande irritabilidad nerviosa y enfriamiento de las extremidades, desde hacía tres meses. No podía calentarse de ningún modo: la frialdad no era objetiva, sino subjetiva. *Natrum mur.* 6ª trit. curó prontamente el insomnio, "apaciguó sus nervios" y también curó los otros síntomas que la afligían. (Dr. J. C. Burnett).

He tratado muchos casos de esta afección con *Magnes. phos.* 3ª x tr., en que sospechaba ser la causa de un origen nervioso. Generalmente una buena dosis de esa medicina en dos ó tres cucharadas grandes de agua, para dar en proporción de una cucharadita cada cuatro ó cinco minutos, vencía la dificultad después de haberse tomado una media docena de pequeñas cucharadas. (Dr. E. A. de Cailhol).

TESTÍCULOS, ENFERMEDADES DE LOS.

FERRUM PHOS.—Primer período de la orquitis, estados inflamatorios, dolor, etc.

KALI MUR.—Remedio radical si la afección es debida á una gonorrea suprimida. Hidrocele en los muchachitos.

CALCAREA PHOS.—Orquitis, hidrocele, algunas veces se emplea después *Natrum mur.*

CALCAREA FLUOR.—Hidropesía de los testículos. Induraciones de los mismos.

NATRUM MUR.—Edema del escroto y del prepucio (también *Natrum sulph.)* Los cordones espermáticos y los testículos están sensibles y doloridos. Dolor en los testículos. Escozor violento sobre la piel del escroto. Pérdida de pelo en el pubis.

TIFLITIS.

FERRUM PHOS.—Fiebre, inflamación, temperatura y pulso elevados, también para el dolor.

KALI MUR.—Hinchazón y exudación, dureza, etc.

KALI SULPH.—Favorece la absorción de cualquiera clase de secreciones y disminuye la tendencia á los procesos inflamatorios en el abdomen; dolores cólicos por las secreciones excesivas, las que no son expulsadas y permanecen retenidas en el apéndice. (F. D. B.)

SILICEA.—Formación de pus, abscesos, etc.

CALCAREA SULPH.—Alivia el dolor en el lado derecho de la pelvis, dando por resultado el impedir y curar la ulceración, si existe alguna en los intestinos, y previene la separación de las moléculas de esos tejidos, tonifica, hace desaparecer la distención, etc. (F. D. B.) Abscesos, pus sanioso, amarillo.

NATRUM SULPH.—Un síntoma característico es el cólico flatulento, que da principio en la región de la ingle derecha. Sensibilidad y distención con tendencia á la perforación. Entorpecimiento de los intestinos y estados biliosos en general, que algunas veces aumentan con exceso ó predisponen para este padecimiento. (Dr. F. D. Bittinger). "Dolor obtuso en la región ileocecal derecha. Gases que cambian de lugar. Sensibilidad á la presión y lengua saburral. (Dr. J. W. Ward). Vómitos, que son persistentes.

CASOS CLÍNICOS.

El caso siguiente, proporcionado por el Dr. I. E. Nicholson, de Oakland, California, viene á poner de una manera tan admirablemente manifiesta la acción de estos remedios en la tiflitis, que es relatado

por completo tal como ha sido proporcionada por el citado Doctor:

"Fuí solicitado en la mañana del 14 de Abril, 1887, para asistir al Sr. E. K., joven de 22 años, con tendencia hereditaria á la tisis pulmonar, quien residía en Connecticut, y abandonó ese lugar viniendo á radicarse á nuestra ciudad para provecho de su salud, y lo encontré sufriendo de un dolor desgarrador en la región iliaca derecha. Había sido atacado repentinamente con este dolor á las 2 A. M., y vomitado varias veces antes de que yo lo viese.

Por medio de un examen detenido hallé un tumor en la fosa iliaca derecha, tan sensible al tacto, que no podía tolerar aun el peso de las ropas de la cama. Había tenido evacuaciones intestinales dos veces en unas cuantas horas. Supe que había tomado de un pastel de picadillo en la comida del día anterior, y que había expulsado algunas semillas de grosella en una evacuación. No podía dudarse nada respecto del diagnóstico—tiflitis—y que alguna de las semillas de la grosella era lo que daba lugar al *casus mali*. Su temperatura era de 103 F., y el pulso á 120. En un espacio de varias pulgadas, el tumor del vientre era tan duro como una roca, poniendo de manifiesto una gran cantidad de infiltración. En seguida le administró *Ferrum phos.* y *Kali mur.* (6ª x en trit.) para tomar en alternación cada media hora, día y noche; se le aplicaron constantemente cataplasmas de linaza, tan calientes como podían tolerarse para mitigar el dolor. Al cabo de treinta y seis horas su temperatura había descendido hasta 100 F., y el pulso á 90. Este tratamiento fué continuado sin interrupción, y los síntomas inflamatorios mejoraron regularmente, disminuyendo de un modo gradual el tamaño del tumor. Al terminar una semana, la temperatura y el pulso llegaron á ser normales, el tumor había enteramente desaparecido, el vientre estaba blando y sólo quedaba alguna sensibilidad. No tomó otras medicinas.

El resultado que se obtuvo en este caso es, según creo, extraordinario, puesto que en esta clase de casos el pronóstico es siempre desfavorable, y el crédito de él puede claramente atribuirse al *Hierro* y la *Potasa*: el uno haciendo desaparecer la inflamación, la otra, produciendo la absorción de la infiltración, efectuando de esta manera la resolución y haciendo abortar la peritiflitis y la consiguiente supuración. El Dr. Burdick, de Oakland, y el Dr. Brigham, de San Fran-

cisco, fueron llamados en consulta, y ambos estuvieron de acuerdo conmigo respecto á la enfermedad, y conformes en el tratamiento. No tenemos medicina que iguale al mérito de *Ferrum phos.* como un remedio para la fiebre, sea idiopática ó sintomática, y nada mejor que *Kali mur.* para producir la absorción de las infiltraciones."

Calcarea fluor 3ª x absorbió rápidamente un tumor indurado y sensitivo, extendiéndose desde el ciego hasta el borde inferior del hígado.

TIFO.

FERRUM PHOS.—En el primer período, en alternación con *Kali phos.*

KALI MUR.—Para la constipación, evacuaciones de color claro.

KALI PHOS.—Fiebre maligna, fiebre pútrida, fiebre de los campamentos, fiebre nerviosa ó cerebral, fiebre de las haciendas. El principal remedio para la lengua obscura, las petequias, el insomnio, la función anormal del cerebro, estupor, delirio.

NATRUM MUR.—En el tifo, cuando son muy grandes el estupor y el insomnio.

NATRUM PHOS.—Cuando la lengua presenta una capa amarillo brillante, cremosa, húmeda.

TISIS PULMONAR.

CALCAREA PHOS.—Tisis incipiente en los enfermos anémicos, sudor profuso, especialmente alrededor del cuello y la cabeza. Para disminuir el eflaquecimiento, dad también crema, koumiss (leche de burra en fermentación), dosis pequeñas de aceite de

hígado de bacalao y alimentos que contengan carbono. Tos crónica de los tísicos. Sudores nocturnos que se presentan en la tisis con extremidades frías. En la diarrea y en sus formas crónicas pero con poca fiebre. Ronquera, suspiros involuntarios, ataques de sofocación. Tos con dolencia y sequedad de la garganta, dolor obtuso en el pecho. El padecimiento alterna ó se asocia con fístula anal.

CALCAREA SULPH.—Esputos purulentos, saniosos, mezclados con sangre. En las toses de los tísicos con expectoración amarillo-verdosa, tos estertorosa.

KALI PHOS.—Debilidad de la respiración al menor movimiento, es pútrido el esputo.

KALI MUR.—Expectoración blanca y espesa.

NATRUM SULPH.—Constitución hidrogenoide. Tisis mucosa. Tos con esputo muco-purulento. Está afectado el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Sensación de desfallecimiento en el pecho.

NATRUM MUR.—Malestar general después del menor esfuerzo, somnolencia durante el día, desasosiego por la noche. Tos periódica espasmódica con estertor en el pecho y expectoración de esputo sanguinolento, peor al principio de la noche, después de acostarse, congestión á la cabeza con bochorno héctico, coriza crónica con pérdida total del gusto y del olfato. El paciente siempre empeora cerca de la playa. Acumulación de mucus transparente en la laringe por la mañana.

La deglución en vacío produce tos.

SILICEA.—Secreción profusa de pus fétido, pa-

roxismos nocturnos de tos con cosquilleo en la fosa supraesternal, depósitos tuberculosos sobre la piel, manifestándose bajo la forma de tumores endurecidos. Enflaquecimiento, abundantes sudores nocturnos. Sudor de los pies excesivamente desagradable. Considerable constipación; el recto carece del poder para expulsar las materias fecales, y por consiguiente retroceden después de la evacuación parcial. El paciente está siempre frío, especialmente de los pies. Mucha postración y tos floja, ruidosa, con expectoración copiosa de pus espeso, amarillo-verdoso. Este remedio abraza la mayor parte de los síntomas que pertenecen á la discracia tísica; en consecuencia, es un remedio de mérito para el estado constitucional en los casos congénitos ó hereditarios. El Dr. Holcombe ha usado la 600ª potencia con admirables efectos curativos en los últimos períodos de la tisis.

FERRUM PHOS.—Respiración corta, oprimida y acelerada, acompañada de sensación de calor y reacción febril. Ronquera por esfuerzo excesivo de la voz. La tos empeora al aire libre. Hemoptisis profusa, sangre espumosa, de color rojo brillante; epistaxis. Tisis florida. «Si el paciente se resfría, se pone en estado de postración y tiene una expectoración estríada de sangre, este remedio, aun empleado á la 30ª potencia, calmará prontamente la congestión pulmonar.» (F.)

«Tisis laríngea que invade los cartílagos aritenoides piriformes, tos de cosquilleo seca y penetran-

te por irritación laríngea y traqueal, acompañada por hemorragias ligeras ó aun severas, bronquiales ó laríngeas.» (Ivins.)

CASOS CLÍNICOS.

El Sr. C., de 30 años, de un temperamento bilioso, sanguíneo, más bien de tez obscura, cinco pies diez pulgadas de alto, pesando en el estado de salud 166 libras, de familia de tísicos, dos hermanas y un hermano habían ya sucumbido, dejando á uno de ellos todavía gozando de una salud soportable. Tuvo varias hemoptisis en el verano durante la época de la recolección del heno, y desmejoró continuamente desde aquel tiempo. Lo ví al siguiente mes de Abril; pasó por las manos de varios médicos, y en esa época estaba en tan malas condiciones que su médico le dijo que no podía vivir seis semanas, y tal fué mi opinión al verle. Había una *gran caverna* en el *pulmón derecho*, correspondiendo al segundo espacio intercostal, á la distancia de tres pulgadas á la derecha del esternón; tenía abundantes estertores en el bronquio izquierdo, con indicios evidentes de desgarramiento de la estructura parenquimatosa, y lesiones cavernosas en ese lugar, el esputo también era muy copioso y completamente *purulento;* se presentaba ya un marcado olor *cadavérico*, bastante mohoso y desagradable, propio del estado septicémico; no tenía apetito y se incorporaba difícilmente en su lecho; la piel tenía al tacto una sensación *fría*, *viscosa*, y se encontraba completamente empapado en *sudores nocturnos*. El caso se hacía notar por la falta de *calor vital;* realmente, era tan poco satisfactorio que me resistí á las súplicas de su hermano para visitarlo otra vez durante una semana; vivía á una distancia de cuarenta millas.

Estuvo tomando una dósis de *Silicea* 200ª, cada *dos* noches, con *Sac. lac.*, y recomendó se me diese aviso por correo al cabo de una semana. Había estado hasta el presente excesivamente extenuado, con sus *sudores nocturnos* y con la *tos*, que empeoraba *con el movimiento*. El primer correo me trajo la noticia de que la medicina obró como por encanto y deseaba más de ella; se la remití para que tomase una

dosis de *Silicea* dos veces por semana, y así lo traté hasta Junio, que fué cuando me hizo una visita. El pulmón izquierdo parecía estar desembarazado, los sudores nocturnos no le habían molestado por más tiempo, el apetito era bueno, fué regularmente ganando en carnes y en vigor. No obstante, quedaban todavía vestigios de la vómica en el pulmón derecho, la que al presente era mucho más pequeña y secretando sólo una escasa cantidad de materia muco-purulenta; se le proporcionó mayor cantidad de medicina y regresó á su residencia, y por mediados de Julio estuvo en su máquina de segar. El paciente se encontró lleno de vida por cuatro años después y gozando espléndida salud, y sin embargo no sé cómo se encuentre hoy día; nadie podía haberse sorprendido más que yo, por estos resultados. Nos habíamos engañado todos? Tres buenos médicos de la escuela principal de medicina estuvieron de acuerdo acerca del diagnóstico, y pienso que no hay un dato en qué fundarse para dudar. El caso es excepcional, lo admitimos; pero está lleno de sugestiones. (G. N. B., en la *Brigham's Phthisis*).

La misma excelente obra, en la página 193, contiene la historia de otro caso de tisis, en el que fué *Kali mur.* el remedio.

Caso de una señora que había estado postrada en cama por nueve meses. Mrs. McH. fué abandonada por cuatro doctores como si fuera inútil para ella todo tratamiento médico. El diagnóstico de los profesores estaba concebido así: Enfermedad de ambos pulmones, especialmente del derecho. El corazón está muy dilatado, principalmente la cavidad derecha. La enfermedad del pulmón reconocía como causa un romadizo descuidado. Cuando su caso fué sometido al tratamiento por el método bioquímico, hace cuatro años, estaba también sufriendo de hidropesía. En ese periódo de la enfermedad, vino á ponerse bajo la acción del nuevo tratamiento, necesitando algunas veces una hora ó más antes de que pudiese encontrar una cómoda posición para descansar. Prefería pasar la noche en el sofá por no exponerse á la fatiga que le producía el ir á la cama. La tos y la expectoración eran de muy mal carácter, la respiración sumamente corta y la palpitación constante. No sabía lo que era pasar una buena noche, y rara vez dormía. Sometiéndose pacientemente á los remedios del Dr. Schüssler se restableció mucho, sus pulmones fueron curados de una manera

asombrosa, y casi desapareció la dilatación del corazón. Vive al presente en estado relativamente de perfecta salud, de manera que estuvo capaz de asistir á su esposo durante una grave enfermedad en la que era necesario velarlo por la noche. Para asegurarla de toda inquietud, se hizo un diagnóstico. El Dr. H., un especialista, estuvo de acuerdo en que el estado de su pulmón derecho, del que una gran parte estaba perdida, ahora se encontraba perfectamente curado, y la dilatación del corazón casi ha desaparecido enteramente. (Tomado de Schüssler).

El Dr. Snader acentúa la importancia de *Silicea* en los sudores nocturnos. De sesenta y dos casos tratados, en cuarenta y tres fué detenida la perspiración, y en trece disminuida. Las potencias usadas fueron de la 3ª á la 30ª, y el citado Dr. Snader cree que las potencias más altas, regla general, obran mejor.

TONSILITIS.

FERRUM PHOS.—Tonsilas rojas é inflamadas, dolorosas al tragar. Este remedio se administra sólo al principio.

KALI MUR.—El segundo remedio, tan pronto como hay alguna hinchazón de la garganta. Garganta con manchas de color blanco ó gris. Amigdalitis aguda ó crónica con mucha hinchazón.

KALI PHOS.—Amígdalas abultadas y adoloridas, con un depósito sobre ellas blanco, sólido, como membrana diftérica.

NATRUM PHOS.—Catarro de las tonsilas con una exudación teñida de amarillo brillante, por un estado ácido del estómago. Hinchazón crónica de las amígdalas.

CALCAREA PHOS.—Hinchazón crónica de las amíg-

dalas causando dolor al abrir la boca, sordera y dificultad de la deglución; remedio intercurrente. Voz ronca. «En la hipertrofia esponjosa de las amígdalas en los niños, hemos encontrado en la 2ª x trituración por medio del uso fiel y prolongado de la droga que en muchos casos produce una diminución marcada en el tamaño de las tonsilas.» (D. H. C. French).

CALCAREA SULPH.—Tonsilitis, último período, cuando supuran ó se forman abscesos.

NATRUM MUR.—Uvulitis; en este lugar son las celdillas mucosas el asiento de la enfermedad. Por esta razón no es el remedio *Kali mur.*, sino *Natrum mur.* La hipertrofia crónica de las amígdalas ha sido curada por el remedio empleado á la 30ª potencia.

MAGNESIA PHOS.—La tonsilitis es peor del lado derecho. Garganta muy roja é hinchada. El enfermo está friolento y cansado, tiene dolores de cabeza y se encuentra abochornado.

CASOS CLÍNICOS.

He usado *Natrum mur.* repetidamente, y con especialidad en los casos obstinados de salivación, con excelentes resultados. Un caso en particular fué curado con extraordinaria rapidez por este remedio. Una señorita de 20 años, que padecía de inflamación severa de las amígdalas, de manera que apenas podía tragar la leche ó el agua, había recibido de mi mano una preparación de mercurio. La inflamación de las amígdalas se redujo muy prontamente, pero comenzó otra enfermedad—á saber, violenta salivación. Las encías estaban descarnadas, sangrando fácilmente y sosteniendo á los dientes por la parte

de atrás, y éstos se encontraban flojos en sus alveolos. Pensé curar esta afección también con *Mercur.*, con el que había frecuentemente antes salido con bien en tales casos, pero por la continuación de este remedio solamente aumentó la enfermedad. Tuve conocimiento por la paciente que en el verano anterior había estado enferma en N. y el doctor le administró bastante calomel, el que produjo horrorosa y pro longada salivación. Temía que la enfermedad llegase á ser de nuevo muy enfadosa, tanto como lo había sido en N. Suspendí entonces el *Mercurio* y ordené *Natrum mur.*, una dosis del tamaño de una judía cada dos horas. El éxito sobrepujó en sumo grado mis fundadas esperanzas. En veinticuatro horas la hinchazón de las glándulas había disminuido de un modo evidente, y en tres días se efectuó una curación completa. (Tomado de Schüssler).

Aumento de volumen de las amígdalas con sordera parcial por el Dr. R. T. Cooper. J. D., de 5 años, muchacho delgado, de aspecto delicado, muy alto para su edad, padeció por dos años de sordera parcial, la que ha aumentado mucho desde que vino á Southamton, hace dos meses. Su madre estaba asustada, temiendo que se volviera sordo de un modo incurable. Al principio no quería, ó más bien no podía permitirme, por el excesivo dolor que le ocasionaba, examinar su garganta (estaba entonces sufriendo de una exacerbación); pero era evidente, por la hinchazón exterior y la historia de la enfermedad, la causa verdadera donde residía la diseca. La relación de su madre me hizo saber que fué vacunado á los tres años de edad, que después de esto sepresentaron muchos desórdenes constitucionales, la erupción se calmó, dejando las amígdalas en su presente estado de hinchazón. Los síntomas eran peores después de exponerse al aire libre y en tiempo húmedo. *Calcarea phos.* tuvo un inmediato efecto saludable, de manera que á los tres días pudo examinarse la garganta. Ambas amígdalas estaban rojas é hinchadas y formaban casi un dique completo entre la boca y la garganta. En tres semanas la audición se restableció enteramente y se calmó la hinchazón.—"*Monthly Homeopathic Review*," Septiembre 1897.

El Dr. W. tuvo un ataque severo de amigdalitis, interesando ambas tonsilas, las que estaban muy voluminosas, siendo causa de una deglución difícil y dolorosa. Temperatura 102 F; pulso, 130.; el pa-

ciente excesivamente nervioso. Dí *Ferrum phos.* 6ª x, y *Kali phos.* 6ª x, en alternación, cada quince minutos.

Ví al enfermo á las seis horas y todos los síntomas estaban muy agravados, entonces administré *Kali mur.* 6ª x en vez de *Kali phos.*, é insistí con *Ferrum.* A la mañana siguiente encontré que el paciente había pasado una noche penosa, y entonces administré *Ferrum phos.* 12ª x y *Kali mur.* 12ª x; á las seis horas lo hallé muy mejorado, menos dolor, menos hinchazón, temperatura 100, pulso 100; continuó los remedios y en dos días el paciente estuvo fuera de peligro, y no tuvo lugar la supuración. Este fué realmente uno de esos casos de esquinencia, que por lo común llegan al período de supuración y recorren su curso en siete días, á pesar de todo lo que podamos hacer, siendo para mí un caso nunca visto. La agravación causada por los remedios propinados á la 6ª potencia y la mejoría que tuvo lugar después de la administración de los mismos á la 12ª x, fueron hechos interesantes. El paciente se dió cuenta de que había podido sentir los efectos de los últimos remedios á través de todo el cuerpo, calmando y aliviando la irritabilidad nerviosa, inmediatamente después de cada dosis. (Dr. G. H. Martín).

Una tarde se presentó en mi consultorio un caballero trayendo consigo á su hijo, de unos 8 ó 10 años de edad. Cuando estuvo delante de mí, observé que era excesivamente laboriosa su respiración, y que su pecho se dilataba como el de un pollo. Examiné su garganta, y encontré ambas amígdalas inflamadas y tan voluminosas que apenas había espacio bastante entre ellas para introducir una tira de papel. Estába ligeramente calenturiento, y la lengua cubierta de blanco. Preparé algunos papeles de *Kali mur.* 200ª (B. L. T.) y ordené se los diesen en seco cada media hora por el espacio de tres horas, y luego cada hora en el transcurso de la noche. La mañana siguiente, muy temprano, fuí á verle y me admiré de encontrarle sentado en la cama, completamente animado y respirando con naturalidad. Su pecho había adquirido una forma más normal, y las amígdalas estaban considerablemente disminuidas en tamaño. Fué continuado el mismo remedio por todo el día siguiente, y á la próxima mañana el chicuelo salió á recibirme en la sala, relativamente bien. (E. H. H.)

FERRUM PHOS.—Tos aguda, dolorosa, corta, acompañada de cosquilleo. Tos de cosquilleo por irritación de la tráquea, breve, con dolor. Tos espasmódica, seca, corta, con sensación de dolencia en los pulmones, no hay expectoración, tos dura y seca con dolencia por enfriamiento. Tos, con estertores mucosos en el pecho, peor por la noche.

KALI MUR.—Tos ruidosa que proviene del estómago, estrepitosa, con lengua de color gris blanquecino. La tos breve, aguda y espasmódica, semejante á la convulsiva, reclama este remedio. Tos ruidosa en que parecen los ojos como fuera de las órbitas y capa gris ó blanca de la lengua. Tos aspera como la del crup. El niño se agarra la garganta durante el acceso de la tos. Ronquera persistente, como la del crup. Tos con flema espesa, lechosa, glutinosa, albuminosa. Tos en la consunción con expectoración espesa, blanca como la leche, ó capa blanca de la lengua.

KALI PHOS.—Tos por irritación en la tráquea, la que se siente escoriada. Expectoración amarilla, espesa, salada y fétida, pecho adolorido.

KALI SULPH.—Tos con expectoración amarilla ó de substancia acuosa. Empeora en una habitación caliente ó en la tarde. El mucus se desliza hacia atrás y generalmente es deglutido; tos áspera, ronca como la del crup, sensación de molestia en la faringe.

MAGNESIA PHOS.—Verdadera tos espasmódica que tiene lugar en accesos, paroxismos; tos espasmódica por la noche, sin expectoración, sobre todo con dificultad de estar acostado. Tos ferina. Los enfermos atribuyen el origen del espasmo á la fosa supra-esternal. Los pulmones están adoloridos por el esfuerzo de toser. En la tos seca de los niños nerviosos se tendrá siempre en cuenta este remedio.

CALCAREA FLUOR.—Tos con expectoración de masas mucosas delgadas, amarillas, tenaces. Tos que produce cosquilleo é irritación en la garganta al acostarse, por prolongación de la úvula, ó por destilamiento del moco á la parte posterior de la garganta.

CALCAREA PHOS.—Tos con expectoración de substancia albuminosa, no acuosa. En la tos de los que padecen consunción, como un remedio intercurrente. Tos sofocativa en los niños, se mejora acostándolos.

CALCAREA SULPH.—Tos con esputos saniosos, acuosos.

NATRUM MUR.—Tos con exceso de secreciones acuosas. En la consunción con esputos acuosos, de sabor salado, tos de invierno. Punzadas en el hígado con la tos. Tos corta, seca, día y noche, por irritación que se siente en la boca del estómago.

NATRUM SULPH.—Tos con una sensación de desfallecimiento en el pecho. Expectoración moco-purulenta, espesa, filamentosa y verde-amarillenta; es

menester oprimirse el pecho para aliviar el adoloramiento y la debilidad.

SILICEA.—TOS PROVOCADA POR LAS BEBIDAS FRÍAS. La dolencia y la debilidad de pecho son aliviadas por el aire húmedo, caliente. Tos laríngea, se presenta por la mañana con expectoración tenaz. Disp-nea al inclinarse ó al echarse de espaldas. Expectoración profusa de pus verde-amarillento con sabor de grasa y olor desagradable. Tos nocturna sofocativa. (Lilienthal).

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. J. A. Biegler, hace relación en el *Trans. J. H. A.* 1888, de un caso de laringitis sub-aguda curado por *Kali phos.* 30ª. La prescripción se hizo en virtud de "un caso desesperado," porque vino fuera de tiempo á someterse al tratamiento, con falta de fuerzas, semblante pálido, cianosis, etc. Elocución lenta, haciéndose inarticulada, parálisis de reptación, y teniendo en cuenta lo que Grauvogl dice á este respecto: "Sabemos que los procesos de oxidación, los cambios de gases en la respiración y otras transformaciones químicas en la sangre, son llevadas á cabo por la presencia de *Kali phos.*"

El Dr. F. W. Southworth refiere dos casos de tos espasmódica, aliviados prontamente por *Magnesia phos.* 4ª x y 6ª x respectivamente, siendo las principales indicaciones su carácter espasmódico, la agravación al acostarse y en la noche, lo mismo que al respirar aire frío; mejoría al incorporarse en la cama; opresión del pecho. En el segundo caso se escapaba un chorro de orina cuando tosía.

El Dr. Fisher fué consultado por una señora (embarazada) que sufría de una tos, la cual le ocasionaba grande incomodidad, pues con cada acceso había emisión de orina. *Ferrum phos.* la curó muy rápidamente. Poco tiempo después la señora, que continuaba en el mismo estado, fué de nuevo molestada con los accesos de tos; también esta

vez *Ferrum phos.* la curó tan prontamente como antes. (Tomado de Schüssler).

TOS FERINA.

FERRUM PHOS.—Tos convulsiva con vómito de sangre. Período catarral inflamatorio.

KALI MUR.—Si hay capa blanca sobre la lengua y una expectoración blanca espesa; tos corta, espasmódica.

NATRUM MUR.—Cuando la mucosidad es espumosa, clara y filamentosa.

KALI PHOS.—Tos ferina en los niños muy nerviosos, tímidos, sensibles (intercurrente). También cuando se presenta el agotamiento.

KALI SULPH.—Tos ferina, expectoración viscosa, de color completamente amarillo.

MAGNESIA PHOS.—Coqueluche, que principia como un resfriado ordinario, accesos convulsivos de tos nerviosa, concluyendo con un grito. Dése con constancia este remedio.

CALCAREA PHOS.—Coqueluche que se presenta en las personas de constitución endeble ó en la época de la dentición de los niños, y en los casos rebeldes con enflaquecimiento

CASOS CLÍNICOS.

Mi experiencia en el tratamiento de la tos ferina, mientras no está desarrollada. ha sido para mí muy satisfactorio, especialmente desde que adopté el tratamiento bio-químico de Schüssler. Bajo este trata

miento la tos puede ser modificada, los paroxismos disminuyen en severidad y frecuencia, y la duración de la enfermedad materialmente muy abreviada.

El tratamiento, en substancia, es como sigue: En los períodos más anticipados de la enfermedad, se da *Ferrum phos.* por los síntomas febriles, alternado con *Kali mur.* por la expectoración fibrinosa. Si la enfermedad ha llegado al período en que la tos adquiere el carácter espasmódico, terminando con el grito característico de origen nervioso, entonces *Magnesia phos.* es el remedio *por excelencia*, y como este período llega por lo regular antes que sean solicitados los servicios del doctor, formará este medicamento la base de tratamiento en nueve décimos de todos los casos. Realmente un frasquito de este remedio con indicaciones para administrar una cantidad al tamaño de un guisante en agua caliente cada cuatro horas regularmente y repetido siempre que venga un paroxismo de tos, frecuentemente constituye por completo todo el tratamiento.

En casos graves se han usado otros remedios conforme á las indicaciones; el carácter de la expectoración sirve de guía en la elección del remedio.

Calcarea phos. es usada frecuentemente para completar el tratamiento como un restaurador general, ó cuando parecen ser deficientes las sales de cal en el organismo.

Por lo regular uso la 6ª x de estos remedios, aun cuando algunas veces el tratamiento reclama una de las más bajas. Nunca he usado las potencias más altas.

La dosis será igual á la recomendada arriba para *Magnesia phos.* Muy á menudo, por cierto, generalmente, aumento la cantidad prescrita para un vaso grande de agua, y doy una cucharadita de la solución en una dosis. (Dr. R. F. Beane, Eldorado, O.)

El Dr. J. T. Frawley, de Cleveland, Ohio, hace relación de un caso de tos ferina, el que había desarrollado una temperatura elevada y síntomas manifiestos que indicaban la presencia de neumonía, curado con *Kali mur.* 3ª x en agua caliente; su acción fué pronta en reprimir los síntomas agudos.

Un niño, de 18 meses, en el período de tos ferina, con los labios y la boca cubiertos de ampollas; deposiciones de mal olor, negras, del-

gadas, cinco veces al día; abdomen duro y timpánico, agotado, hasta no quedar de él más que su sombra y abandonado á la muerte por los padres y los médicos, restableció completamente con *Kali sulph.* (Dr. B. C. Knerr).

Caso en el cual se dió *Kali sulph.* para la coqueluche; la que mejoró inmediatamente. Al segundo día, después de tomar la medicina, se quejó el enfermo de rigidez del cuello. La cabeza inclinada hacia la izquierda, y levantado el hombro del mismo lado. Dolor considerable al mover la cabeza de uno á otro lado ó hacia atrás, pero podía moverla adelante sin dolor. Este estado continuó siete días. (Dr. W. P. Vesselheft).

MAGNES. PHOS. PARA LA COQUELUCHE.—En la Primavera de 1881, cuando reinaba una epidemia de tos ferina entre los niños del lugar, un niñito de diez meses fué abandonado como incurable, por el doctor de la familia. Tuve noticia de esto por el padre del niño, que estaba con gran pesadumbre. Refirió que los espasmos, los cuales ocurrían cerca de diez veces en el transcurso del día, eran tan intensos, que la carita llegaba á ponérsele completamente lívida, azul é hinchada. Desde luego le dí *Magnes. phos.* Una simple dosis del polvo moderó los espasmos de tal manera, que sólo volvieron á presentarse una que otra vez, y los ataques fueron muy moderados. Cinco días más tarde administré un poco de *Kali phos.*, pero sin resultado satisfactorio; luego *Calcarea phos.*, y tampoco produjo buen efecto. Como los paroxismos aumentaban, empeorando únicamente por falta de *Magnes. phos.*, la dispuse para dársela de nuevo, y en muy corto tiempo los espasmos y el grito desaparecieron y el niño se restableció rápidamente. (Tomado del Rundschau).

TRAUMATISMOS.

FERRUM PHOS.—Este es el primer remedio en las contusiones y en las fracturas que acompañan á las lesiones de las partes blandas. El primer remedio en las heridas por instrumento cortante, caídas ó golpes, heridas recientes y en los esguinces. Pre-

viene el dolor, la congestión, la hinchazón ó el estado febril. Puede también usarse exteriormente. Tensiones violentas de los ligamentos ó tendones. Tenalgía crepitante. El Dr. Sara J. Allen, de Charlotte, Mich., hace relación de resultados lisonjeros con el uso de *Ferrum phos.* 6ª x, en los traumatismos. Prescríbase según las indicaciones arriba mencionadas.

KALI MUR.—Hinchazón de las partes contusas; heridas cortantes con hinchazón; el segundo remedio en los esguinces, granulaciones exuberantes, carnosidades fungosas. «Para hacer desaparecer las equimosis que quedan después de una contusión he hallado eficaz el uso de *Kali mur.* mezclado con manteca de cacao.» (E. H. H.)

CALCAREA SULPH.—Contusiones, cortadas, heridas, etc.; cuando se han descuidado y comienza la supuración, las heridas secretan pus.

CALCAREA FLUOR.—Contusiones de los huesos, tibias, etc.

SILICEA.—Casos de tramautismos descuidados, enconados y amenazando supuración. Cuando las heridas producen un pus espeso, amarillo; también para la supuración profundamente localizada. Este remedio se dará primero, después *Calcarea sulph.*

NATRUM SULPH.—Traumatismos del cráneo y consecuencias que de ellos se originan. Trastornos mentales debidos á un choque ó golpe sobre la cabeza. (Kent).

CASOS CLÍNICOS.

Un joven fué lanzado con violencia de una plataforma en el departamento de calderas. Recibió un golpe en la cabeza, y á causa de esto se le presentaron algunos accesos convulsivos, de los que estuvo sufriendo por cinco ó seis meses. Estaba muy irritable, deseando morir. Sus ataques lo conducían al frenesí. Nunca sabía cuándo llegaban. Eran de carácter epiletiforme. Tenía dolor constante en la cabeza; mucha fotofobia. Se le administró *Natrum sulph.* y la primera dosis lo curó. Desde entonces nunca ha vuelto á tener dolor de cabeza; no ha tenido más trastornos mentales ni más accesos. (Prof. J. C. Kent, *Medical Advantics*, Sept., 1886).

En Septiembre, el último Otoño, estuve en las montañas de Escocia. La lechera de un arrendatario de allí me habló diciendo que se había herido su dedo pulgar mientras afilaba una hoz. El caso ponía de manifiesto lo siguiente: Todo el pulgar de la mano izquierda estaba hinchado y de un color rojo azulado y muy doloroso cuando se le tocaba, excesivamente inflamado, y había una pequeña herida en uno de los extensores, arriba de la articulación de la uña. La presión daba lugar á la salida de una secreción amarillo-blanquizca, mezclada con fragmentos blancos. Se podía producir fácilmente la dislocación de ambas falanges, percibiéndose un sonido peculiar que había observado antes en semejantes casos. Este hecho me decidió á darle *Calcarea fluor.* El médico del lugar, á quien había consultado el arrendatario, declaró que la amputación era el sólo recurso que podía emplearse para el caso. La enferma tomó *Calcarea fluor.*; y algún tiempo después el arrendatario tuvo ocasión de verme y entonces me informó de que el dedo pulgar de su sirviente estaba completamente bien. (Tomado de Schüssler).

FERRUM PHOS. PARA EL ADOLORIMIENTO.—Si la bioquímica solamente hubiese descubierto este remedio, con esto habría dado á la humanidad el don más grande en la Materia Médica. Lo uso más que cualquier otro remedio y obtengo buenos resultados.

Se ha empleado de una manera muy satisfactoria en el siguiente

CASO CLÍNICO.

La señora D., de 42 años, nunca había sido una persona vigorosa, y siempre pedía á los médicos que le recetasen "tónicos." Se resfriaba muy fácilmente y tenía mucho adolorimiento en la garganta y pecho. Cefalalgia frecuente, que era peor en las sienes. El dolor en la cabeza era generalmente pulsátil. La cabeza siempre dolorosa al tacto. Tenía más ó menos dolor en los ojos, el que empeoraba siempre por el movimiento. Decía que estaban delicados. La cara abochornada y ardiente, y su lengua estaba limpia y roja. Decía también que tenía dispepsia hacía algunos años, con una sensibilidad en su estómago é intestinos. Los órganos sexuales se encontraban delicados y doloridos.

La parte muscular estaba siempre dolorida y tierna. La dolencia y sensibilidad de todas las partes llamó mi atención para el remedio. La dí instrucciones de una manera general respecto á la dieta, baños y ejercicios; también amplios consejos acerca del cuidado de sus intestinos. Le fueron dadas dos tabletas cada dos horas de *Ferrum phos.* 3ª x, y fué notable su restablecimiento. Durante cuatro meses no tuvo adolorimiento y sensibilidad, y podía verdaderamente decir que gozaba mejor salud que nunca había esperado tener.

Siempre tengo presente este remedio en los casos que tienen también sensibilidad, irritación, congestión, fiebre ó inflamación de cualquiera parte ó partes del cuerpo. Puede tenerse confianza en él, sobre todo en los traumatismos de las partes blandas, como lo he experimentado yo mismo muchas veces en mi práctica quirúrgica. (Dr. O. A. Palmer).

SILICEA EN LOS TRAUMATISMOS DESCUIDADOS.

El Sr. G., de edad de 40 años, sufrió una lesión en uno de sus miembros, más abajo de la rodilla, hacía cerca de diez y ocho años, la que fué causa de que el miembro llegase á estar inflamado y supura-

se en dos ó tres partes. Llevó el miembro en este estado, estando unas veces mejor y otras peor, hasta que lo ví hace cuatro meses que fué cuando comencé á tratarlo. Sus síntomas siempre se agravaban en la noche, que era cuando tenía dolor punzante que descendía á lo largo de la pierna, especialmente si el cuerpo llegaba á enfriarse. Las aplicaciones calientes aliviaban el dolor.

Las úlceras secretaban copiosamente pus amarillo espeso. Tenía uno ó dos abscesos fistulosos de larga duración que estaban circundados por un borde azul obscuro. Su salud general era muy deteriorada y lo encontré muy abatido precisamente después de que había tenido un intenso calosfrío de una hora. Era desgraciadamente enfermo de dispepsia crónica y eructaciones ácidas, con un ataque accidental de cardialgía y calosfrío. Pronto encontré que *Silicea* era el único remedio que dominaría el dolor y produciría sueño agradable por la noche, y al mismo tiempo mejoraría su estado general. Su mejoramiento ha sido muy satisfactorio y él es ciertamente una gran victoria para el remedio, siendo como una cosa que en la práctica de la medicina ha sido usada sin conseguir algún resultado material. (Dr. O. A. Palmer).

La Srita. J. de 24 años, se lesionó el coxis, cayendo á horcajadas sobre un guijarro mientras paseaba en el lecho de un río seco. Mayo 22, 1893, se quejaba de mucha molestia en el occipucio y tenía severo dolor en la espina si llegaba á fatigarse, lo que ocurría después de un ligero ejercicio en los quehaceres de la casa, ó después de un corto paseo. Una hora de compras en el mercado la inutilizaba por algunos días. Tenía que mover la cabeza hacia adelante, pero si la mantenía en esa postura tenía una sensación de abatimiento. No tomó más que *Kali phosphoricum* 6ª x hasta el 16 de Junio, que fué cuando la dí *Pulsatilla*, porque se retardó su período. Siendo éste raro, pensé ver si el remedio podía corresponder, y hallé que su administración producía una "retención ó suspensión del flujo mensual." Ordené que fuese continuado *Kali phosphoricum* después de la terminación del período, tomando dos dosis al día, en vez de cuatro como anteriormente.

Había estado en una constante y marcada mejoría durante estas tres semanas. Entonces marchó á Chicago é hizo una labor manual muy prolongada y á su regreso la encontré tan hermosa, como cualquiera persona de su familia á quien se supusiese en estado de perfecta sa-

lud. Después de esto estuvo quieta en el país natal hasta Octubre y volvió de nuevo en muy buen estado. Al reanudar el método de su antigua vida, después de un cierto tiempo, volvieron los mismos síntomas y de nuevo vino á someterse á mi cuidado. Siempre fué beneficiada por el uso de *Kali phosphoricum*, pero al presente no lo consiguió hasta después que le hubo sido aplicado el galvanismo directamente al lugar del traumatismo y hubo tenido quietud por otro Verano en que la encontré completamente restablecida.

No cito este caso para probar que *Kali phosphoricum* hará sanar un traumatismo de coxis; solamente manifestar su poder para aliviar muchos síntomas perturbadores, ocasionando de un modo tan profundo un desorden al sistema nervioso. (Dr. T. C. Wiggins).

TUMORES.

KALI PHOS.—Cáncer, dolor, secreción desagradable y decoloración de la parte enferma.

KALI SULPH.—Epitelioma. Cáncer de la piel que se presenta cerca de alguna membrana mucosa, con descarga de secreciones delgadas, amarillas, serosas, purulentas. Este remedio, empleado por el Dr. H. S. Phillips, de Toledo, Ohio, curó un epitelioma situado sobre el lado izquierdo de la nariz, que presentaba una costra como callosa con una areola inflamada de hinchazón obscura. Había durado más de seis meses.

NATRUM MUR.—Ránula.

FERRUM PHOS.—Un excelente remedio que se alterna en el cáncer para mitigar el excesivo dolor. El cáncer de la lengua ha sido beneficiado por él. Nœvus.

CALCAREA PHOS.—Cáncer en los temperamentos es-

crofulosos. Higroma de la rodilla. Los quistes agudos ó crónicos requieren este remedio. Broncocele, bocio, quistes, Bursæ.

CALCAREA SULPH.—Infiltraciones serosas, tumores enquistados. Granulaciones y supuraciones excesivas.

CALCAREA FLUOR.—Tumores sanguíneos en la cabeza de los niños recién nacidos. Nódulos, concreciones, glándulas induradas en los pechos de las mujeres. Aumento de volumen de las glándulas de Meihbonius. Hinchazón sobre el maxilar, la cual es dura. Ganglión, hinchazón circular de los tumores enquistados, tal como la que se halla sobre el dorso de la muñeca por torsión de las fibras elásticas. Las hinchazones duras tienen su sitio en la fascia, ligamentos capsulares ó tendones. Masas induradas en la región cecal.

SILICEA.—Aumento de volumen de las glándulas. Infarto crónico de las glándulas linfáticas. Hinchazones, tumores, etc., que están indurados, pero amenazando la supuración. Induración escirrosa del labio superior y de la cara. Cáncer uterino. Leucorrea icorosa, purulenta, de color moreno, fétida y fría como el hielo.

NATRUM PHOS.—Ha tenido éxito en el cáncer de la lengua. Cuando el bocio es producido por un estado de acidez, obra bien este remedio.

CASOS CLÍNICOS.

CALCAREA FLUORICA.—Una soltera de 60 años vino á consultarme el 13 de Octubre, 1883, diciéndome que tenía un tumor de aspecto

brillante sobre el índice de la mano izquierda, el que había permanenecido en ese estado por cerca de 18 meses. La masa era dura y dolorosa, y del tamaño como de la mitad de una pequeña nuez, pero más bien aplanada, la enferma nerviosa y desanimada. La mejoría se declaró desde luego, y á los dos meses y medio estaba enteramente bien. (J. Compton Burnett).

CALCAREA PHOSPHORICA.—Me fué traído á la consulta un niño de quince días. Inmediatamente después del nacimiento se le observó un tumor sobre la cabeza, el que había continuado creciendo cada día más. Estaba situado sobre la prominencia izquierda del parietal, era como de 7 centímetros de diámetro, y su altura como de 3. Se sentía blando, no fluctuante. El examen cuidadoso mostraba que el hueso parietal estaba afectado por debajo del tumor. Era evidentemente un meningocele de tamaño moderado. El pronóstico era dudoso. No había signos de presión sobre el cerebro, y el niño, con excepción de una doble hernia inguinal, estaba sano. Prescribí *Calc. phos.* 6ª trit. tres veces al día. Después de haber tomado esta medicina tres días, el tumor fué notoriamente más pequeño y en diez días desapareció por completo. La cavidad en el hueso se llenó gradualmente y al cabo de tres y media semanas estaba absolutamente cerrada. (Frohling, A. h. Z., cxxxii. 65).

Quiste sanguíneo sobre el lado derecho del hueso occipital, con apertura de la fontanela posterior. *Calcarea phos.* 2ª c. curó.—Raue, *Record Homœopathic Literature*, 1873.

Caso de pólipo de la nariz izquierda, curado por *Calcarea phos.*—Beebe, *Trans. American Institute*, 1886.

El Dr. Orth, refiere: Elizabeth F., una señora viuda, de 70 años, me consultó el 5 de Abril, á causa de un epitelioma situado sobre el carrillo derecho, alcanzando desde el párpado inferior hasta la ventana de la nariz. Era casi circular y como del tamaño de un florín. El epitelioma había existido por algunos años y estaba en el período de ulceración, con base dura y bordes callosos. Ordené *Kali sulph.*, una dosis en polvo todas las noches, así como una compresa mojada con una solución hecha del mismo *Kali sulph*, para aplicación al exterior, con el fin de cambiarla frecuentemente. El 6 de Mayo tuve noticia de que la úlcera había disminuido visiblemente, y el 23 del mismo

mes la úlcera había cicatrizado, siendo del tamaño de una moneda de seis peniques. Unos cuantos días más tarde, la señora partió para volver á su casa, y tengo el sentimiento de no haber oído hablar de ella desde entonces. (Tomado de Schüssler).

El Dr. Spiethoff, de Lubeck, hace relación del pronto efecto obtenido por *Calcar. fluor* 6ª y *Silicea*. El paciente estaba atormentado por un grande sarcoma sobre el maxilar superior, que le daba á la cara la apariencia de una rana. Por ocho meses los médicos de la antigua escuela habían tratado de establecer la supuración, pero falló su tratamiento que sólo dió por resultado la producción de varios trayectos fistulosos que secretaban un líquido fétido, casi claro. Sin mucha esperanza de conseguir la supuración se le dió *Silicea* 6ª No ocurrió ningún cambio en el término de dos semanas, exceptuando la aparición de dos protuberancias en la línea media del tumor. Entonces se administró *Calcarea fluor* 6ª, y al día siguiente comenzó una abundante supuración, mejorando mucho el caso. Fué muy notable la pronta acción de los remedios.

El Dr. C. H. Thompson, de Santa Rosa, nos da noticia de un caso de nódulo neurálgico en la glándula mamaria, parecido al escirro, curado enteramente por *Calcarea fluor*.

William W., operario de una fábrica, vino á verme el 4 de Septiembre. Padecía de un epitelioma que estaba situado sobre el lado derecho de la nariz, casi inmediatamente debajo del ángulo del ojo y como del tamaño de una moneda de dos chelines. El ojo mismo parecía estar afectado simpáticamente quizá por la irritación de la secreción, la que salía del interior del ojo por el borde del párpado, el que, sin embargo, no estaba muy destruido. Sea lo que fuese, había conjuntivitis palpebral y ocular con opacidad de la córnea. La úlcera en el lado de la nariz había existido por cuatro años. Al principio consistía en una mancha ligeramente roja, la que era un poco elevada é hinchada. Más tarde comenzó á cubrirse con una costra córnea, la que algún tiempo después se desprendió y dejó una úlcera pequeña. Esta se extendió lenta, pero regularmente. El paciente había, durante todo el tiempo de su existencia, consultado á gran número de doctores. Había sido tratado durante dos meses por un oculista después de que observó esta complicación, pero todo sin resultado. *Kali sulph.* le fué

entonces administrado una dosis mañana y noche; y exteriormente era usada una loción también de *Kali sulph.* Después de unos cuantos días desapareció la inflamación. La úlcera comenzó también á sanar bajo el constante tratamiento. Por el 8 de Octubre la úlcera había cicatrizado de tal manera, que sólo quedaba una manchita, y el 9 del mismo mes, el enfermo se encontró capaz de volver á su trabajo. (Tomado de Schüssler).

Un tumor duro bajo de la barba, como del tamaño de un huevo de paloma, desapareció completamente en cerca de cuatro semanas con el uso de *Calcarea fluor.* Las medicinas tanto de la antigua como de la nueva escuela habían fallado en la curación. (Dr. F. Tomado de Schüssler).

El Dr. Fuchs, de Regensburg, refiere: En el mes de Agosto, 1875, curé á una señora de 40 años, que había padecido por un tiempo considerable de un derrame en la cápsula articular de la rodilla. Doce dosis de *Calcarea phos.*, dos dosis por día, según indicación del Dr. Schüssler, alejó este estado crónico que con frecuencia se presenta en las sirvientes. (Tomado de Schüssler).

Pólipo nasal.—La Sra. R. tenía en los dos orificios anteriores de la nariz un pólipo nasal, abultado, de color gris y que sangraba fácilmente. *Calcarea phos.*, 30ª, una dosis en polvo todas las mañanas por una semana. La tercera semana manifestaba estar enteramente libre del padecimiento. El más grande se desprendió completamente; el más pequeño se absorbió. (J. G. Gilchrist)..

Keloides Múltiple, que apareció después de la escisión de un tumor, en la cicatriz que quedó sobre la piel. Fué extirpado en el Hospital de San Bartolomé; pero volvió de nuevo rápidamente y aumentó en tamaño, hasta que la paciente, una muchaha, fué puesta bajo la acción de *Silicea* 3ª, mañana y noche. La desaparición gradual de la vegetación bajo este tratamiento fué una de las cosas más agradables que jamás he visto en la medicina.—John H. Clarke, en el *Homœopathic World*, Agosto, 1885.

Dactilitis Estrumosa.—En el Hospital Homeopático de Londres, Gerard Smith exhibía á un niño, de cuatro años de edad, quien se había lesionado uno de los dedos índices hacía dos años. Se le declaró en el principio periostitis y abscesos, pero sin síntomas, de necrosis, y por

el reconocimiento no se encontró ningún secuestro. La hinchazón del dedo aumentó durante seis meses hasta que la forma del hueso fué casi globular. Al cabo de este período, bajo un uso acostumbrado de *Silicea*, el hueso llegó á ser mucho más pequeño. Al fin de un segundo período de seis meses, se formó de nuevo un absceso, fué abierto, y la tienta hizo notar una masa blanda en el interior. Por segunda vez mejoró mucho el dedo, y llegó á ser más pequeño bajo la acción continuada de *Hepar* y *Silicea*. Byres Moir y Epps han tenido ambos casos semejantes de dactilitis estrumosa, en los que tuvo lugar el completo restablecimiento con *Silicea*, *Calcarea* y *Calc. fluor.*

"*Calcarea fluórica* en las masas é hinchazones duras en los pechos de las mujeres."

Sabedor de lo cual afirmo cuanto declaro que esas hinchazones pueden ser tratadas fácilmente con este remedio.

La Sra. C., de 52 años, vino á verme bastante alarmada porque uno de los principales cirujanos había dicho que tenía un cáncer del seno, y era necesario operarlo inmediatamente. Después de un examen cuidadoso del pecho, y tomando en cuenta sus datos históricos, la dije: creo poder hacer desaparecer la masa dura con la medicina. Después de pensar unos cuantos momentos, exclamó: "Obrad como gusteis." Hice una solución de tabletas de la 3ª x en 4 onz. de agua potable, y la dije conservase húmeda la hinchazón con este líquido el mayor tiempo posible, lo que hizo según la indicación. Al interior la dí 3 pastillas de la 3ª x cada tres horas, y le encargué me diese noticia al cabo de una semana. En este intervalo de tratamiento el tumor se redujo á una cuarta parte, y creí que se restablecería completamente, lo que se *verificó* durante seis semanas de tratamiento.

Caso 2.—Una señora amiga de la anterior, de 42 años de edad, se presentó para que la tratase de una induración que había ido creciendo en el pecho derecho por tres ó cuatro años. Era doloroso, y estaba imposibilitada para usar el brazo del mismo lado por algún tiempo sin que por eso llegase todo el órgano á estar sensible y doloroso al grado de impedirle el sueño. Era una persona dispéptica, y después de corregirle esta molestia recibió el mismo tratamiento que la anterior y se restableció completamente en tres meses.

Este remedio nunca ha dejado de corresponderme en la hinchazón

endurecida de la glándula maxilar causada por odontalgia ó traumatismo, y por grietas y hendiduras de los labios. Lo usé en un caso de caries rápida de los dientes, en que el esmalte se había desprendido, y obtuve muy buenos resultados. (Dr. O. A. Palmer).

ÚLCERAS Y ULCERACIONES.

FERRUM PHOS.—Ulceraciones de las glándulas para aliviar el dolor lancinante, la dolencia, el enrojecimiento, calor y estado congestivo. Si á las úlceras acompaña fiebre ó calor, ó rojez y congestión.

KALI MUR.—Ulceras con secreción fibrinosa. Ulceración del hocico de tenca y del cuello uterino con secreciones blandas, blancas, espesas; todas las ulceraciones en que hay hinchazón ó presenta la lengua un aspecto blanco-sucio ó una superficie pulverulenta; como escamas harinosas ó bien una secreción fibrinosa; carne fungosa, granulaciones exuberantes. ULCERACIÓN DE LA CÓRNEA. (Véase ojos, Enfermedades de los).

KALI SULPH.—Ulceras tuberculosas con un continuo escurrimiento de pus amarillento y linfa; cederán con frecuencia á la acción de este remedio.

NATRUM PHOS.—Ulceración del estómago ó de los intestinos. Ulceras sifilíticas, con una superficie amarilla teniendo el aspecto de eczema medio seco.

SILICEA.—Ulceras de los miembros inferiores cuando están profundamente situadas y se encuentra afectado el periostio. *Silicea* tiene úlceras que son esponjosas, sangrando fácilmente, con bordes callo-

sos, indolentes, úlceras fistulosas, secretando un líquido amarillo, delgado, fétido, icoroso. Ulceras atómicas, en las personas que se dedican á trabajos penosos y mal alimentadas. Ulceración que sigue á una raspadura de la piel sobre la espinilla. Se usa también localmente ó la infusión de heno, que contiene *Silicea*. Procesos supurativos, dosis masivas y repetidas en los escrofulosos, hinchazones glandulares con supuración. (Noak).

CALCAREA PHOS.—Ulceración de la substancia ósea, como un intercurrente.

CALCAREA SULPH.—Ulceración de las glándulas. Ulceras abiertas. Llagas purulentas que pueden resultar por raspaduras, granos, heridas, quemaduras, escaldaduras ó machacamientos. Ulceras de los miembros inferiores con una secreción de materia saniosa, amarilla.

CALCAREA FLUOR.—Ulceraciones de los huesos. Ulceras varicosas.

CASOS CLÍNICOS.

Vino á mi consultorio una muchacha, que tenía úlceras en ambas piernas, fluyendo una secreción delgada, icorosa, roja, irritante y dolorosa, la que la había estado molestando por cuatro años, reventando algunas veces, luego se cubrían de costras, sanando parcialmente, para inflamarse en seguida, de manera que el sueño era interrumpido; la locomoción producía severos dolores, en realidad, las úlceras estaban, según todas las apariencias, en un estado muy grave. Desde luego le dí *Silicea* 6ª x y *Calcarea phos.* 6ª x, tres dosis cada día, ligando los miembros con vendajes de franela, y en cuatro semanas todas las úl-

ceras estuvieron curadas y la enferma quedó bien, llena de ánimo y feliz. (Dr. A. P. Davis).

A. S., de 16 años, por tres años tuvo úlceras indolentes en la mitad inferior de la pierna izquierda, la que estaba roja, muy hinchada. Tres fístulas ulcerosas secretaban un pus amarillo, espeso y que despedía muchas esquirlas de hueso. Dolores principalmente por la noche. Extenuación, falta de apetito. Tos frecuente en la mañana, con expectoración amarilla, espesa, y considerable debilidad en la mañana.

Los pulmones en estado normal. *Calcarea fluor.* 6ª x, mañana y tarde, por ocho días, con intervalos alternativos de cuatro días sin medicina. Curó en cinco meses. Al exterior solamente se empleó la glicerina. No se observó ningún aumento de volumen del miembro enfermo después de transcurridos seis meses. (Dr. Hausen, *Ally. Med. Zeit.)*

Estando tratando una úlcera crónica sifilítica, observé una capa amarilla sobre la superficie de la úlcera, la que tiene la apariencia de crema medio seca. Después del uso de *Natrum phos.* desapareció la capa en cuatro días y el paciente estuvo por otra parte muy mejorado. (C. Hg.)

URINARIOS, DESÓRDENES.

FERRUM PHOS.—Incontinencia de orina, si es ocasionada por debilidad del músculo del esfínter. Emisión involuntaria de orina durante el sueño, especialmente en los niños. Enuresis nocturna, por debilidad de los músculos, se observa frecuentemente en las mujeres, cuando con cada acceso de tos se escapa un chorro de orina. Cistitis, primer período, con dolor, calor ó estado calenturiento. Supresión de la orina con calor. Excesiva secreción de orina. Poliuria simple. «Urgencia irresistible para orinar durante el día, agravada por mantenerse en pie y acompañada de dolor á lo largo de la ure-

tra y del cuello de la vejiga. Retención de orina con fiebre en los niños de poca edad, lo mismo que salida involuntaria de orina con cada acceso de tos.» (Dr. M. Deschere). Ciertas variedades de vino tinto curarán la enuresis nocturna en los niños, por el hierro que dicho vino contiene. Dosis por la mañana y por la noche. Enuresis diurna que depende de irritación del cuello de la vejiga y de la extremidad del pene.

KALI MUR.—Cistitis, segundo período, cuando se presenta la hinchazón (exudación intersticial), y la secreción es de moco blanco, espeso. Remedio principal para la cistitis crónica. Orina de color obscuro, depósito de ácido úrico, cuando existe entorpecimiento é inactividad del hígado.

KALI PHOS.—Cistitis en condiciones asténicas con postración. Micción frecuente ó expulsión de grandes cantidades de orina. Ardores frecuentes; debilidad nerviosa. Incontinencia de orina por debilidad nerviosa, flujo de sangre por la uretra. Parálisis, afectando el músculo del esfínter, causando incapacidad para retener la orina, Enuresis en los niños *de mayor edad.* Orina completamente amarilla. Escozor en la uretra. Dolor incisivo en la vejiga y la uretra.

MAGNESIA PHOS.—*Urgencia constante para orinar siempre que la persona permanece de pie ó anda.* Retención espasmódica de la orina. Gravela. Dolor después del uso del catéter, quedando una sensación como si los músculos no se contrajesen.

El niño expulsa grandes cantidades de orina.

NATRUM PHOS.—Incontinencia de orina en los niños, con síntomas de acidez. Poliuria. Orina de color rojo-obscuro, con artritis. Micción frecuente. Diabetes. Atonía de la vejiga. Mal de piedra. Pretende Schüssler en su última edición que este es el principal remedio en el catarro de la vejiga.

NATRUM SULPH.—Depósito ó sedimento arenoso en la orina, gravela, depósitos líticos, la orina presenta una substancia del color de ladrillo molido, acompañada de síntomas de gota. Poliuria simple, secreción excesiva si existe diabetes. Orina cargada de bilis. Se orina en la cama por la noche, ó hay retención en la orina.

SILICEA.—Orina cargada con pus y mucus. Depósito de arena roja ó de ácido úrico. Enuresis que se presenta en las afecciones verminosas y en la corea. Necesita levantarse en la noche para orinar.

CALCAREA SULPH.—Inflamación de la vejiga, en el período crónico, con formación de pus.

Orina roja con fiebre héctica. Nefritis escarlatinosa. (S. Lilienthal).

CALCAREA PHOS.—Orina copiosa. Enuresis, los niños y los ancianos se orinan en la cama, se emplea como un remedio intercurrente después de *Natrum sulph.* Para la gravela, y para los depósitos calculosos y fosfáticos. Para impedir la nueva formación de la piedra en la vejiga, también el suero ó el koumiss prestan ayuda como un método dietético. Sedimento coposo en la orina.

NATRUM MUR.—Poliuria, con mucho enflaquecimiento; hematuria después del escorbuto; dolor incisivo *después* de orinar. Cistitis. Orina involuntaria al andar, toser, etc. Incontinencia de orina. Dolor incisivo en la uretra después de la micción.

CALCAREA FLUOR.—Orina copiosa con urgencia frecuente. Orina escasa y de color muy vivo, y que exhala un olor picante.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. S. B. Dickerman, de Abington, Mass., refiere un caso de enuresis curado con *Ferrum phos.* 200ª

La enuresis ocurrió durante el día; rara vez se orinaba en la cama por la noche. La guía de síntomas acentúa su uso en la enuresis *diurna.*

Caso de incontinencia de orina debido á la pérdida de poder muscular, curado por *Ferrum phos.—Transactions American Institute,* 1882, p. 181.

El Dr. Schüssler, en una comunicación particular al Dr. Zoeppritz, refiere el caso de un joven á quien había dado, sin resultado, *Ferrum phos.* para la enuresis. Apareció una erupción pustulosa en las comisuras de la boca, por lo que prescribió *Natrum mur.*, que curó ambos padecimientos: la erupción y la enuresis.

El Dr. Cornelius Oldenburg refiere un caso de retención espasmódica de la orina, que al principio faltaba por completo y cuya emisión no se conseguía ni aun con el uso de la sonda. Fué administrada *Magnesia phos.*, la que alivió un poco; fué expelida alguna orina. A los cinco días, no habiéndose obtenido resultados decisivos ó permanentes por este remedio, fué seguido el consejo de Schüssler, y de consiguiente se dió *Calcarea phos.*, la que curó en un día. Unos dos meses después se presentó otro ataque, el que fué también curado inmediatamente por *Calcarea phos.*, estando el paciente bien al siguiente día. —*All. Hom. Zeit.*, 1885, p. 70.

El Dr. Crüwell da cuenta de un caso de incontinencia de orina: "Cuando llegué á estar familiarizado con las preparaciones del Dr. Schüssler estaba muy impaciente para ensayar los efectos de *Kali phos.*, recomendados según el citado doctor contra la parálisis y estados paralíticos. Cualquiera que ha estado ocupado con el estudio de la psicología, tiene naturalmente inclinación para sospechar la existencia de la parálisis por todas partes. Reconociendo esta verdad podía haber dado *Kali phos.* con demasiada frecuencia, como lo deseaba para descubrir lo que con él podría conseguirse. Por varias razones me ví obligado á darlo para la incontinencia. Lo administro tres ó cuatro veces al día en una poca de agua. En cinco casos, dos de los cuales traté sin buenos resultados, *Kali phos.* efectuó una mejoría asombrosamente rápida. Con una muchacha, de 7 años, había hasta hace poco tiempo tenido la necesidad de repetir el remedio habitualmente, aun cuando cesara el mal, pues la incontinencia volvía siempre cuando se interrumpía la medicina. El caso más afortunado fué el de un caballero anciano, de 60 años. No había duda en este caso de que existía un estado parético del músculo del esfínter. Algunos meses después del tratamiento volvió para decir que estaba perfectamente curado, pero deseaba tener algo de la medicina, simplemente por vía de precaución." (Tomado de Schüssler).

Un joven de 10 años, después de que había sido tratado sin éxito, homeopáticamente, venía padeciendo de enuresis, orina pálida, acuosa y muy profusa. *Ferrum phos.* 6ª x, una dosis del polvo en agua caliente, tres veces diariamente, lo curó. (Dr. C. W. Hakes).

Incontinencia de orina.—Una señora de 35 años, ha tenido molestias por tres años, sin poder saber cuál ha sido la causa de su enfermedad; se encontraba capaz para retener la orina por la noche, pero no en el día, que era cuando excretaba grandes cantidades de orina involuntariamente. La salud, buena en lo general. *Ferrum phos.* 3ª x, cuatro veces al día. Una semana después, participaba que ya podía retener la orina mucho mejor durante el día. La medicina fué continuada por tres semanas más, después de las que me informó de que el poder sobre la vejiga era entonces completo, y que estaba mejor de lo que había estado por dos años. Nueve meses después, la paciente vino de nuevo á verme con una recidiva de la enfermedad; y, aunque esta

ba entonces *embarazada*, *Ferrum phos.* detuvo de nuevo completamente la incontinencia. (Wilde).

VACUNACIÓN.

Para cualquiera de los malos resultados que se manifiesten por su aplicación *Kali mur.* obrará de una manera enteramente satisfactoria. (Schüssler). Si fuere necesario se sigue con *Silicea.*

VARICELA.

FERRUM PHOS.—Este remedio se emplea solo ó alternado con el remedio indicado por la erupción, tal como *Kali mur.*, *Calcarea sulph.*, *Natrum sulph.* ó *Silicea.*

VENAS, ENFERMEDADES DE LAS.

CALCAREA FLUOR.—Venas varicosas, ulceración varicosa de las venas (usada también en lociones). Dolores agudos penetrantes, los pacientes no pueden estar en pie. Es el principal remedio para las venas varicosas. El Dr. Porter recomienda este remedio en las venas varicosas de la vulva, y en la distensión del plexus venoso ovárico y sub-ovárico. Haciendo la diferencia entre *Silicea* y *Calcarea flour.*, encuentra que la última medicina tiene una más grande afinidad para el tejido muscular, y tiene, además, alivio por el frío, mientras que *Silicea* empeora por el mismo. Reproduce varios síntomas de Farrington, indicando el fluoruro de cal en las

afecciones de los tejidos inferiores. Las pequeñas vesículas forman cicatrices alrededor; laceraciones del cuello uterino, con una considerable cantidad de tejido cicatricial.

FERRUM PHOS.—Varicocele con dolor en los testículos. Este es un remedio eficaz para las venas, aun cuando su principal esfera de acción es sobre las arterias. Ha curado un pequeño aneurisma y la importante indicación para su uso es la PALPITACIÓN. Venas varicosas en las personas jóvenes.

CASOS CLÍNICOS.

Un joven de 18 años, se quejaba de dolor cotidiano en el testículo izquierdo, incapacitándole para trabajar. El examen puso de manifiesto una varicocele, bien desarrollada, causada probablemente por el esfuerzo constante para levantar cosas pesadas. Después de cinco semanas del uso de *Ferrum phos.*, una dosis diariamente, curó. (Dr. Mayer, Stuttgart).

Un médico de Bogotá, S. A., refiere un caso de úlceras varicosas de algún tiempo de duración, en ambos brazos y piernas. *Calc. fluor.* 6ª x fué administrada mañana y noche. Curó en quince días.

VERMES.

FERRUM PHOS.—Vermes intestinales, predisposición para expeler los alimentos sin digerir.

OXIUROS.

KALI MUR.—Oxiuros pequeños blancos, ocasionando prurito en el ano; lengua blanca, se da en alternación con *Natrum phos.*

NATRUM PHOS.—Lombrices intestinales largas, redondas ú oxiuros con los síntomas característicos de acidez, ó picazón de la nariz, estrabismo accidental. Dolor en los intestinos, sueño inquieto. Prurito del ano, especialmente por la noche, en la cama; palidez de la cara alrededor de la boca ó la nariz. Rechinido de los dientes en los niños. Oxiuros. Este remedio obra probablemente destruyendo el exceso de ácido láctico que parece ser necesario para la vida de estos entozoarios.

CALC. FLUOR.—Comezón en el ano que parece debida á la presencia de oxiuros.

CASOS CLÍNICOS.

NATR. PHOS. COMO REMEDIO VERMÍFUGO.—El Dr. Shüssler recomienda como eficaz esta droga en las afecciones verminosas. El Dr. A. C. Kimball, de Barteville Station, Neb., hace relación de un caso de su práctica, con los siguientes resultados: El paciente, muchacho de cinco años, tenía espasmos y había sido tratado por varios médicos sin resultado. Después de usar *Natr. phos.* 3ª por seis semanas, tres veces al día, arrojó cuatro pies tres pulgadas de solitaria, con mucho asombro de todos los interesados. Este es el primer caso en que se haya visto á *Natr. phos.* produciendo semejante resultado. Es creíble que la tenia fué expulsada por entero, no habiendo pruebas evidentes de que quedase algún fragmento en el intestino. *Natr. phos.* es eficaz, especialmente en los casos de oxiuros vermiculares.

VÉRTIGO.

FERRUM PHOS.—Vértigo por afluencia de sangre á la cabeza, con bochorno, dolor de carácter pulsátil ú opresivo.

KALI PHOS.—Desvanecimientos, sensación de mareo en la cabeza, cuando reconoce por causa un origen nervioso ó cerebral, y por debilidad no gástrica. Vértigo por anemia. Vértigo que empeora al ponerse en pie y al levantar la vista.

KALI SULPH.—Vértigo, especialmente al fijar la vista y al levantarse.

NATRUM SULPH.—Vértigo, con capa biliosa sobre la lengua, ó sabor amargo en la boca; desarreglo gástrico; exceso de bilis. Vértigo con inclinación á caer sobre el lado derecho.

NATRUM PHOS.—Vértigo con desarreglos gástricos, acidez y falta de apetito, capa cremosa de la lengua, de color amarillo brillante.

MAGNESIA PHOS.—Vértigo por efectos de acomodación óptica.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. E. B. Rankin, de Washington, D. C., refiere en el *Southern Journal of Homœopathy*, Abril 1886, un caso de vértigo de varias semanas de duración, acompañado de vómitos de substancias ácidas, curado por *Natrum. phos.* en una semana.

He hecho, sin embargo, poco uso, hasta ahora, del *Kali. phos.* de Schüssler, pero, no obstante, he realizado algunas curas muy interesantes.

Una mujer de 64 años, que había sido tratada sin éxito, por muchos años, vino á ponerse bajo mi asistencia. Había tomado baños ferruginosos, muchas píldoras y gotas de hierro y quinina. Se quejaba de un vértigo severo, sintiéndolo ordinariamente al levantarse de una posición sentada, y al dirigir la vista hacia arriba. Estaba constantemente temerosa de caer, y no se atrevía á abandonar su cuarto. La dí todos los remedios usuales, sin resultado alguno. Por último, la admi-

nistré, en Mayo 1875, dos dosis diariamente de *Kali. phos.* del Dr. Schüssler. Tuve la satisfacción de observar que siguió á éste una cura rápida y decidida. La paciente pudo atender á sus quehaceres domésticos, salir sola aun á distancia, y está casi completamente curada de su sensación de vértigo doloroso. (Tomado de Schüssler).

VIRUELA.

KALI MUR.—Este es el principal remedio; reprime la formación de las pústulas.

FERRUM PHOS.—Si la fiebre es elevada, se emplea en alternación con *Kali mur.*

KALI PHOS.—Estados de putridez, olor repugnante, agotamiento y estupor. Síntomas adinámicos que indican la descomposición de la sangre.

CALCAREA SULPH.—Las pústulas secretan pus.

NATRUM MUR.—Flujo salival, confluencia de las pústulas y somnolencia.

KALI SULPH.—Favorece la reparación de la piel y el desprendimiento de las costras.

NATRUM PHOS.—Cuando las pústulas llegan á hacerse purulentas.

VÓMITOS.

SILICEA.—Vómito de los niños tan pronto como maman. Vómito en la mañana con calosfríos.

FERRUM PHOS.—Vómitos de sangre, de color rojo brillante, con tendencia á formar una masa gelatinosa. Vómito del alimento con líquidos ácidos; vómito de alimento, éste se devuelve sin digerir, más ó menos tarde, después de tomarlo.

KALI PHOS.—Náusea y vómito de alimento agrio, amargo y de sangre.

KALI MUR.—Vómito de sangre, obscura, coagulada, viscosa. Vómito de flema blanca, espesa.

NATRUM MUR.—Vómito de líquido acedo, agrio, no de alimento. Vómito de masas coaguladas y líquidos ácidos. Substancia obscura como asientos de café. Vómito de mucus acuoso, fibroso, transparente.

NATRUM PHOS. — Vómito de masas coaguladas, agrias, líquidas, con capa de la lengua amarilla, cremosa.

NATRUM SULPH.—Vómito bilioso, náusea matinal y sabor amargo en la boca. Vómito de materia verdosa. Náusea constante.

CALCAREA FLUOR.—Vómito de alimento sin digerir, si no es suficiente *Ferrum phos.* Vómito durante la dentición.

CALCAREA PHOS.—Vómito después de tomar agua fría y helados. Los niños pequeñitos vomitan frecuente y fácilmente y necesitan alimentarse seguido. Vómito con trastornos de la dentición.

CASOS CLÍNICOS.

El Dr. W. J. Martin en las *Transactions Penna. Hom. Med. Society*, 1886, refiere un caso de vómito persistente, acompañado por dolor en el abdomen, curado con *Magnes. phos.* 12ª después que habían fallado los remedios homeopáticos ordinarios.

Una muchacha de cosa de 18 años me consultó (así escribe un estudiante de medicina) para un caso de vómito sin dolor, que había existido por un largo espacio de tiempo, y ocurría después de casi todas

las comidas. El color de su cara y el de las membranas mucosas visibles era pálido. La menstruación era escasa y retardada. No había otros síntomas de importancia; el embarazo no existía. Ordené *Ferrum phos.* 6ª x.

Después de algún tiempo ví casualmente de nuevo á la paciente, y recibí la agradable noticia de que el vómito había desaparecido enteramente desde el principio del uso del remedio. (Monatblaetter).

1. F. R., cincuenta años de edad. Había sufrido por ocho meses de pesadez en el estómago cerca de una hora después de cada comida, con náusea, algunas veces vómito y mucha acumulación de agua en la boca. Se le había dado *Pulsatilla* con poco ó ningún resultado, también *Natrum* y *Nux vómica.* Su condición llegó á ser peor. El vómito de alimento comenzaba unas tres ó cuatro horas después de cada comida. *Ferrum phos.* cada tres horas alivió el estado del enfermo desde luego.

2. H., once años de edad. De constitución endeble y delgada, venía sufriendo desde hacía mucho tiempo de vómitos alimenticios, dolor en el costado y palpitación del corazón. El examen más escrupuloso manifestó que su hígado, corazón y riñones estaban sanos. *Ferrum phos.* curó en cuatro días.

3. L S., veinticuatro años. Estatura mediana, pálido, aspecto de escasa nutrición, tenía ya hacía varias semanas vómito de alimento inmediatamente después de la comida. El paciente está débil y soñoliento en el día. *Ferrum phos.* mejoró el estado de un modo marcado en unos cuantos días; el vómito desapareció y las otras condiciones en que se encontraba recibieron provechosamente la influencia del remedio.

4. E. E., cuarenta y dos años. Constitución enfermiza y delicada; hace cuatro años tuvo una gastritis y fué curada por la Homeopatía. Desde aquel tiempo, al menos, ha tenido una debilidad de los órganos digestivos que le molesta de vez en cuando. Hace seis semanas se presentó una marcada agravación. Sensación de plenitud en el epigastrio, muchos eructos, vómitos, aflujo de sangre á la cabeza y pies fríos. El examen puso de manifiesto estar hinchada y sensible la región del estómago; el hígado, los riñones, el corazón, etc., sanos. *Ferrum phos.* 3ª x cada hora. En tres días el paciente estuvo listo, los vómitos ha-

bían cesado por completo y los síntomas restantes habían marcadamente disminuido.

5. E. B., treinta y cinco años. Padecía por varias semanas de indisposición de estómago, con presión, vómito de alimento inmediatamente después de cada comida; frecuente color encarnado de la cara. Los vómitos cesaron después de doce horas del uso de *Ferrum phos.* y jamás volvieron.

6. L. R., treinta años. De aspecto anémico; padecía de indisposiciones de estómago por varios años. Hacía ocho semanas que éstas se habían empeorado mucho. Al presente hay vómito de alimento y la paciente se siente á consecuencia de eso débil y agotada. El veintiseis de Octubre recibió *Ferrum phos.* Cuatro días más tarde su estado era mejor, el vómito ocurría con menos frecuencia y el caso progresaba hasta el completo restablecimiento.

7. F. A. Por catorce días había sufrido de vómito de alimento después de cada comida. En veinticuatro horas *Ferrum phos.* curó el vómito, el que por otra parte ya no se presentó.

PARTE IV.

REPERTORIO.

ESTADOS Y AFECCIONES MENTALES.

ABATIMIENTO DE ESPÍRITU: *Natrum mur.*
ABERRACIONES, mentales: *Kali phos.*
ABSTRACCIÓN MENTAL: *Silicea.*
ACCESOS APASIONADOS: *Natrum mur.*
AFÁN DE REÍR: *Kali phos.*
AGITACIÓN, nerviosa: *Kali phos.*
AGRAVACIÓN POR LA MÚSICA: *Natr. sulph.*
ALUCINACIONES: *Kali phos.*, *Natr. phos.*
ANSIEDAD: *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. phos.*
ANTOJOS: *Kali phos.*
APARICIONES DEL PASADO, que acuden á menudo: *Kali phos.*
APREHENSIBILIDAD: *Natr. phos.*, *Kali phos.*; *Natrum mur.*
ASIR OBJETOS IMAGINARIOS, esfuerzo por: *Kali phos.*
ATENCIÓN, dificultad para fijar la: *Silicea.*
AVERSIÓN PARA CONVERSAR: *Kali phos.*
— de asociarse con la gente: *Kali phos.*

BOCHORNO, por emociones: *Kali phos.*
CANSANCIO DE LA VIDA: *Silicea.*
CAPRICHOSO: *Natr. mur.*
CARÁCTER SUSPICAZ: *Kali phos.*
COLÉRICO, IRASCIBLE: *Natr. mur.*
COMPRENSIÓN TARDÍA: *Calc. phos.*
CONSECUENCIAS—después de—
contratiempo: *Calc. phos.*
aflicción: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
vejación: *Calc. phos.*
susto: *Kali phos.*
CONSUELO, agravación por el: *Natr. mur.*
CONTRATIEMPO, después de un: *Calc. phos.*
COSAS FRÍVOLAS, parecen de importancia: *Ferr. phos.*
— incomodan: *Natr. phos.*
CRETINISMO: *Calc. phos.*
DELIRIO, en general: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
— tremens: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
— de musitación (en voz baja): *Kali phos.*
— extraviado: *Natr. mur.*
— muy locuaz, estando despierto: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
DEPRESIÓN DE ÁNIMO: *Calc. fluor.*, *Calc. sulph.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
DESALENTADO: *Natr. sulph.*
DESCONFIANZA, acerca de los negocios: *Kali phos.*
DESEOS POR ALUCINACIONES PASADAS: *Kali phos.*
DESESPERADO, acerca del porvenir: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*

DESFALLECIMIENTO CEREBRAL, por exceso de trabajo: *Kali phos.*, *Silicea.*, *Natr. mur.*
DESÓRDENES, MENTALES: *Kali phos.*
DIFICULTAD DE PENSAR: *Silicea.*
DISGUSTO DE LA VIDA: *Silicea.*
DISPOSICIÓN DE ÁNIMO.—voluble: *Calc. sulph.*
quejumbroso: *Kali phos.*
deprimido: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
melancólico: *Kali phos.*
gemebundo: *Magnes. phos.*
maniaco: *Ferr. phos.*
hipocondriaco: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
histérico: *Kali phos.*
EFECTOS DE, disgusto: *Calc. phos.*
susto: *Kali phos.*
pesar: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
vejación: *Calc. phos.*
EMOCIONES, por accesos violentos de histeria: *Kali phos.*
por bochornos: *Kali phos.*
ENAJENAMIENTOS MENTALES: *Kali phos.*
por lesión traumática en la cabeza: *Natrum sulph.*
ENERGÍA, falta de: *Kali phos.*
ESFUERZO POR ASIR OBJETOS IMAGINARIOS: *Kali phos.*
ESPANTO, consecuencias del: *Kali phos.*
ESPÍRITU DE CONTRARIEDAD, en los niños: *Kali phos.*
ESQUIVEZ EXCESIVA: *Kali phos.*
ESTREMECIMIENTOS, nerviosos: *Kali phos.*, *Kali mur.*
ESTUPIDEZ: *Calc. phos.*

ESTUPOR: *Kali phos.*
EXCESO DE ESQUIVEZ: *Kali phos.*
FALTA DE ASPIRACIONES: *Natr. phos.*
FALTA DE ENERGÍA: *Kali phos.*
FATIGA EXCESIVA, por desfallecimiento cerebral: *Kali phos.*
FEROCIDAD: *Natr. sulph.*
GEMIDOS: *Kali phos.*
GENIO VOLUBLE: *Calc. sulph., Kali phos.*
GENIO MANIACO: *Ferr. phos.*
GRAN IMPACIENCIA: *Kali phos.*
GRITOS AGUNDOS: *Kali phos.*
HABLAR Á SÍ MISMA CONSTANTEMENTE: *Magnes. phos.*
HABLAR, incoherencia en: *Kali phos.*
— mientras duerme: *Kali phos.*
HABLADOR, CHARLATÁN: *Ferr. phos., Natr. mur.*
HIPOCONDRÍA: *Kali phos., Natr. mur.*
HISTERIA, por emociones repentinas: *Kali phos.*
HUMOR QUEJUMBROSO: *Kali phos.*
HUMOR MELANCÓLICO: *Kali phos., Natr. mur.*
ILUSIONES, de los sentidos: *Kali phos.*
— de sensación: *Magnes. phos.*
IMAGINARSE QUE LOS MUEBLES SON PERSONAS: *Natr. phos.*
— que es necesario morir: *Kali mur.*
IMPACIENCIA: *Kali phos.*
IMPERTINENCIA EN LOS NIÑOS: *Calc. phos.*
IMPRESIONES FALSAS: *Kali phos., Natr. phos.*
INCLINACIÓN Á BAILAR Y CANTAR: *Natr. mur.*
INCLINACIÓN AL SUICIDIO: *Natr. sulph.*

INCOHERENCIA EN HABLAR: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
INDECISIÓN: *Calc. fluor.*, *Kali phos.*
INDIFERENCIA PARA TODO: *Ferr. phos.*
INTELIGENCIA, fatigada por el estudio: *Kali phos.*, *Silicea.*
IRRITABILIDAD: *Kali phos.*, *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Silicea.*
JUGAR CON ALFILERES Y AGUJAS: *Silicea.*
LAMENTACIÓN: *Magnes. phos.*
LANGUIDEZ: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. phos.*
LOCURA: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
LLEVAR LOS OBJETOS DE UN LUGAR Á OTRO: *Magnes. phos.*
LLORAR, disposición para: *Natr. mur.*
MALHUMOR: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
— en los niños: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
MANÍA: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
— puerperal: *Kali phos.*
MEJORAMIENTO DESPUÉS DE DORMIR: *Ferr. phos.*
MELANCOLÍA: *Kali phos.*, *Natr. sulph.*
MELANCÓLICO EN LA PUBERTAD: *Natr. mur.*
MEMORIA DEBILITADA: *Calc. phos.*
MEMORIA, pérdida de la: *Kali phos.*, *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
MIEDO, nervioso: *Kali phos.*
— de los ruidos: *Kali phos.*, *Silicea.*
MIRAR TODAS LAS COSAS DEL LADO SOMBRÍO: *Kali phos.*
NECESIDAD POR REPRIMIRSE: *Natr. sulph.*
NECESIDAD DE SER LLEVADO DE UNA PARTE Á OTRA: *Kali phos.*

NOSTALGIA: *Kali phos.*
OBJETOS, imaginarios, esfuerzo en asir: *Kali phos.*
OBSESIÓN, por visiones del pasado: *Kali phos.*
OÍR pasos al despertar por la noche: *Natr. phos.*
OLVIDO: *Calc. phos., Magnes. phos.*
OMISIÓN DE LETRAS Ó PALABRAS AL ESCRIBIR: *Kali phos.*
PENSAMIENTOS, dificultad de coordinar los: *Silicea.*
PÉRDIDA DEL ESTADO CONSCIENTE, repentina: *Calc. sulph.*
PÉRDIDA DE LA MEMORIA: *Kali phos.*
— repentina: *Calc. sulph.*
PESAR, consecuencias después de un: *Calc. phos., Kali phos.*
POCA ESPERANZA DE RECOBRAR LA SALUD: *Natr. sulph.*
PRESENTIMIENTOS SOMBRÍOS: *Kali phos.*
PUSILANIMIDAD: *Kali phos.*
RUIDO, exceso de sensibilidad para el: *Kali phos.*
SENSACIÓN, ilusiones de la: *Magnes. phos.*
SENSIBILIDAD: *Kali phos., Silicea.*
SENTIDOS, ilusiones de los: *Kali phos., Magnes. phos.*
SOLICITUD, deseos de: *Calc. phos.*
SOLLOZOS: *Magnes. phos.*
SONAMBULISMO: *Kali phos.*
SOPOR Y ESTUPOR en las enfermedades agudas: *Natr. mur.*
SUSPIROS: *Kali phos., Natr. mur.*
TEMOR DE CAER: *Kali sulph.*
TEMOR NERVIOSO: *Kali phos.*

TEMORES VIOLENTOS EN LOS NIÑOS POR LA NOCHE: *Kali phos.*
TEMORES DE RUINA EN LOS NEGOCIOS: *Calc. fluor.*
TENDENCIA SUICIDA: *Natr. sulph.*
TERRORES nocturnos en los niños: *Kali phos.*
TIMIDEZ: *Kali phos.*
TRISTEZA CON PALPITACIÓN DEL CORAZÓN: *Natr. mur.*
USA PALABRAS OFENSIVAS EN LA ESCRITURA Ó AL HABLAR: *Kali phos.*
VEJACIÓN, efectos de una: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
VIOLENTAS EMOCIONES, causando la histeria: *Kali phos.*
VISIONES IMPORTUNAS DEL PASADO: *Kali phos.*

CABEZA, SENSORIO Y CUERO CABELLUDO.

AFLUJO DE SANGRE Á LA CABEZA: *Ferr. phos. Natr. sulph.*
AGRAVACIÓN DEL DOLOR DE CABEZA POR EL MOVIMIENTO: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
mejorada por él: *Kali phos.*
ANEMIA, cerebral: *Kali phos.*
APOPLEGÍA CEREBRAL: *Silicea.*
ARDOR EN EL VÉRTICE DE LA CABEZA: *Natr. sulph.*
BOCA LLENA DE SALIVA: *Natr. mur.*
CABELLO, caída del: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
doloroso al peinarse: *Natr. sulph.*, *Ferr. phos.*
CABEZA, occipucio, dolorido: *Kali phos.*
cabeceo involuntario hacia adelante: *Natr. mur.*
huesos largos separados: *Calc. phos.*

CABEZA, plenitud de la: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
presión sobre la: *Calc. phos.*
presión y calor en el vértice de la: *Natr. phos.*
sensación de frío al tacto: *Calc. phos.*
sudores de la, en los niños: *Calc. phos.*, *Silicea.*

CAÍDAS Ó TRAUMATISMOS, efectos de: *Natr. sulph.*

CAÍDA DEL CABELLO: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*

CALOR EN EL VÉRTICE: *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*

CALOR DEL SOL: malos resultados del: *Ferr. phos.*

CASPA: *Kali sulph.*, *Magnes.*, *phos.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*

CEFALALGIA OBTUSA, DEL LADO DERECHO: *Ferr. phos.*

CEFALALGIAS CONGESTIVAS: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Silicea*, *Natr. mur.*

CEFALALGIA MENSTRUAL CON SENSACIÓN DE HAMBRE: *Kali phos.*

CEFALALGIA OCCIPITAL: *Natr. phos.*, *Silicea*, *Kali phos.*, *Natr. sulph.*

CEFALALGIAS DE LA CORONILLA: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*

CEFALALGIA, acompañada por: apariencia de masas sobre el cuero cabelludo: *Silicea.*
antes y después de la menstruación: *Natr. mur.*
paseando: *Natr. mur.*
bilis, vómito de: *Natr. sulph.*
agotamiento: *Kali phos.*
cara y ojos encendidos: *Ferr. phos.*
constipación: *Natr. mur.*

CEFALALGIA, acompañada por: chispas ante los ojos: *Magnes. phos.*
defectos ópticos: *Magnes. phos.*
desaliento: *Kali phos.*
desvanecimiento: *Natr. sulph.*
diarrea biliosa: *Natr. sulph.*
dilatación: *Kali phos.*
dolores cólicos: *Natr. sulph*
dolores atormentadores: *Magnes. phos.*
dolores ambulantes: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*
dolores punzantes: *Magnes. phos.*
dolores picantes: *Magnes. phos.*
dolencia del tacto: *Ferr. phos.*
expectoración de mucus blanco: *Kali mur.*
— mucus acuoso: *Natr. mur.*
flatulencia: *Calc. phos.*
insomnio: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
irritabilidad, *Kali phos.*
lengua saburral: *Ferr. phos.*
mucha saliva en la boca: *Natr. mur.*
náusea: *Calc. sulph.*, *Natr. phos.*
— y calosfrío: *Magnes. phos.*
náusea debilitante: *Calc. fluor.*
neuralgía: *Kali phos*, *Magnes. phos.*
olvido: *Calc. phos.*
pesadez: *Calc. phos.*
plenitud de la cabeza: *Calc. phos.*
profusión de lágrimas: *Natr. mur.*
pulsación en el vértice de la cabeza: *Natr. sulph.*

CEFALALGIA, acompañada por: sabor amargo en A. M.: *Natr. sulph.*
sensación de frío en la cabeza: *Calc. phos.*, *Silicea.*
sensación de vacuidad en el estómago: *Kali phos.*
sensación de postración: *Kali phos.*
sensación palpitante: *Ferr. phos.*, *Silicea.*
sensibilidad al ruido: *Kali phos.*
somnolencia: *Natr. mur.*
tendencia á los síntomas espasmódicos: *Magnes. phos.*
vértigo: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Silicea.*
vómito: *Kali mur.*
— con bostezos: *Kali phos.*
— de alimentos sin digerir: *Ferr. phos.*
— de mucus blanco: *Kali mur.*
— fatigoso: *Kali phos.*
— flema transparente: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
— substancia ácida: *Natr. phos.*
— viscoso: *Natr. phos.*
después de la menstruación: *Natr. mur.*
paseando: *Natr. mur.*
agravada por: el cambio de tiempo: *Calc. phos.*
— al anochecer: *Kali sulph.*
— al inclinarse: *Ferr. phos.*
— el frío: *Calc. phos.*
— el calor: *Calc. phos.*
— el ruido: *Silicea.*

CEFALALGIA, en un cuarto caliente: *Kali sulph.*
esfuerzo: *Silicea.*
esfuerzo mental: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*, *Silicea.*
la luz: *Silicea.*
movimiento: *Natr. sulph*, *Ferr. phos.*
moviendo la cabeza de un lado á otro ó hacia atrás: *Kali sulph.*
la lectura: *Natr. sulph.*
la presión del sombrero: *Calc. phos.*
sacudiendo la cabeza: *Ferr. phos.*
mejorada por: una emoción alegre: *Kali phos.*
— comiendo: *Kali pkos.*
— el frío: *Ferr. phos.*
— el calor exterior: *Magnes. phos.*, *Silicea.*
— al aire frío: *Kali sulph.*
— envolviendo fuertemente la cabeza: *Silicea.*
— hemorragia nasal: *Ferr. phos.*
— la quietud: *Natr. sulph.*
— movimiento suave: *Kali phos.*
CEFALALGIA por acaloramiento: *Silicea.*
agravada por el frío: *Calc. phos.*
mejorada por él: *Fear. phos.*
aliviada al aire frío: *Kali sulph.*
antes y después de la menstruación: *Natr. mur.*
catarral: *Natr. mur.*
comenzando al anochecer: *Kali sulph.*

CEFALALGIA, comenzando en la mañana: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*
como de clavo introducido sobre el ojo: *Ferr. phos.*
con ceguera: *Ferr. phos.*
congestiva: *Ferr. phos.*, *Silicea.*
crónica: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
da principio al abscurecer: *Kali sulph.*
— en la mañana: *Natr. mur.*
durante la dentición: *Calc. phos.*
— la comida: *Kali phos.*
— los menstruos: *Natr. mur.*, *Natr sulph.*
el calor del sol: *Ferr. phos.*
el hambre: *Silicea.*
esfuerzo intelectual: *Magnes. phos.*, *Silicea.*
esfuerzo nervioso: *Silicea.*
obtusa: *Natr. mur.*
por pérdida de fluidos animales: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
pesadez opresiva en el vértice de la cabeza: *Ferr. phos.*
por el frío: *Ferr. phos.*
por irritación abdominal: *Silicea.*
por inclinar la cabeza hacia abajo: *Calc. phos.*
por predisposición gotosa: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
por traumatismos en la cabeza: *Natr. sulph.*
al despertar por la mañana: *Natr. phos.*
aliviada por movimiento suave: *Kali phos.*

CEFALALGIA, aliviada por la quietud: *Natr. Sulph.*
con sensación de martilleo: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
con pesadez: *Natr. mur.*
con paroxismos: *Magnes. phos.*
con náusea: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. sulph.*, *Kali phos.*
de las personas caquécticas: *Natr. mur.*, *Silicea.*
— gentes escrofulosas: *Silicea.*
— niños: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
— pálidas, sensibles, *Kali phos.*
de las muchachas de escuela: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
de los estudiantes: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*
de la nuca y vértice: *Silicea*, *Magnes. phos.*
del lado derecho: *Ferr. phos.*
del vértice: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
durando hasta el medio día: *Natr. mur.*
extendiéndose á la espina: *Magnes. phos.*
frontal: *Natr. phos.*
gástrica: *Calc. phos.*, *Natr. sulph*, *Silicea.*
intermitente: *Magnes. phos.*
menstrual, con necesidad de comer: *Kali phos.*
migraña: *Natr. mur.*, *Silicea.*
nerviosa: *Kali phos.*, *Silicea*, *Magnes. phos.*
neurálgica: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*
occipital: *Kali phos.*, *Magnes. phos*, *Natr. phos.*, *Silicea*, *Natr. sulph.*

CEFALALGIA, peor cerca de las suturas: *Calc. phos.*
— del lado derecho: *Ferr. phos.*
reumática: *Calc. phos.*, *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*, *Silicea.*
sobre la coronilla: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*
durante la menstruación profusa: *Ferr. phos.*
súbita en sus principios: *Natr. sulph.*
CEFALOMATOMO: *Calc. fluor.*, *Silicea.*
CEREBRO, agua en el: *Kali phos.*
conmoción del: *Kali phos.*
desorden del, en los niños: *Magnes. phos.*
dolores violentos en la base del: *Natr. sulph.*
inflamación del, primer período: *Ferr. phos.*
reblandecimiento del: *Kali phos.*
se siente como si estuviese suelto el: *Natr. sulph.*
CONMOCIÓN DEL CEREBRO: *Kali phos.*
— consecuencias de la: *Natr. sulph.*
CONTUSIÓN DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO: *Calc. fluor.*
COSTRAS: amarillas, sobre el cuero cabelludo: *Calc. sulph.*
CRANIOTABES: *Calc. phos.*, *Calc. sulph.*
COSTRA LÁCTEA: *Kali mur.*
CUERO CABELLUDO, abundante descamación del: *Kali sulph.*
caspa: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*, *Kali sulph.*
dolorido: *Calc. phos.*
erupciones sobre el: *Ferr. phos.*

CUERO CABELLUDO: erupción con prurito en la raíz del pelo: *Natr. mur.*
erupciones húmedas sobre el: *Kali sulph.*
erupciones viscosas sobre el: *Kali sulph.*
escozor del: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
frío y doloroso: *Ferr. phos.*
láminas blancas sobre el: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*
muy sensible: *Natr. sulph.*
nódulos sobre el: *Silicea.*
pústulas con escozor sobre el: *Silicea.*
se siente áspero: *Magnes. phos.*
supuraciones del: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
tinea capitis: *Kali sulph.*, *Silicea.*
úlceras del: *Calc. phos.*
úlceras con bordes callosos: *Calc. fluor.*

DESFALLECIMIENTO CEREBRAL: *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*

DOLENCIA de la cabeza al tacto: *Ferr. phos.*

DOLOR DE CONTUSIÓN EN LA CABEZA: *Ferr. phos.*

DOLOR DESGARRANTE en los huesos del cráneo: *Calc. phos.*

DOLORES ATORMENTADORES EN LA CABEZA: *Magnes. phos.*

DOLORES PUNZANTES, *Ferr. phos.*

DOLOR, agravado por el calor: *Calc. phos.*
— por el frío: *Calc. phos.*
— moviéndose ó inclinándose: *Ferr. phos.*

DOLOR, agravado por la presión del sombrero: *Calc. phos.*
alrededor de la cabeza, peor en la frente: *Calc. sulph.*
ambulante, punzante, penetrante: *Magnes. phos.*
como si un clavo fuese introducido: *Ferr. phos.*
como si el cráneo estuviese demasiado lleno: *Natr. phos.*
con punzadas: *Ferr. phos.*
latente y contusivo: *Ferr. phos.*
occipital: *Kali phos.*
periódico: *Natr. mur.*
presivo: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
sobre lo alto de la cabeza: *Natr. phos.*
EFECTOS DE CAÍDAS ó traumatismos en la cabeza: *Natr. sulph*
ERUPCIÓN SOBRE EL CUERO CABELLUDO, escozor: *Natr. mur.*
sobre el occipucio, de olor desagradable: *Silicea.*
sobre la raíz del pelo en la nuca: *Natr. mur.*
ERUPCIÓN CON PRURITO SOBRE EL CUERO CABELLUDO: *Natr. mur.*
ESCROFULOSA, ULCERACIÓN DEL CUERO CABELLUDO: *Calc. phos.*
ESTUDIANTES, cefalalgia de los: *Kali phos.*
EXCRECENCIAS SOBRE EL CUERO CABELLUDO: *Calc. fluor.*

FLEMA TRANSPARENTE, vómito de: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*

FONTANELAS, permaneciendo abiertas: *Calc. phos.*, *Silicea.*

con ojos entreabiertos: *Kali phos.*

HEMICRÁNEA: *Natr. mur.*, *Silicea.*

HIDROCÉFALO: *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*

INSOLACIÓN: *Natr. mur.*

LA HEMORRAGIA NASAL alivia la cefalalgia: *Ferr. phos.*

MANCHAS DE CALVICIE: *Kali sulph.*, *Calc. phos.*

MASAS ELEVADAS SOBRE EL CUERO CABELLUDO: *Silicea.*

MEJORÍA bajo la influencia de una emoción alegre: *Kali phos.*

MENINGITIS: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*

MIGRAÑA: *Natr. mur.*, *Silicea.*

MUCUS ACUOSO, expectorado: *Natr. mur.*

MUCUS ACUOSO EXPECTORADO Ó VOMITADO: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*

MUCHACHAS ESCOLARES, cefalalgia de las: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*

NÓDULOS sobre la cabeza: *Silicea.*

PALPITACIÓN EN LA CABEZA: *Ferr. phos.*

PESO EN EL OCCIPUCIO: *Kali phos.*

PLENITUD DE LA CABEZA: *Calc. phos.*

RUIDO, sensibilidad para el: *Kali phos.*, *Silicea*, *Kali mur.*

RUIDOS EN LA CABEZA: *Kali phos.*

SALIVA PROFUSA, con síntomas cefálicos: *Natr. mur.*

SANGRE, aflujo á la cabeza: *Ferr. phos.*

SENSACIÓN DE FRÍO EN LA CABEZA. *Calc. phos.*

SENSACIÓN MORDICANTE en la base del cerebro: *Natr. sulph.*

SENSACIÓN COMO SI SE ABRIESE LA CABEZA: *Natr. mur.*

de presión en y al través de la cabez: *Natr. sulph.*

palpitante: *Ferr. phos.*

SÍNTOMAS ESPASMÓDICOS: *Magnes. phos.*

SUDOR DE LA CABEZA EN LOS NIÑOS: *Calc. phos.*, *Silicea.*

SUEÑO POCO REPARADOR con cefalalgia. *Kali phos.*, *Natr. mur.*

SUPURACIONES DEL CUERO CABELLUDO: *Calc. phos.*, *Silicea.*

TENDENCIA Á LOS SÍNTOMAS ESPASMÓDICOS: *Magnes. phos.*

TIÑA de los niños, secreción amarilla: *Calc. sulph.*, *Kali sulph.*, *Kali mur.*

TUMORES SANGUÍNEOS SOBRE EL CUERO CABELLUDO: *Calc. fluor.*

ULCERAS ESCROFULOSAS DEL CUERO CABELLUDO: *Calc. phos.*

con bordes callosos: *Calc. fluor.*

VÉRTICE DE LA CABEZA SENSIBLE AL AIRE FRÍO: *Ferr. phos.*

VÉRTIGO: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. sulph..*, *Silicea.*

por agotamiento nervioso. *Kali phos.*

por anemia: *Kali phos.*

VÉRTIGO en la vejez: *Calc. phos.*
laberíntico: *Silicea.*
al moverse y cuando anda: *Calc. phos.*
levantando la vista: *Kali sulph.*, *Kali phos.*
levantándose: *Kali sulph.*, *Kali phos.*
con mortales náuseas: *Calc. phos.*
con desarreglos gástricos: *Natr. phos.*
con aflujo de sangre á la cabeza: *Ferr. phos.*
con tendencia á caer al lado izquierdo: *Silicea.*
VÓMITO DE BILIS: *Natr. sulph.*
de espuma ácida: *Natr. phos.*
de viscosidad transparente: *Natr. mur.*
de alimento sin digerir: *Ferr. phos.*

OJOS.

ABSCESOS DE LA CÓRNEA: *Calc. sulph.*, *Silicea.*, *Kali mur.*, *Kali sulph.*
ABSCESOS PROFUNDOS DE LA CÓRNEA: *Kali sulph.*, *Silicea.*
AFECCIONES espasmódicas de los párpados: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
AGLUTINACIÓN DE LOS PÁRPADOS: *Natr. phos.*, *Silicea.*
AMARILLA, conjuntiva: *Natr. sulph.*
costras de los párpados: *Kali sulph.*
secreción de los ojos: *Calc. sulph.* *Kali mur.*, *Kali sulph.*
brillante y cremosa: *Natr. phos.*
AMAUROSIS: *Calc. phos.*

AMBLIOPÍA después de la supresión del sudor de los pies: *Silicea.*
de la difteria: *Kali phos.*

ANGULOS DEL OJO, INFLAMADOS: *Calc. sulph.*

APARIENCIA, de estremecimiento, excitada: *Kali phos.*

ARDOR de los bordes de los párpados: *Natr. sulph.*

ARENA, sensación de, en los ojos: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Kali phos.*

ASTENOPIA, muscular: *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Magnes. phos.*

BIZQUERA, después de la difteria: *Kali phos.*
espasmódica: *Magnes. phos.*
por irritación intestinal: *Natr. phos.*

BLANCA, secreción mucosa de los ojos: *Kali mur.*

BLEFARITIS: *Natr. mur.*, *Silicea.*

BORDES DE LOS PÁRPADOS ARDIENTES: *Natr. sulph.*

CÁMARA ANTERIOR, pus en la: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Silicea.*

CATARATA: *Calc. flour.*, *Calc. phos.*, *Kali. sulph.*, *Kali mur.*
después de suprimirse el sudor de los pies: *Silicea.*
pus humoso, en la cámara anterior: *Calc. sulph:*

CEGUERA: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*

CHISPAS ante los ojos: *Calc. flour.*, *Magnes. phos.*, *Natr. phos.*

COLOR ENCARNADO de los ojos: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph*

CONJUNTIVA encarnada ó amarilla: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*

CONJUNTIVITIS: *Calc. flour.*, *Ferr. phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*

crónica: *Natr. sulph.*

flictenular: *Calc. sulph.*

granular: *Natr. phos.*

secretando mucus blanco: *Natr. mur.*

— verdoso: *Natr. sulph.*

— amarillo, cremoso: *Natr. phos.*

CÓRNEA, abscesos de la: *Calc. sulph.*, *Silicea*, *Kali sulph.*, *Kali. mur.*

primer período: *Ferr. phos.*

ahumada: *Calc. sulph.*

úlcera escrofulosa: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*

— superficial, plana: *Kali mur.*

flictenas sobre la: *Natr. mur.*, *Kali mur.*

manchas sobre la: *Calc. flour.*, *Natr. sulph.*

— blancas: *Natr. mur.*

— opacas: *Calc. phos.*, *Silicea.*

úlceras profundas sobre la: *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*

CONSECUENCIAS TRAUMÁTICAS del ojo: *Calc. sulph.*

CONTRACCIÓN DE LAS PUPILAS: *Magnes. phos.*

COSTRAS, amarillas, sobre los párpados: *Kali sulph.*

CROMATOPSIA: *Magnes. phos.*

CUANDO LEE, las letras se deslizan rápidamente: *Natr. mur.*

CUERPOS EXTRAÑOS, sensación de: *Calc. sulph.*

DEBILIDAD de la vista: *Kali phos.*

DESCARGAS MUCOSAS, blancas: *Kali mur.*
— — claras: *Natr. mur.*
DESTILACIÓN DE LOS PÁRPADOS: *Magnes. phos., Kali phos.*
DIFTERIA, estrabismo ó bizquera después de la: *Kali phos.*
DIPLOPIA: *Magnes. phos., Kali phos.*
DOLENCIA de los globos oculares: *Kali phos.*
DOLOR, como el producido por una astilla: *Calc. sulph.*
en los ojos. *Ferr. phos.*
en el globo del ojo, agravado por moverlo: *Ferr. phos.*
neurálgico: *Magnes. phos., Natr. mur.*
EL CALOR alivia las neuralgías: *Magnes. phos.*
ENFERMEDADES DEL APARATO LACRIMAL: *Silicea.*
ERUPCIÓN de pequeñas vesículas cerca de los ojos: *Natr. mur.*
ESCALDADURA, de las partes cercanas del ojo: *Natr. mur.*
ESCROFULOSA, OFTALMÍA: *Natr. phos.*
úlceras de la córnea: *Natr. mur.*
ESPASMÓDICAS, afecciones de los párpados: *Calc. phos., Magnes. phos.*
ESTRABISMO: *Kali phos., Magnes. phos., Natr. phos.*
ESTREMECIMIENTO de los párpados: *Magnes. phos., Calc. phos.*
EXCITADA, apariencia de estremecimiento de los ojos: *Kali phos.*
FLICTENAS sobre la córnea: *Natr. mur.*

FLICTENAS como granulaciones: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*

FLUCTUACIÓN luminosa ante los ojos: *Calc. flour.*

FOTOFOBIA: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*

FOTOPSIA: *Magnes. phos.*, *Calc. fluor.*

GASA ANTE LOS OJOS: *Natr. mur.*

GLAUCOMA: *Natr. mur.*

GLOBO DEL OJO, dolores en él, agravados por mover los párpados: *Ferr. phos.*

dolor continuo en los: *Calc. fluor.*

dolor en los, agravado por el movimiento: *Ferr. phos.*

dolencia de los: *Kali phos.*

GRANULAR, conjuntivitis: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*

— párpados: *Natr. mur.*

GRANULACIONES que parecen pequeñas flictenas: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*

HEMIOPIA: *Calc. sulph.*

HIPOPION: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Silicea.*, *Kali sulph.*, *Natr. phos.*

INFLAMACIÓN de los ángulos del ojo: *Calc. sulph.*

con secreción de materia amarilla: *Calc. sulph.*

con dolor agudo: *Ferr. phos.*

de los ojos: *Calc. phos.*

sin secreción: *Ferr. phos.*

seca: *Calc. phos.*

IRITIS. *Kali mur.*, *Natr. mur.*

KERATITIS, parenquimatosa: *Calc. phos.*, *Kali mur.*,
pustular: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
LACRIMAL GLÁNDULA, enfermedades de la: *Silicea.*
canal, estrechez del: *Natr. mur.*
LAGRIMEO: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
acre: *Natr. mur.*,
ardiente: *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*
con erupción de pequeñas flictenas: *Natr. mur.*
con neuralgia: *Natr. mur.*
peor después del uso del nitrato de plata: *Natr. mur.*
LAS LETRAS CORREN SIN INTERRUPCIÓN cuando se lee: *Natr. mur.*
LENTE, obscurecimiento del: *Kali sulph.*
LUZ, sensibilidad para la. (Véase Fotofobia).
MANCHAS sobre la córnea: *Calc. fluor.*
blancas: *Natr. mur.*
obscuras: *Magnes. phos.*
MANCHAS NEGRAS ante los ojos: *Kali phos.*
MANCHAS DE LOS OJOS: *Kali phos.*, *Calc. fluor.*
MANCHAS OBSCURAS ante los ojos: *Magnes. phos.*, *Kali mur.*
MIRADA FIJA, aspecto excitado: *Kali phos.*
MOSCAS VOLANTES: *Silicea.*
MOVIENDO LOS OJOS SE AGRAVA EL DOLOR: *Ferr. phos.*
MUSCULAR, ASTENOPIA: *Natr. mur.*, *Magnes. phos.*, *Kali phos.*
NEURALGÍA CILIAR: *Natr. mur.*
aliviada por el calor: *Magnes. phos.*

NEURALGÍA, peor del lado derecho: *Magnes. phos.*
periódica: *Natr. mur.*
con flujo de lágrimas: *Natr. mur.*
sobre el ojo derecho: *Silicea.*
supra-orbital: *Magnes. phos.*, *Ferr. phos.*
NEURALGÍAS SUPRA-ORBITALES: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*
NISTAGMUS: *Magnes. phos.*
NO PUEDE VERSE con la luz del gas: *Calc. phos.*
OBSCURECIMIENTO del lente cristalino: *Kali sulph.*
OBSTRUCCIÓN DEL CANAL LACRIMAL: *Natr. mur.*
OFTALMÍA, secreción cremosa: *Natr. phos.*
— espesa y amarilla: *Calc. sulph.*
escrofulosa: *Natr. phos.*
neonatorum: *Kali sulph.*
OJOS, afecciones de los ángulos del: *Silicea.*
afecciones espasmódicas de los: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
apariencia de estremecimiento: *Kali phos.*
costras amarillas en los: *Kali sulph.*
chispas delante de los: *Calc. fluor.*, *Magnes. phos.*
dolorosos: *Kali phos.*
dolor por encima de los: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*, *Magnes. phos.*
escozor de los: *Natr. mur.*
gasa ante los: *Natr. mur.*
inflamación de los, con dolor agudo: *Ferr. phos.*
— seca: *Calc. phos.*

OJOS, inflamación secretando mucus amarillo, espeso: *Calc. sulph.*
— sin secreción.
inyectados: *Natr. phos.*
latidos en los: *Kali phos.*
llega á borrarse la vista: *Kali phos.*
manchas de materia sobre los: *Kali mur.*
movimiento de luz vacilante ante los: *Calc. fluor.*
no puede usarlos en la luz artificial: *Calc. phos.*
orzuelos en los: *Silicea.*
prurito en los: *Magnes. phos.*
rojos: *Ferr. phos.*
sacudimiento de los: *Magnes. phos.*, *Calc. sulph.*
sensación ardiente en los: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
sensación de arena en los: *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Ferr. phos.*
sensación de cuerpo extraño en los: *Calc. sulph.*
sensibles á la luz: *Magnes. phos.*
vénse colores delante de ellos: *Magnes. phos.*
— chispas: *Calc. fluor.*, *Magnes. phos.*
OJOS INYECTADOS: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*
ONIX: *Kali mur.*
OPACIDAD DE LA CÓRNEA: *Calc. phos.*, *Silicea.*
ÓRBITAS, caries de las: *Silicea.*
presión y dolencia en las: *Silicea.*

OREZUELOS sobre los párpados: *Silicea*, *Ferr. phos.*
PARENQUIMATOSA, keratitis: *Calc. phos.*, *Kali mur.*
PÁRPADOS, aglutinados: *Natr. phos.*, *Silicea*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Calc. fluor.*
ardor en los: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
bordes de los, ardor en: *Natr. sulph.*
destilación de los: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*
granulación de los: *Natr. mur.*
tumores al rededor de los: *Silicea.*
tumores císticos al rededor de los: *Silicea.*
PÉRDIDA DEL PODER DE PERCEPCIÓN, después de agotamiento: *Kali phos.*
después de la difteria: *Kali phos.*
PODER PERCEPTIVO, pérdida del: *Kali phos.*
PTOSIS: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*
PUPILAS CONTRAÍDAS: *Magnes. phos.*
PUS EN LA CÁMARA ANTERIOR. (Véase Hipopion).
PUSTULAR, KERATÍTIS: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
RETINITIS: *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
SECRECIÓN de materia amarilla espesa: *Calc. sulph.*
amarillo-brillante, materia cremosa: *Natr. phos.*
amarilla, materia verdiosa: *Kali sulph.*, *Kali mur.*
mucus claro: *Natr. mur.*
mucus blanco: *Kali mur.*
pus verde: *Natr. sulph.*
verdiosa de los ojos: *Kali mur.*, *Kali sulph.*
purulenta de los ojos: *Calc. sulph.*, *Kali sulph.*

SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO: *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*
de piquetes en el ojo: *Kali phos.*
SENSIBILIDAD Á LA LUZ: *Magnes. phos.*
SEÑALES de materia sobre los párpados: *Kali mur.*
TRACOMA: *Kali mur.*
TUMORES DEL TARSO: *Silicea.*
TUMORES CÍSTICOS ALREDEDOR DE LOS PÁRPADOS: *Silicea.*
TUMORES alrededor de los párpados: *Silicea.*
ÚLCERAS PLANAS sobre la córnea: *Kali mur.*
ÚLCERAS PLANAS SUPERFICIALES: *Kali mur.*
ÚLCERAS sobre la córnea, profundas: *Calc. sulph.*
escrofulosas: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
superficiales, planas: *Kali mur.*
VESÍCULAS, erupción de: *Natr. mur.*
VISIÓN OFUSCADA: *Magnes. phos.*, *Natr. phos.*
VISIÓN AFECTADA, se ven colores: *Magnes. phos.*
borrada: *Calc. fluor.*
chispas: *Calc. fluor.*, *Magnes. phos.*
ofuscada: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*
VISTA, confusa: *Natr. phos.*
débil: *Kali phos.*

OIDOS.

AFECCIONES PERIÓSTICAS de las apófisis mastoides: *Calc. fluor.*
AGRAVACIÓN DEL DOLOR DE OÍDO POR EL TIEMPO HÚMEDO: *Natr. sulph.*

AL SONAR LA NARIZ, se producen ruidos de chasquidos: *Kali mur.*

ANQUILOSIS de los huecesillos: *Ferr. phos.*

APÓFISIS MASTOIDES, caries de la: *Silicea.*
dolores debajo de la: *Kali sulph.*
enfermedad de la: *Silicea.*
hinchada, dolorida: *Ferr. phos.*
periostio enfermo: *Calc. fluor.*

ARDORES de oídos: *Natr. phos.*

AUDICIÓN excesivamente sensible: *Kali phos.*

CANAL AUDITIVO, hinchado: *Silicea, Kali mur.*

CATARRO de la trompa de Eustaquio: *Kali sulph., Natr. mur., Kali mur.*
de la cavidad timpánica: *Kali sulph., Natr. mur., Kali mur.*

COLOR ROJO-OBSCURO de las partes interiores: *Ferr. phos.*

CONFUSIÓN en los oídos: *Kali phos.*

DEPÓSITO de materia calcárea en el tímpano: *Calc. fluor.*

DEPÓSITOS CALCÁREOS en la cavidad timpánica: *Calc. fluor.*

DESCARGAS DEL OÍDO, amarillo-brillante: *Kali phos.*
asquerosa: *Kali phos.*
fétida: *Kali phos.*

DESCARGAS MUCO-PURULENTAS: *Ferr. phos.*

DOLENCIA DE OÍDOS: *Natr. phos.*

DOLOR DE HUESOS alrededor del oído: *Calc. phos.*

DOLOR DE OÍDO, inflamatorio, por el frío: *Ferr. phos.*

DOLOR, ardiente: *Ferr. phos.*

DOLOR, cortante bajo la oreja: *Kali sulph.*
palpitante: *Ferr. phos.*
paroxísmico, irradiante y agudo: *Ferr. phos.*
punzante: *Ferr. phos.*, *Kali sulph.*
tensivo bajo la apófisis mastoides: *Kali sulph.*
DOLORES INCISIVOS en el oído: *Ferr. phos.*
debajo del oído: *Kali sulph.*
DOLORES PENETRANTES en el oído: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*
bajo del mismo: *Kali sulph.*
DOLORES PUNZANTES en los oídos: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*
ENFERMEDADES REUMÁTICAS DEL OÍDO: *Calc. phos.*
ENTORPECIMIENTO DE LA AUDICIÓN: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
por trastornos nerviosos: *Magnes. phos.*
ESCOZOR DE LOS OÍDOS: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
en el canal auditivo: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
ESTADOS CATARRALES CRÓNICOS DEL OÍDO MEDIO: *Kali mur.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*
ESTALLIDOS en el oído: *Kali mur.*
EXCESIVO AFLUJO DE SANGRE á los oídos: *Ferr. phos.*
granulaciones dentro de los oídos: *Kali mur.*
EXCRESENCIA, polipoide, estrechando el oído: *Kali sulph.*
EXFOLIACIÓN, húmeda, del tímpano: *Kali mur.*
GARGANTA HINCHADA: *Kali mur.*, *Kali sulph.*
GLÁNDULAS hinchadas alrededor del oído: *Kali mur.*
GRANOS alrededor del oído: *Calc. sulph.*
GRANULACIONES, excesivas: *Kali mur.*

HINCHAZÓN de las trompas de Eustaquio: *Kali mur.*, *Silicea.*
de la cavidad timpánica: *Natr. mur.*, *Silicea.*
oído externo: *Kali mur.*
meato externo: *Silicea.*
glándulas inmediatas á los oídos: *Kali mur.*
garganta: *Kali mur.*, *Kali sulph.*

HUESOS doloridos alrededor del oído: *Calc. phos.*

INDIVIDUOS ANÉMICOS, sufrimientos del oído en los: *Ferr. phos.*

INFLAMACIÓN DIFUSA: *Ferr. phos.*
del oído externo: *Kali mur.*, *Silicea*, *Ferr. phos.*
del oído medio, proliferosa: *Kali mur.*
con dolor palpitante, ardiente: *Ferr. phos.*

INFLAMACIÓN PROLIFEROSA DEL OÍDO MEDIO: *Kali mur.*, *Magnes. phos.*

INFLAMATORIA, otalgia: *Ferr. phos.*

IRRADIANTES, DOLORES: *Ferr. phos.*

LAS SECRECIONES DEL OÍDO, no dan alivio al dolor: *Ferr. phos.*
son muco-purulentas: *Ferr. phos.*
desagradables: *Kali phos.*
purulentas: *Calc. phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*
mezcladas con sangre: *Calc. sulph.*, *Kali phos.*
espesas, como pus: *Calc. sulph.*
de materia acuosa: *Kali sulph.*

LA SORDERA SE AGRAVA EN UNA HABITACIÓN CALIENTE: *Kali sulph.*

LA PARTE EXTERIOR DEL OÍDO ESTÁ CUBIERTA CON DEPÓSITOS DELGADOS: *Natr. phos.*

LAS PARTES INTERIORES DEL OÍDO ROJO-OBSCURAS: *Ferr. phos.*

MARTILLEO en los oídos: *Kali phos.*

MEATO EXTERNO hinchado: *Silicea, Kali mur.*

paredes atrofiadas: *Kali mur.*

MEATO ESTRECHADO por excrecencia polipoide: *Kali sulph.*

interior, estado granular del: *Kali mur.*

MEMBRANA TIMPÁNICA, depósitos calcáreos sobre la: *Calc. fluor.*

engrosada: *Ferr. phos.*

exfoliación, humedad de la: *Kali mur.*

granular: *Kali mur.*

húmeda: *Kali mur.*

inflamación, proliferosa de la: *Kali mur., Magnes. phos.*

obscura, como carne roja: *Ferr. phos.*

retraída: *Kali mur.*

ulcerada: *Kali phos.*

NERVIOSA, otalgia: *Magnes phos.*

NIÑOS ESCROFULOSOS, sufrimientos del oído en los: *Calc. phos.*

OBSTRUCCIONES NASO-FARÍNGEAS: *Kali mur.*

OÍDOS, afecciones de los, en las personas anémicas: *Ferr. phos.*

niños escrofulosos: *Calc. phos.*

Oídos, personas reumáticas: *Calc. phos.*
ardor: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
atrofia, molestias de la: *Kali phos.*
calor en los: *Ferr. phos.*
crujido en los: *Kali mur.*
cubiertos con costras delgadas: *Natr. phos.*
dolor agudo, incisivo, debajo de los: *Kali sulph.*
doloridos al exterior: *Natr. phos.*
estallidos en los: *Kali mur.*
epidermis seca y escamosa: *Kali mur.*
externos, inflamaciones de los: *Silicea.*
flujo excesivo de sangre á los: *Ferr. phos.*
granos alrededor de los: *Calc. sulph.*
inflamación de los, después del baño: *Silicea.*
medio, supuración del: *Calc. sulph.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
prurito de los: *Natr. phos.*
prurito en los: *Natr. mur.*
pulsación percibida en el oído: *Ferr. phos.*
punzadas en los: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.* *Natr. sulph.*
retintín en los, como de campanas: *Natr. sulph.*
rugidos en los: *Natr. mur.*
ruidos en los: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*
ruido sordo y monótono en los: *Kali phos.*
se abren con rumor estrepitoso: *Silicea.*
sensación de frío al exterior: *Calc. phos.*

OÍDOS, sensación de obstrucción en los: *Kali mur.*
tendencia á la atrofia de las paredes: *Kali mur.*
hinchazón de las paredes: *Kali mur.*
tensión y latido en los: *Ferr. phos.*
una oreja roja, caliente, con escozor: *Natr. phos.*
zumbido en los: *Kali phos.*

OÍDO MEDIO, supuración del: *Calc. sulph., Kali phos., Silicea.*
estados catarrales crónicos: *Kali mur.*

OTALGIA NERVIOSA: *Magnes. phos.*
con dolor ardiente: *Ferr. phos.*
dolor palpitante: *Ferr. phos.*
dolor punzante, agudo: *Ferr. phos.*
estados nerviosos: *Magnes. phos.*
hinchazón de las glándulas: *Kali mur., Calc. phos.*
lengua blanca: *Kali mur.*
peor en el tiempo húmedo: *Natr. sulph.*
pulsaciones: *Ferr. phos.*

OTALGIA, secreción de materia amarillenta: *Kali sulph.*
sensación como si alguna cosa se esforzase por salir: *Natr. sulph.*

OTITIS, congestiva, período de la: *Ferr. phos.*
supurativa: *Calc. sulph., Kali phos., Silicea.*

OTORREA, sucia, desagradable: *Kali sulph., Silicea, Kali phos., Calc. phos.*

OTORREA, de mal olor, apestosa: *Kali phos.*, *Silicea*; *Kali sulph.*

PADECIMIENTOS, REUMÁTICOS, de los oídos: *Calc. phos.*

PALPITANTE, dolor: *Ferr. phos.*

PERÍODO CONGESTIVO DE LA OTITIS: *Ferr. phos.*

PUEDEN CONTARSE LAS PULSACIONES EN EL OÍDO: *Ferr. phos.*

PULSACIÓN NOTABLE en los oídos: *Ferr. phos.*

QUEDÁNDOSE DORMIDO, ruidos: *Kali phos.*

RUIDOS DE CHASQUIDO al deglutir: *Kali mur.*

masticando: *Natr. mur.*

sonándose: *Kali mur.*

RUIDO, exceso de sensibilidad para el: *Silicea, Ferr. phos., Kali phos.*

RUIDERA EN LOS OÍDOS: *Ferr. phos*, *Kali mur.*, *Kali phos.*

al sonarse: *Kali mur.*

al quedarse dormido: *Kali phos.*

de crujido al deglutir: *Kali mur.*, *Natr. mur.*

RUGIDOS EN LOS OÍDOS: *Natr. mur.*, *Silicea.*

SECRECIÓN PURULENTA del oído: *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Silicea.*, *Calc. sulph.*

desagradable: *Kali phos.*, *Kali sulph.*, *Silicea.*

SECRECIONES FÉTIDAS Ó SUCIAS del oído: *Kali phos.*

SENSACIÓN DE FRÍO en el exterior de los oídos: *Calc. phos.*

SENSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN en los oídos: *Kali mur.*

SENSIBILIDAD EXCESIVA PARA EL RUIDO: *Silicea*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*

SORDERA, por acción inflamatoria: *Ferr. phos.*
trastornos nerviosos: *Magnes. phos.*
hinchazón de las trompas de Eustaquio: *Kali mur.*, *Kali sulph.*, *Silicea.*
del oído externo: *Kali mur.*
de las glándulas cerca de los oídos: *Kali mur.*
del oído interno: *Kali sulph.*
de la garganta: *Kali sulph.*
de la cavidad timpánica: *Natr. mur.*, *Silicea.*
supuración: *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Silicea*, *Kali mur.*, *Kali phos.*
falta de percepción: *Kali phos.*
peor en una habitación caliente: *Kali sulph.*
SUFRIMIENTOS POR ATROFIA DEL OÍDO: *Kali phos.*
escozor en el oído: *Kali phos.*
SUPURACIÓN DEL OÍDO MEDIO: *Calc. sulph.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
TAÑIDOS en los oídos como de campana: *Natr. sulph.*
TENDENCIA Á LA HEMORRAGIA: *Ferr. phos.*
TENSIÓN EN LOS OÍDOS: *Ferr. phos.*
TEJIDOS privados de humedad: *Kali phos.*
que llegan á cubrirse de escamas: *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Calc. phos.*
tímpano en estado de granulación: *Kali mur.*
con faringitis: *Kali mur.*
TÍMPANO RETRAÍDO: *Kali mur.*
cavidad del, estado catarral: *Natr. mur.*, *Kali sulph.*, *Kali mur.*
hinchado: *Natr. mur*, *Silicea.*

TIMPANO ulcerado: *Kali mur.*
TINITUS AURIUM: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*
TRAGANDO, ruidos de crujido: *Kali mur.*
TROMPAS DE EUSTAQUIO, catarro de las: *Natr. mur.*, *Kali mur.*, *Kali sulph.*, *Silicea.*
estrechadas: *Kali mur.*
hinchadas y ocasionando sordera: *Kali mur.*, *Kali sulph.*, *Silicea.*
UNA OREJA ENCARNADA, caliente y con prurito: *Natr. phos.*
ULCERACIONES DE FORMA LENTA: *Kali phos.*
ULCERACIONES inflamadas: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
ULCERACIONES, membrana timpánica: *Kali phos.*
con secreción blanquizca: *Kali mur.*
ZUMBIDOS en los oídos: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*

NARIZ.

ALTERACIÓN DEL SENTIDO DEL OLFATO: *Magnes. phos.*
ARDOR EN LA NARIZ: *Natr. sulph.*
BORDES DOLORIDOS de las ventanas de la nariz: *Calc. sulph.*
CARIES DE LOS HUESOS NASALES: *Silicea.*
CATARROS: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
antiguo nasal, con pérdida del olfato: *Natr. mur.*
con agravación general por la mañana: *Natr. mur.*
constipado, seco: *Kali sulph.*

CATARROS, crónico: *Natr. mur. Silicea.*
naso-faríngeo: *Natr. phos.*
posterior de las fosas nasales: *Natr. phos.*
sensación de destilación: *Ferr. phos.*
CATARROS SECOS antiguos: *Kali sulph.*
COMEZÓN DESAGRADABLE EN LAS FOSAS POSTERIORES: *Natr. phos.*
COMENZÓN DE LAS VENTANAS DE LA NARIZ: *Natr. sulph.*
CONGESTIÓN DE LA MEMBRANA MUCOSA NASAL: *Ferr. phos.*
CONSTIPADOS que causan erupciones vesiculares: *Natr. mur.*
con obstrucción: *Calc. fluor.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*, *Kali sulph.*
en los sujetos anémicos: *Calc. phos.*
en la cabeza: *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*, *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Magnes. phos.*
predisposición para los: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
CORIZA, crónico: *Silicea.*
claro acuoso: *Natr. mur.*
seco: *Calc. fluor.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*
seco y flojo alternativamente: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*
amarillo, viscoso: *Kali sulph.*
COSTRAS adheridas á la bóveda de la laringe: *Kali mur.*
en la nariz: *Natr. mur.*, *Silicea.*

COSTRAS de mal olor, amarillas: *Kali phos.*
COSTRAS ADHERENTES, en la faringe: *Kali mur.*
DESCARGAS NASALES, acre: *Silicea.*
acuosa: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*
albuminosa: *Calc. phos.*
amarilla: *Calc. fluor.*, *Calc. sulph.*, *Kali sulph.*, *Natr. phos.*, *Kali phos.*
blanca: *Kali mur.*
clara: *Natr. mur.*
corrosiva: *Silicea.*
de un lado: *Calc*, *sulph.*
de gusto salado: *Natr. mur.*
desagradable: *Calc. fluor.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
espesa: *Calc. fluor.*, *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Kali sulph.*, *Kali phos.*
fétida: *Kali phos.*, *Silicea.*
fluyendo copiosamente: *Magnes. phos.*
grumosa: *Calc. fluor.*
no transparente: *Kali mur.*
opaca, blanca: *Kali mur.*
pegajosa: *Kali sulph.*
purulenta: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
teñida con sangre: *Calc. sulph.*
verdosa: *Calc. fluor.*, *Kali sulph.*
viscosa: *Kali sulph.*
DESEO INEFICAZ para estornudar: *Calc. fluor.*
EL MOCO TIENE un gusto salado: *Natr. mur.*
EL BAJAR LA CABEZA produce hemorragia nasal: *Natr. mur.*
EPISTAXIS: *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Ka-*

li sulph., *Natr. phos*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*

EPISTAXIS durante los menstruos: *Natr. sulph.*
en los niños: *Ferr. phos*
por toser: *Natr. mur.*
por bajar la cabeza: *Natr. mur.*
predisposición á la: *Kali phos.*
sangre roja-brillante: *Ferr. phos.*

ERUPCIONES vesiculosas, con constipado: *Natr. mur.*
herpéticas, alrededor de la nariz: *Silicea.*

ESCAMAS EN LA NARIZ: *Natr. mur.*

ESCOZOR: *Magnes. phos.*
en el conducto derecho nasal: *Ferr, phos.*

ESCURRIMIENTO NASAL: *Natr. mur.*

ESTORNUDOS: *Silicea*, *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
deseo ineficaz para los: *Calc. fluor.*
por la más ligera exposición al aire: *Kali phos.*

ESCORIACIONES en la nariz: *Silicea.*

EXPECTORACIÓN de moco de las fosas nasales posteriores: *Kali phos.*

FARINGE, costras adherentes en la: *Kali mur.*

FIEBRE CATARRAL: *Ferr. phos.*

FIEBRE DE HENO: *Natr. mur.*

FOSAS POSTERIORES NASALES, secas: *Natr. mur.*
expectoración de moco por las: *Kali phos.*
secreción amarilla por las: *Kali sulph.*

FRIALDAD DE LA PUNTA DE LA NARIZ: *Calc. phos.*

GRANOS EN LA NARIZ: *Natr. mur.*

HEMORRAGIA NASAL producida por la tos: *Natr. mur.*

HEMORRAGIA NASAL durante los menstruos: *Natr. sulph.*

HINCHAZÓN de la membrana mucosa: *Silicea.*

HUESOS DE LA NARIZ, caries de los: *Silicea.*
enfermos: *Calc. fluor.*

HUESOS NASALES, afecciones de los: *Calc. fluor.*
caries de los: *Silicea.*
catarro, secreción espesa: *Calc. fluor.*
expectoración de moco salado: *Natr. sulph.*
pólipo, grande y pedunculado: *Calc. phos.*

INFLUENZA: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*

LA EXTREMIDAD DE LA NARIZ está fría: *Calc. phos.*
roja y con picazón: *Silicea.*

MEMBRANA MUCOSA congestionada: *Ferr. phos.*
hinchada: *Silicea.*
seca: *Silicea.*

NARIZ, alas de la: *Natr. sulph.*
color encarnado de la, con granos: *Natr. mur.*
comezón en la punta: *Silicea*, *Natr. phos.*
costras en la: *Natr. mur.*, *Silicea.*
escoriaciones en la: *Silicea.*
frío en la punta: *Calc. phos.*
hinchada, costras y escamas en la: *Natr. mur.*
obstruida: *Kali sulph.*, *Natr. sulph.*
picazón en la: *Natr. phos.*
sequedad y ardor en la: *Natr. sulph.*
se siente adormecida en un lado: *Natr. mur.*

NARIZ, tapazón de la: *Calc. fluor.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*, *Kali sulph.*
ulcerada en las personas escrofulosas: *Calc. phos.*
un lado adormecido: *Natr. mur.*
NARIZ HINCHADA en los niños escrofulosos: *Calc. phos.*
NARIZ ULCERADA en los niños escrofulosos: *Calc. phos.*
NIÑOS ESCROFULOSOS, afecciones nasales en los: *Calc. phos.*
OBSTRUCCIÓN DE LA NARIZ: *Kali sulph.*, *Kali mur.*
OBSTRUCCIÓN CATARRAL: *Calc. fluor.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*
OLFATO PERDIDO Ó PERVERTIDO: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
OLOR, desagradable, por la nariz: *Calc. fluor.*, *Kali phos.*, *Natr. phos.*
OSEAS, VEGETACIONES: *Calc. fluor.*
OZENA: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Silicea*, *Kali sulph.*
sifilítico: *Natr. sulph.*
PACIENTES ANÉMICOS, resfriados en los: *Calc. phos.*
PALIDEZ alrededor de la nariz: *Natr. phos.*
PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL OLFATO: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
PERIOSTIO DE LOS HUESOS NASALES, afectado: *Silicea.*
PICAZÓN EN LA NARIZ: *Natr. phos.*
PÓLIPO, grande y pedunculado: *Calc. phos.*
PREDISPOSICIÓN á los resfriados: *Ferr. phos.*

PREDISPOSICIÓN á la hemorragia nasal: *Kali phos.*
PRIMER PERÍODO DEL ROMADIZO: *Ferr. phos.*
PRODUCCIÓN DE COSTRAS EN LA NARIZ: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
PRURITO de la punta de la nariz: *Silicea*, *Natr. phos.*
en la ventana de la nariz: *Natr. sulph.*
PUNTA DE LA NARIZ, fría: *Calc. phos.*
ROJEZ de la nariz: *Natr. mur.*
en la punta: *Silicea.*
SANGRE POR LA NARIZ: *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*, *Calc. phos.*
después de arrojar costras amarillas espesas por la nariz: *Kali phos.*
de color rojo-brillante: *Ferr. phos.*
durante los menstruos: *Natr. sulph.*
en los niños: *Ferr. phos.*
por toser ó inclinarse: *Natr. mur.*
por las tardes: *Kali mur.*
predisposición á la: *Kali phos.*
SECRECIÓN ACRE de la nariz: *Silicea.*
SECRECIÓN ALBUMINOSA: *Calc. phos.*
SECRECIÓN FÉTIDA de la nariz: *Kali phos.*, *Silicea.*
SECRECIÓN VERDOSA: *Calc. fluor.*, *Kali sulph.*
SEQUEDAD de la membrana mucosa: *Natr. sulph.*, *Silicea.*
fosas nasales posteriores: *Natr. mur.*
ULCERACIÓN DE LA NARIZ, inveterada: *Silicea*, *Kali phos.*

VEGETACIONES, óseas: *Calc. fluor.*
VENTANAS DE LA NARIZ, prurito de las: *Silicea.*
dolencia de las: *Calc. phos.*, *Calc. sulph.*

CARA.

ACNÉ: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Silicea.*, *Kali sulph.*
AGRAVACIÓN de los síntomas de la cara por la noche: *Calc. phos.*
ALIVIO POR LAS APLICACIONES FRÍAS: *Ferr. phos.*
AMARILLENTO, semblante: *Calc. phos.*, *Natr. sulph.* *Kali phos.*
ASPECTO hipocrático: *Kali phos.*
ASPECTO MANCHADO de la cara: *Calc. phos.*
ASPECTO GRASIENTO de la cara: *Calc. phos.*
BARBA, erupciones sobre la: *Natr. mur.*
BLANCO-VERDOSA, cara: *Calc. phos.*
CAÍDA del pelo de la barba: *Natr. mur.*
CARA CUBIERTA DE PÚSTULAS: *Natr. phos.*
CARA CIANÓTICA: *Natr. phos.*
CARA CLORÓTICA: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
CARA TERROSA: *Calc. phos.*, *Silicea*, *Ferr. phos.*
CARA, abochornada: *Ferr. phos.*
agrietada: *Silicea.*
amarillenta: *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*
anémica: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
ardiente: *Kali phos.*
aspecto manchado: *Calc. phos.*
barros en la: *Kali phos.*

CARA, blanco-verdosa: *Calc. phos.*
blanca alrededor de la nariz: *Natr. mur.*
brillante, viva: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*
cetrina: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Natr sulph*, *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
clorótica: *Calc. phos.*, *Ferr. phos*
cubierta con vesículas: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
enfermiza y hundida: *Kali phos*
erupciones herpéticas en la: *Calc. sulph.*
facciones torcidas: *Kali sulph.*, *Kali phos.*
frío de las partes salientes: *Calc. phos.*
grasienta: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
ictérica: *Natr. sulph.*
lívida: *Kali phos.*
llena de granos: *Calc. phos.*, *Silicea*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*
si se forma materia: *Calc. sulph.*
pálida: *Kali phos.*, *Silicea*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*, *Calc. phos.*, *Kali sulph.*, *Ferr. phos.*
plomiza: *Natr. mur.*
prurito en la: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
pustulosa y cianótica: *Natr. phos.*
pústulas sobre la frente: *Natr. mur.* *Calc. sulph.*, *Kali phos.*
roja: *Natr. phos.*, *Kali phos.*, *Ferr. phos.*
roja: con facciones desviadas: *Kali sulph.*
semejante á la cera: *Calc. phos.*

CARA, sudando mientras come: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
frío al comer: *Calc. phos.*
terrosa: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*, *Silicea.*
turgencia de la: *Kali mur.*
vesículas sobre la: *Natr. sulph.*

CARIES del maxilar inferior: *Silicea.*

CARRILLOS, calientes y doloridos: *Ferr. phos.*
hinchazón de los: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*
hinchazón dura de los: *Calc. fluor.*

CETRINO, color de la cara: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*

COLOR DEL ROSTRO. (Véase Cara).

COLOR BLANCO alrededor de la nariz: *Natr. phos.*

CONTORSIONES por pérdida del poder de los músculos faciales: *Kali phos.*

DESPUÉS DE LA QUININA, neuralgia: *Natr. mur.*

DOLOR DE LA CARA, agravado cuando el cuerpo se enfría: *Magnes. phos.*
peor en el lado derecho: *Magnes. phos.*
después de ir á la cama: *Magnes, phos.*
en una habitación caliente: *Kali sulph.*
al anochecer: *Kali sulph.*
al moverse: *Ferr. phos.*
mejorado al aire frío: *Kali sulph.*
por aplicaciones frías: *Kali phos.*, *Ferr. phos.*
por el calor: *Magnes. phos.*, *Silicea.*
por hinchazón: *Kali mur.*

DOLOR DE LA CARA, en el maxilar superior: *Calc. phos.*
lado derecho del maxilar inferior: *Natr. phos.*
neurálgico: *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Natr. phos.*
en el hueso cigomático: *Natr. sulph.*
con constipación: *Natr. mur.*
con frialdad de la nuca: *Ferr. phos.*
con grande agotamiento: *Kali phos.*
con bochornos: *Ferr. phos.*
con masas ó nódulos sobre la cara: *Silicea.*
agravado después de acostarse: *Magnes. phos.*
incisivo: *Magnes. phos.*
en las mejillas: *Kali mur.*
en el hueso del maxilar superior: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
de sacudida: *Magnes. phos.*
como relámpago: *Magnes. phos.*
presivo: *Ferr. phos.*
aliviado por el calor: *Magnes. phos.*
aliviado por el frío: *Kali phos.*
latente: *Ferr. phos.*

DOLORES INCISIVOS en la cara: *Magnes. phos.*
como de sacudimiento en la cara: *Magnes. phos.*

EL CALOR MODERADO alivia el dolor de la cara: *Magnes. phos.*

ENCARNADO, color, de la cara: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*

ENFERMIZO, aspecto de la cara: *Kali. phos.*, *Calc. phos.*

EPITELIOMA: *Kali. sulph.*

ERUPCIONES, herpética: *Calc. sulph.*
sicótica: *Natr. mur. Silicea.*
herpéticas en la cara: *Calc. sulph., Natr. mur.*
FAZ ANÉMICA: *Calc. phos.*
FRENTE, erupción pustular en la: *Natr. mur.*
GRANOS Y PÚSTULAS en la cara: *Calc. phos., Calc. sulph., Kali. mur., Natr., sulph., Natr. mur.*
GRIETAS de la piel de la cara: *Silicea.*
HINCHAZÓN de los carrillos: *Kali mur.*
endurecida: *Calc. fluor.*
glándula parótida: *Calc. phos.*
glándula submaxilar: *Calc. phos.*
huesos maxilares: *Calc. fluor.*
labio superior: *Calc. phos.*
dura en la mejilla: *Calc. fluor.*
la quijada: *Calc. fluor.*
HUESO DEL MAXILAR SUPERIOR, dolor en el: *Calc. phos.*
HUNDIMIENTO EN LAS FACCIONES DE LA CARA: *Kali. phos.*
ICTERICIA de la cara: *Natr. sulph.*
INDURACIÓN de los tejidos celulares de la cara: *Silicea.*
LABIOS, blancos: *Kali sulph.*
hidroa en los: *Kali. phos., Natr. mur.*
inferior hinchado: *Kali. sulph.*
piel desollada: *Kali. phos., Kali. sulph.*
tumores en los: *Silicea.*
úlceras producidas por el frío en los: *Calc. fluor., Natr. mur.*

LABIO superior, hinchado y doloroso: *Calc. phos.*
LAGRIMEO con neuralgia: *Natr. mur.*
LA HABITACIÓN CALIENTE agrava el dolor de la cara: *Kali. sulph.*
LATIDOS DE LA CARA: *Ferr. phos.*
LIVIDEZ de la cara: *Kali. phos.*
LUPUS: *Silicea.*, *Calc. phos.*
MASAS Ó NÓDULOS en la cara: *Silicea.*
MAXILAR, caries del: *Silicea.*
hinchazón dura en el: *Calc. fluor.*
necrósis del: *Silicea.*
MEJILLAS CALIENTES: *Ferr. phos.*
NECROSIS del maxilar: *Silicea.*
NEURALGIA INFLAMATORIA: *Ferr. phos.*
esparmódica: *Magnes. phos.*
después de la quinina: *Natr. mur.*
(Véase también dolor de la cara.)
OJOS, hundidos, cóncavos: *Kali phos.*
PALIDEZ de la cara: *Kali. phos.*, *Kali. sulph.*, *Natr. phos.*, *Silicea.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*
PECAS: *Calc. phos.*
PELO DE LA BARBA desprendiéndose: *Natr. mur.*
PÉRDIDA del poder de los músculos faciales: *Kali. phos.*
PIEL AGRIETADA de la cara: *Silicea.*
PLOMIZO, aspecto, de la cara: *Natr. mur.*
PROSOPALGIA: *Magnes. phos*, *Natr. phos.*
PRURITO DE LA CARA: *Natr. mur.*, *Kali. phos.*
REUMATISMO en la cara: *Calc. phos.*

SEMBLANTE HIPOCRÁTICO: *Kali. phos.*
SICOSIS: *Natr. mur., Silicea.*
SUDOR mientras se come: *Natr. mur., Kali phos.*
frío en la cara: *Calc. phos.*
SUPURACIÓN inminente del carrillo: *Calc. sulph.*
TIC DOLOROSO: *Ferr. phos.*
ULCERAS EN LOS LABIOS POR EL FRÍO, pequeñas: *Calc. fluor., Natr. mur.*
producidas por el frío: *Calc. fluor., Natr. mur.*
en los carrillos: *Ferr. phos.*
herpéticas, duras, en los labios: *Calc. fluor.*
VESÍCULAS en la cara: *Natr. mur., Natr. sulph.*

BOCA.

AFTAS: *Kali. mur.*
con mucha salivación: *Natr. mur.*
causadas por el uso del bórax: *Natr. sulph.*
ALIENTO desagradable: *Kali. phos., Natr. mur.*
fétido: *Kali. phos., Natr. mur.*
ANGULOS DE LA BOCA, sacudimientos convulsivos de los: *Magnes. phos.*
grietas: *Natr. mur.*
úlceras por el frío en los: *Calc. fluor.*
úlceras húmedas en los: *Natr. mur.*
ulcerados: *Silicea.*
BABEO: *Natr. mur.*
BLANCAS, úlceras, en la boca: *Kali mur.*
BOCA, vesículas alrededor: *Natr. mur.*
cáncer de la: *Kali mur., Kali phos.*

BOCA, cáncer acuoso: *Kali phos.*
— agrietado: *Natr. mur.*
— gangrenoso: *Kali phos.*, *Silicea.*
ángulos de la, sacudidas: *Magnes. phos.*
— ulcerados: *Silicea.*
llena de viscosidad: *Natr. sulph.*
calor en la: *Kali sulph.*
capa cremosa, amarilla, en el paladar: *Natr. phos.*
denudación y enrojecimiento de la: *Kali mur.*
erupción vesicular alrededor: *Natr. sulph.*
granos y costras dolorosas alrededor: *Kali phos.*
paladar de la, dolorido al tacto: *Natr. sulph.*
secreción excesiva de moco en la: *Natr. sulph.*
— mientras come: *Calc. sulph.*
úlceras blancas en la: *Kali mur.*
CALOR, inflamación de las encías: *Ferr. phos.*
CÁNCER: *Kali phos.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*
acuoso: *Kali phos.*
gangrenoso: *Kali phos.*, *Silicea.*
CAPA AMARILLA Y CREMOSA en el paladar: *Natr. phos.*
CONTRACCIÓN de la mandíbula: *Magnes. phos.*
DENUDACIÓN de la boca: *Kali mur.*
DESAGRADO DEL ALIENTO: *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Natr. phos.*
DESCAMACIÓN de los labios: *Kali sulph.*

DESCAMACIÓN del labio inferior: *Kali sulph.*
hinchado: *Kali sulph.*
sequedad del: *Kali sulph.*

ENCÍAS, sangran al acepillar los dientes: *Calc. sulph.*
blancas: *Kali sulph.*
calientes é inflamadas: *Ferr. phos.*
esponjosas y vueltas hacia atrás: *Kali phos.*
flictenas en las: *Natr. sulph.*

ENROJECIMIENTO de las membranas mucosas: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*

EPITELIOMA: *Kali sulph.*

ESTOMATITIS: *Kali phos.*

ESCORIACIÓN DE LA BOCA: *Kali mur.*

FETIDEZ DEL ALIENTO: *Kali phos.*

FLICTENAS, como perlas en las comisuras: *Natr. mur.*

GANGRENOSO, cáncer: *Kali phos.*, *Silicea.*

GLÁNDULAS salivales, supuradas: *Silicea.*

GRIETAS ARDIENTES en los labios: *Natr. mur.*
calor en los: *Kali sulph.*
en los labios: *Natr. mur.*

GUSTO ÁCIDO: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
amargo: *Natr. sulph.*, *Kali mur.*

HIDROA en los labios; *Kali phos.*

HINCHAZÓN DURA en la mejilla: *Calc. fluor.*

INFLAMACIÓN de las glándulas salivales: *Natr. mur.*
encías: *Ferr. phos.*

INTERIOR DE LOS LABIOS, dolorido: *Calc. sulph.*

LABIOS, grietas en los: *Natr. mur.*

LABIOS dolorosos y quemantes: *Natr. mur.*
hinchados: *Natr. mur.*
úlceras en el interior de los: *Calc. sulph*
MAXILAR, hinchazón dura en el: *Calc. fluor.*
MEMBRANA MUCOSA, encarnada: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
NIÑOS, úlceras blancas en la boca de los: *Kali mur.*
NOMA: *Kali phos.*
PALADAR con capa cremosa, amarilla: *Natr. phos.*
POSTEMILLAS: *Calc. fluor.*. *Silicea*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*
RÁNULA: *Natr. mur.*
SABOR REPUGNANTE: *Calc. phos.*
SACUDIMIENTOS de los ángulos de la boca: *Magnes. phos.*
SALIVACIÓN: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
SALIVALES, glándulas, inflamación de las: *Natr. mur.*
supuración de las: *Silicea.*
SEQUEDAD DE LOS LABIOS: *Kali sulph.*
TRISMO: *Magnes. phos.*
ULCERA PERFORANTE del paladar: *Silicea.*
ULCERAS EN LA BOCA de color gris-ceniciento: *Kali phos.*
por el frío en las comisuras de la boca: *Calc. fluor.*
en la boca de las madres que crían: *Kali. mur.*
en las comisuras: *Natr. mur.*
en la boca, gris-cenicientas: *Kali phos.*
en los ángulos: *Silicea.*
blancas: *Kali mur.*

ULCERAS perforantes: *Silicea.*
UVULA RELAJADA: *Natr. mur.*
UVULITIS: *Natr. mur.*
VEJIGUILLAS ABULTADAS: *Kali mur., Natr. mur.*

LENGUA Y GUSTO.

BASE AMARILLA DE LA LENGUA: *Calc. sulph.*
BORDES CUBIERTOS CON ESPUMA: *Natr. mur.*
blancos: *Kali sulph.*
rojos y ulcerados: *Kali phos.*
BRILLANTEZ AMARILLA de la capa de la lengua: *Natr. phos.*
CAPA EN LA LENGUA, amarilla-brillante: *Natr. phos.*
color de arcilla: *Calc. sulph.*
cremosa: *Natr. phos.*
espumosa: *Natr. mur.*
grisácea: *Kali mur.*
húmeda: *Natr. mur., Natr. phos.*
pardusca: *Kali phos., Natr. sulph.*
sucia: *Natr. sulph., Kali phos., Kali sulph.*
verde grisácea: *Natr. sulph.*
verde: *Natr. sulph.*
viscosa: *Kali sulph., Natr. mur., Natr. sulph., Kali phos., Kali mur.*
CAPA sobre la lengua, saburra blanca: *Calc. phos., Kali mur.*
sobre los bordes: *Kali sulph.*
sobre la lengua, amarilla: *Kali sulph., Natr. phos.*

CAPA en la base: *Calc. sulph.*
COLOR PARDO de la lengua: *Kali phos.*, *Natr. sulph.*
rojo-brillante, con denudación: *Magnes. phos.*
de arcilla de la lengua: *Calc. sulph.*
rojo-obscuro de la lengua, con hinchazón: *Ferr. phos.*
FLICTENAS en la punta de la lengua: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*
GLOSITIS: *Ferr. phos.*
hinchazón en la: *Kali mur.*
supuración en la: *Calc. sulph.*
GUSTO ÁCIDO: *Natr. phos.*
acre: *Calc. sulph.*
amargo: *Natr. sulph.*
— en la mañana: *Calc. phos.*
insípido: *Kali sulph.*
jugoso: *Kali sulph.*
HINCHAZÓN ROJA-OBSCURA DE LA LENGUA: *Ferr. phos.*
HÚMEDA, CREMOSA, capa en la lengua: *Natr. phos.*
INDURACIÓN DE LA LENGUA: *Calc. fluor.*, *Silicea.*
INFLAMACIÓN DE LA LENGUA: *Ferr. phos.*
con sequedad: *Kali phos.*
con supuración: *Calc. sulph.*
hinchazón: *Kali mur.*
LENGUA RAJADA: *Calc. fluor.*
seca: *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
blanda: *Calc. sulph.*
saburral: *Ferr. phos.*
grisácea: *Kali mur.*, *Natr. sulph.*
verdosa: *Natr. sulph.*

LENGUA mapeada: *Natr. mur.*, *Kali mur.*
adormecida: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
roja: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
tiesa: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
hinchada: *Calc. phos.*, *Kali mur.*
agrietada: *Calc. fluor.*
amarilla-brillante: *Natr. phos.*
amarilla en la base: *Calc. sulph.*
blanca: *Calc. phos.*, *Kali mur.*, *Kali sulph.*
— en los bordes: *Kali sulph.*
bordes rojos y ulcerados: *Kali phos.*
capa cremosa en la raíz: *Natr. phos.*
color de arcilla: *Calc. sulph.*
como si estuviese escaldada: *Magnes. phos.*
cubierta con saliva: *Natr. mur.*
encarnada: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. sulph.*
flácida: *Ferr. phos.*
forrada: *Ferr. phos.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Calc. phos.*
granillos sobre la: *Calc. phos.*
hinchazón roja-obscura de la: *Ferr. phos.*
húmeda: *Natr. phos.*
induración de la: *Calc. fluor.*, *Silicea.*
inflamada: *Ferr. phos.*
con sequedad: *Kali. phos.*
— hinchazón: *Kali. mur.*
— supuración: *Calc. sulph.*
limpia: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*
pardusca: *Kali. phos.*

LENGUA pegajosa: *Kali. mur.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Kali. phos.*
sensación de cabello en la: *Silicea.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
sucia: *Natr. sulph.*
úlceras en la: *Silicea.*
vesículas en la: *Natr. mur.*

LENTITUD EN APRENDER Á HABLAR: *Natr. mur.*

LIMPIDEZ DE LA LENGUA: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*

PÉRDIDA DEL GUSTO: *Natr. mur.*

PRONUNCIACIÓN DIFICULTOSA: *Natr. phos.*

PUNTA DE LA LENGUA, flictenas sobre la: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*
sensación de cabello sobre la: *Natr. phos.*, *Silicea.*, *Natr. mur.*
vesículas sobre la: *Natr. mur.*

SABOR COBRIZO: *Natr. phos.*
jugoso: *Calc. sulph.*
jabonoso: *Calc. sulph.*
ácido: *Calc. sulph.*
amargo: *Natr. sulph.*, *Kali. mur.*
en la mañana: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*
desagradable: *Calc. phos.*
insípido: *Calc. sulph.*, *Kali. sulph.*
pérdida del: *Natr. mur.*, *Kali. sulph.*

SABURRA CREMOSA SOBRE LA LENGUA: *Natr. phos.*

SALIVA ESPUMOSA sobre la lengua: *Natr. mur.*
burbujas de, en la lengua: *Natr. mur.*

SENSACIÓN DE UN CABELLO SOBRE LA LENGUA: *Silicea.*, *Natr. mur.*
sobre la punta: *Natr. phos.*
como si la lengua estuviese pegada al paladar: *Kali. phos.*
de un cabello en la: *Silicea.*, *Natr. mur.*
en la punta: *Natr. phos.*
SUCIEDAD DE LA LENGUA: *Natr. sulph.*, *Kali. phos.*, *Kali. sulph.*
VESÍCULAS en la punta de la lengua: *Natr. mur.*
VISCOSIDAD de la capa de la lengua: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Kali. sulph.*

DIENTES Y ENCÍAS.

AFLOJAMIENTO DE LOS DIENTES: *Calc. fluor.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
ARTICULACIÓN TARDÍA DE LAS PALABRAS: *Kali. phos.*
CALAMBRES durante la dentición: *Magnes. phos.*
CICATRIZ ROJA en las encías: *Kali. phos.*
CONVULSIONES durante la dentición: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*
DENTICIÓN, calambres durante la: *Magnes. phos*
con destilación de saliva: *Natr. mur.*
— fiebre: *Ferr. phos.*
convulsiones durante la: *Magnes. phos.*
dificultosa: *Silicea.*
padecimientos durante la: *Calc. phos.*.
retardada: *Calc. phos.*
DETERIORO DE LOS DIENTES, dolor en el: *Kali. phos.*

DIENTES, desarrollados con lentitud: *Calc. phos.*
deteriorados rápidamente: *Calc. phos.*
dolencia de los, durante el embarazo: *Calc. phos.*
flojos: *Calc. fluor.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
mala nutrición de los: *Calc. fluor.*
rechinamiento de los, durante el sueño: *Natr. phos.*, *Kali. phos.*
rechinido nervioso de los: *Kali. phos.*
se sienten doloridos: *Kali. phos.*, *Ferr. phos.*
se sienten demasiado largos: *Ferr. phos.*
sensibles: *Calc. sulph.*, *Magnes. phos.*, *Kali. phos.*
DOLENCIA DE LOS DIENTES: *Kali. phos.*
DOLENCIA DE LOS DIENTES durante el embarazo: *Calc. phos.*
DOLOR DE MUELAS DESPUÉS DE TOMAR ALIMENTOS CALIENTES: *Ferr. phos.*
EL AIRE FRÍO alivia el dolor de muelas: *Kali. sulph.*
ENCÍAS QUE SANGRAN FACILMENTE: *Natr. mur.*, *Kali. phos.*
inflamadas: *Calc. phos.*
doloridas: *Calc. phos.*
descoloridas: *Calc. phos.*
ardientes: *Natr. sulph.*
blancas: *Kali sulph.*
cicatriz roja en las: *Kali. phos.*
dolorosas: *Calc. phos.*, *Kali. sulph.*
esponjosas, vueltas hacia atrás: *Kali. phos.*
flictenas en las: *Natr. sulph.*

ENCÍAS inflamadas: *Calc. phos.*
pálidas: *Calc. phos.*, *Kali. sulph.*
predisposición á sangrar: *Kali. phos.*
sensibles: *Natr. mur.*, *Silicea.*
— al tacto, al frío ó al agua: *Magnes. phos.*
ulceradas: *Natr. mur.*

ESMALTE DEFICIENTE DE LOS DIENTES: *Calc. fluor.*
áspero: *Calc. fluor.*

FÍSTULA DENTAL: *Silicea.*

FUMANDO TABACO se alivia el dolor de muelas: *Natr. sulhp.*

GLÁNDULAS SALIVALES, inflamación de las: *Natr. mur.*

HEMORRAGIA DE LAS ENCÍAS: *Kali. phos.*, *Natr. mur.*

LA ACCIÓN DE FUMAR alivia el dolor de muelas: *Natr. sulph.*

LAS ENCÍAS sangran con facilidad: *Natr. mur.*, *Kali. phos.*, *Calc. sulph.*

MALA NUTRICIÓN de los dientes: *Calc. fluor.*

ODONTALGIA REUMÁTICA: *Calc. sulph.*
— agravada por la noche: *Calc. phos. Silicea.*
— en la tarde: *Kali. sulph.*
— en el calor moderado: *Kali. sulph.*
— por las cosas frías: *Magnes. phos.*
— por el alimento: *Calc. fluor.*
alternada con cefalalgia frontal: *Kali. phos.*

ODONTALGIA, cambiando de lugar rápidamente: *Magnes. phos.*
causada por enfriamiento de los pies: *Silicea.*
congestiva: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*
con salivación: *Natr. mur.*
con fístula dental: *Silicea.*
con encías sangrando fácilmente: *Kali phos.*
con flujo involuntario de lágrimas: *Natr. mur.*
con aflojamiento de los dientes: *Calc. fluor.*
con el carrillo hinchado: *Kali mur.*, *Calc. sulph.*
con — caliente: *Ferr. phos.*
después de acostarse: *Magnes. phos.*
dolor taladrante: *Calc. phos.*
dolores penetrantes: *Calc. phos.*
— convulsivos: *Calc. phos.*
— ambulantes: *Magnes. phos.*
inflamatoria: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*
mejorada por el frío: *Ferr. phos.*
— el agua: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
— el aire frío: *Kali sulph.*, *Natr. sulph.*
— los líquidos calientes: *Magnes. phos.*
— fumar tabaco: *Natr. sulph.*
neurálgica: *Magnes. phos.*
punzante: *Magnes phos.*
PADECIMIENTOS durante la dentición: *Calc. phos.*
PALABRA INARTICULADA: *Kali phos.*
POSTEMILLAS antes de formarse materia: *Kali mur.* *Natr. mur.*

POSTEMILLAS con hinchazón dura: *Calc. fluor.*
— supuración: *Calc. sulph., Silicea.*
PRONUNCIACIÓN lenta é inarticulada: *Kali phos.*
RÁNULA: *Natr. mur.*
RECHINIDO DE DIENTES, nervioso: *Kali phos.*
RECHINAMIENTO DE LOS DIENTES: *Natr. phos., Kali phos.*
SALIDA DE LOS DIENTES. (Véase Dentición).
SALIVACIÓN CON DOLOR DE MUELAS: *Natr. mur.*
SALIVEO: *Natr. mur.*
SEDIMENTO GRISÁCEO en los dientes: *Kali phos.*
SENSIBILIDAD DE LAS ENCÍAS: *Natr. mur.*
á la presión ó al tacto: *Ferr. phos.*
ULCERACIÓN DE LAS ENCÍAS: *Natr. mur.*

GARGANTA.

ABSCESOS DE LAS AMÍGDALAS: *Calc. sulph., Silicea.*
la faringe: *Ferr. phos.*
ADHERENCIA DE COSTRAS EN LA FARINGE: *Kali mur.*
AL TRAGAR, dolorida: *Calc. phos., Ferr. phos., Kali mur.*
líquidos, constricción: *Magnes. phos.*
sensación de cuerpo extraño: *Natr. sulph.*
AMÍGDALAS aumentadas de volumen: *Calc. phos., Kali phos., Natr. mur.*
capa amarilla en las: *Natr. phos.*
con sordera: *Calc. phos.*
depósito blanco en las: *Kali phos.*
doloridas: *Kali phos.*

AMÍGDALAS inflamadas: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
inflamadas, con sordera, mucha hinchazón: *Kali. mur.*
— dolor al abrir la boca: *Calc. phos.*
— supuración: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
— periódicamente: *Silicea.*
ANGINA, secretando pus: *Calc. sulph.*
periódica: *Silicea.*
ARDOR DE LA GARGANTA: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
AUMENTO DE VOLUMEN de la garganta: *Natr. mur.*
BOCIO: *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*, *Silicea*, *Natr. phos.*
con secreciones acuosas: *Natr. mur.*
CALOR en la garganta: *Ferr. phos.*
CAPA AMARILLA en el paladar: *Natr. phos.*
CONGESTIÓN DE LA GARGANTA: *Ferr. phos.*
CONSTRICCIÓN DE LA GARGANTA, espasmódica: *Magnes. phos.*
COSTRAS EN LA FARINGE: *Kali. mur.*
CRUP: *Ferr. phos.*, *Kali. mur.*, *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*, *Kali. phos.*
DEGLUCIÓN DOLOROSA: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
es necesario tragar: *Magnes. phos.*
DESEO PARA TRAGAR, constante: *Kali. phos.*
DESTILAMIENTO de las fosas nasales posteriores: *Magnes phos.*
DIFTERIA, efectos después de la: *Kali phos.*, *Silicea.*
con somnolencia: *Natr. mur.*
— vómito verde: *Natr. sulph.*
— cara pálida, hinchada: *Natr. mur.*
— deposiciones acuosas: *Natr. mur.*

DIFTERIA, cuando se extiende á la tráquea: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*
de la parte blanda del paladar: *Calc. sulph.*
falsa: *Natr. phos.*
primer período: *Ferr. phos.*
remedio principal: *Kali. mur.*
DOLOR EN EL MOMENTO DE LA DEGLUCIÓN: *Calc. phos.*, *Ferr. phos*, *Kali mur.*
en las fauces: *Ferr. phos.*
en la garganta: *Ferr. phos.*
ESPASMO DE LA GLOTIS: *Magnes. phos.*
ESTADOS MALIGNOS de la garganta: *Kali. phos.*
EXPECTORACIÓN desagradable, masas caseosas: *Kali. mur.*
moco salado: *Kali. phos.*, *Natr. sulph.*
EXUDACIÓN MEMBRANOSA en la garganta: *Kali. mur.*
FARINGE, costras adherentes en la: *Kali. mur.*
FARINGEOS, abscesos: *Ferr. phos.*
FARINGITIS FOLICULAR: *Kali. mur.*, *Natr. mur.*
FAUCES dolorosas: *Ferr. phos.*
hinchadas: *Calc. sulph.*
inflamadas: *Ferr. phos.*
rojas: *Ferr. phos.*
FOLICULAR, faringitis: *Kali. mur.*, *Natr. mur.*
FOSAS NASALES POSTERIORES, destilación de las: *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*
GARGANTA seca: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
ardor en la: *Ferr. phos.*
calor en la: *Ferr. phos.*
congestionada: *Ferr. phos.*

GARGANTA, constricción en la: *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*
cubierta con moco transparente: *Natr. mur.*
— — moco tenaz: *Kali sulph.*
cuerpo extraño, sensación en la: *Natr. phos.*
dolores: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
dolorida y tiesa: *Magnes. phos.*
dolorida, de los cantores: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
encarnada: *Ferr. phos.*
espasmódica, constricción de la: *Magnes. phos.*
estados malignos en la: *Kali. phos.*
gangrenosa: *Kali. phos.*
hinchada: *Kali. mur.*
inflamada: *Ferr. phos.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*
latidos en la: *Ferr. phos.*
moco tenaz en la: *Kali sulph.*
placas grisáceas en la: *Kali. mur.*
punzadas en la: *Natr. mur.*
relajada: *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*
seca: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Kali. phos.*
sensación de tapón ó masa en la: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*
— bola histérica en la: *Kali. phos.*
supuración de la: *Calc. phos.*, *Silicea.*
titilación en la: *Calc. fluor.*
ulcerada: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*

GLÁNDULA TIROIDE AUMENTADA: *Silicea, Calc. phos., Calc. fluor., Natr. mur.*

GLÁNDULAS hinchadas: *Ferr. phos., Natr. mur., Kali mur., Natr. phos., Kali sulph.*

externas, dolorosas: *Calc. phos.*

submaxilares, hinchadas: *Natr. mur.*

supuradas: *Calc. sulph., Silicea.*

GLOTIS, espasmo de la: *Magnes. phos.*

HINCHAZÓN DE LAS GLÁNDULAS: *Ferr. phos., Calc. phos., Kali mur.*

INFLAMACIÓN de las amígdalas: *Ferr. phos.*

fauces: *Ferr. phos.*

garganta: *Ferr phos., Natr. phos.*

LARINGITIS ESTRIDULOSA: *Magnes. phos.*

MAL DE GARGANTA crónico: *Natr. mur.*

con sequedad *Natr. mur.*

de los oradores: *Calc. phos.*

gangrenoso: *Kali phos.*

sifilítico: *Kali mur.*

MASA EXTRAÑA, sensación de, cuando se traga: *Natr. sulph., Natr. phos.*

MOCO tenaz en la garganta: *Kali sulph.*

MOCO salado acumulado en la garganta: *Kali phos.*

PALADAR, capa amarilla en el: *Natr. phos.*

inflamado: *Ferr. phos.*

sensible: *Natr. sulph.*

PARÁLISIS de las cuerdas vocales: *Kali phos.*

del velo del paladar: *Silicea.*

— crónica: *Silicea.*

post-diftérica: *Natr. mur.*

PARÓTIDAS, con expectoración de moco salado: *Natr. mur.*
con hinchazón: *Kali mur.*
— salivación: *Natr. mur.*
PRONUNCIACIÓN, nasal, lenta: *Kali phos.*
RELAJACIÓN dolorosa de la garganta: *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*
de la úvula: *Natrum. mur.*
causando tos: *Calc. fluor.*
SENSACIÓN DE SOFOCACIÓN en la garganta: *Magnes. phos.*
SENSACIÓN DE MASA EXTRAÑA EN LA GARGANTA AL DEGLUTIR: *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
SENSACIÓN DE AHOGO: *Magnes. phos.*
SORDERA, en la amigdalitis: *Calc. phos.*
TRAGAR, deseo constante para: *Kali phos.*
necesidad de: *Magnes. phos.*
ULCERACIÓN DE LA GARGANTA: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
UVULA prolongada: *Calc. fluor.*, *Natr. mur.*
causando tos: *Calc. fluor.*
relajada: *Natr. mur.*, *Calc. fluor.*
UVULITIS: *Natr. mur.*
VOZ, pérdida de la: *Kali phos.*
— repentina y penetrante: *Magnes. phos.*

SÍNTOMAS GÁSTRICOS

ACEDÍA: *Natr. phos.*
ACIDOS, impresionable para los: *Magnes. phos.*
ALIENTO DESAGRALABLE: *Kali phos.*, *Natr. mur.*

ANTOJO por los alimentos salados: *Natrum mur.* (Véase Deseos).

APETITO, aumentado: *Calc. phos.*, *Calc. sulph.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*

pérdida del: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*, *Kali sulph.*

ARDOR en el estómago: *Kali sulph.*

ASIMILACIÓN DEFECTUOSA del alimento: *Calc. phos.*

AVERSIÓN, para los ácidos: *Ferr. phos.*

— el alcohol: *Silicea.*

— el alimento caliente: *Silicea.*

— los arenques: *Ferr. phos.*

— las bebidas calientes: *Kali sulph.*

— el café: *Ferr. phos.*. *Magnes. phos.*

— la carne: *Ferr. phos*, *Silicea.*

— la leche: *Ferr. phos.*

— el pan: *Natr. mur.*

CALOR ARDIENTE en el estómago: *Kali sulph.*, *Calc. sulph.*

con sed: *Kali sulph.*

CARDIALGÍA después de la comida: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Silicea*, *Magnes. phos.*

y flatulencia: *Calc. phos.*

CÓLICO BILIOSO: *Natr. sulph.*

DESEA alcohol: *Ferr. phos.*

alimento salado: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*

azúcar: *Magnes. phos.*

carnes ahumadas: *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*

cerveza: *Ferr. phos.*

clarete (vino): *Calc. sulph.*

DESEA cosas amargas: *Natr. mur.*
cosas indigestas: *Calc. phos.*
estimulantes: *Ferr. phos.*
fruta: *Calc. sulph.*
jamón: *Calc. phos.*
tocino: *Calc. phos.*
vegetales verdes y ácidos: *Calc. sulph.*
DESPUÉS DE LA COMIDA, regurgitación del alimento: *Magnes phos.*
DISPEPSIA, ácida: *Natr. phos.*, *Silicea.*
con cardialgía y calosfrío: *Silicea.*
— bochorno, cara caliente. *Ferr. phos.*
— dolor y salivación: *Natr. mur.*
— lengua blanca, grisácea: *Kali mur.*
— mucha flatulencia: *Calc, phos.*
— pirosis: *Natr. mur.*
— presión como de un peso en el estómago: *Kali suph.*
crónica: *Silicea.*
con dolor después de tomar alimento: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
espasmódica: *Magnes. phos.*
flatulenta: *Magnes. phos.*
nerviosa: *Kali phos.*
DOLOR después de tomar alimento: *Natr. phos.*, *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
en las circunvoluciones intestinales: *Natr. mur.*
en el epigastrio, constante: *Kali phos.*
— lado derecho, bajo el hombro: *Kali mur.*

DOLOR DE ESTÓMAGO, agravado por, la presión: *Ferr. phos.*
— el alimento: *Calc. phos.*
debido á la presencia de lombrices: *Natr. phos.*
por enfriamiento: *Ferr. phos.*
— susto ó emoción: *Kali phos.*
aliviado por comer: *Kali phos.*
con constipación: *Kali mur.*
— flatulencia: *Magnes. phos., Natr. sulph.*
— ansiedad y salivación: *Natr. mur.*
DOLORES CÓLICOS: *Kali sulph.*
EL ALIMENTO GRASOSO causa indigestion: *Kali mur.*
EPIGASTRIO sensible al tacto: *Ferr. phos.*
dolor en el, constante: *Kali phos.*
— después de comer: *Calc. phos.*
ERUCTOS, amargos: *Kali phos.*
ácidos: *Natr. phos., Natr. sulph., Silicea, Kali phos.*
ardientes, insípidos: *Magnes, phos.*
gaseosos: *Kali phos.*
grasosos: *Ferr. phos.*
ESTADO BILIOSO: *Natr. sulph.*
con lengua gris: *Kali mur.*
ESTÓMAGO, boca del, manchas rojas sobre la: *Natr. mur.*
calambres en el: *Magnes. phos.*
calor ardiente en el: *Kali sulph., Calc. sulph.*
catarro crónico del: *Kali sulph.*
debilidad y hundimiento en el: *Natr. mur.*

ESTÓMAGO distendido: *Natr. sulph.*
dolores cólicos en el: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*
dolor profundamente situado en el: *Kali sulph.*
dolorido: *Ferr. phos.*
gas en el, excesivo: *Calc. phos.*
hemorragia del: *Kali mur.*
hinchado: *Ferr. phos.*
latido en el: *Ferr. phos.*
moco procedente del: *Natr. sulph.*
pesado: *Natr. sulph.*
plenitud y presión en el: *Kali sulph.*
regurgitación de alimento del: *Magnes. phos.*
sensación de vacuidad en el: *Natr. phos.*
sensación de desfallecimiento en el: *Kali sulph.*, *Natr. phos.*
sensible: *Ferr. phos.*
ulceración del: *Natr. phos.*
EXCESIVA HAMBRE: *Kali phos.*, *Silicea*, *Natr. mur.*
FALTA DE SED: *Kali sulph.*
FLATULENCIA, repite el sabor del alimento: *Ferr. phos.*
excesiva, acumulación de gas en el estómago: *Calc. phos.*
con desorden en el corazón: *Kali phos.*
— distensión y constipación: *Magnes. phos.*
— dolor, no aliviado por los eructos: *Magnes. phos.*
— pereza del hígado: *Kali mur.*, *Natr. sulph.*

FLATULENCIA con regüeldos agrios: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*
GASTRALGÍA aliviada por el calor suave y encorvándose: *Magnes. phos.*
GÁSTRICAS, erosiones: *Natr. phos.*
fiebre: *Ferr. phos.*
ulceraciones: *Natr. phos.*, *Kali phos.*
GÁSTRITIS: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
crónica: *Kali sulph.*
por bebidas demasiado calientes: *Kali mur.*
HAMBRE EXCESIVA: *Kali phos.*, *Silicea*, *Calc. phos*, *Natr. mur.*
HEMORRAGIA del estómago: *Kali mur.*, *Ferr. phos.*
HIPO: *Magnes phos.*, *Calc. fluor.*, *Natr. mur.*
ICTERICIA despues de gastritis: *Kali sulph.*
por contrariedad: *Natr. sulph.*
con amargor de boca y constipación: *Kali mur.*
con somnolencia: *Natr mur.*
INDIGESTION. (Véase Dispepsia).
INDURACIÓN DEL PÍLORO: *Silicea.*
INTOLERANCIA de los estimulantes: *Silicea.*
LANGUIDEZ en el estómago: *Kali sulph.*
LOS NIÑOS vomitan tan luego que maman: *Silicea.*
falta de nutrición por esa causa: *Calc. phos.*
NÁUSEA: *Kali sulph.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*
y vómito: *Magnes. phos.*
— de alimento agrio ó de sangre: *Kali phos.*
después de alimento grasoso: *Kali mur.*

NÁUSEA con vértigo: *Calc. sulph.*

NO PUEDE LLEVAR LAS ROPAS APRETADAS. *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*

PADECIMIENTO MORTAL en el estómago: *Ferr. phos.*

PÉRDIDA DE APETITO: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. phos.*, *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Natr. sulph.*

con deseo por fumar: *Natr. mur.*

PÍLORO, induración del: *Silicea.*

PIROSIS: *Natr. phos.*, *Natr. mur:*, *Kali phos.*

PLENITUD, sensación de: *Kali sulph.*

PRESIÓN EN EL ESTÓMAGO: *Magnes. phos.*

REGURGITACIÓN del alimento después de comer: *Magnes. phos.*

SED, ardiente: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Calc. sulph.*

durante la tarde: *Natr. sulph.*

por el agua fría: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*

SENSACIÓN DE DESFALLECIMIENTO en la boca del estómago: *Kali phos.*, *Natr. phos.*

SON INSOPORTABLES LOS VESTIDOS APRETADOS EN LA CINTURA: *Natr. sulph.*

TEMOR DE LAS BÈBIDAS CALIENTES: *Kali sulph.*

ULCERACIÓN DEL ESTÓMAGO: *Natr. phos.*

VACUIDAD, SENSACIÓN DE DESFALLECIMIENTO EN EL ESTÓMAGO: *Natr. phos.*, *Kali phos.*

aliviada por comer: *Kali phos.*

VENDA alrededor del cuerpo, sensación de: *Magnes. phos.*

VÓMITO, ácido: *Natr. mur.*

agrio: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Natr. sulph.*

VÓMITO, agua verdiosa: *Natr. sulph.*, *Kali phos.*
alimento amargo: *Kali phos.*
agua salada, verdiosa: *Natr. sulph.*
alimento indigesto: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*
antes del desayuno: *Ferr. phos.*, *Silicea.*
bilis: *Natr. sulph.*
como asientos de café: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
después de tomar agua fría: *Calc. phos.*
— — crema helada: *Calc. phos.*
flema blanca, espesa: *Kali mur.*
infantil: *Calc. phos.*
inmediatamente después de dar el pecho: *Silicea.*
masas cuajadas: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
matinal: *Silicea.*
moco filamentoso: *Natr. mur.*
moco transparente: *Natr. mur.*
moco acuoso: *Natr. mur.*
sangre de color rojo-brillante: *Ferr. phos.*
sangre coagulada: *Kali mur.*
sangre obscura: *Kali mur.*
sangre viscosa: *Kali mur.*

ABDOMEN Y DEPOSICIONES.

ABDOMEN, abultado en los niños: *Silicea.*
abscesos del: *Silicea.*
ABSCESO DOLOROSO cerca del ano: *Calc. sulph.*
cerca de la región hepática: *Calc. sulph.*

ALMORRANAS. (Véase Hemorroides).

ANO, abscesos dolorosos cerca del: *Calc. sulph.*
dolencia del: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
erupción herpética alrededor del: *Natr. mur.*
erupciones como verrugas en el: *Natr. sulph.*
escoriación del: *Natr. phos.*
fístula en el: *Silicea*, *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*
fisurado: *Silicea*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*, *Calc. fluor.*
neuralgia del: *Calc. phos.*
prolapsus del: *Calc. sulph.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
— disposición al: *Ferr. phos.*
prurito en el: *Natr. phos.*, *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*, *Natr. sulph.*

AUMENTO DE LAS GLÁNDULAS MESENTÉRICAS: *Calc. phos.*

BAZO, dolor en el: *Natr. mur.*, *Kali phos.*

CALAMBRES COLERIFORMES: *Magnes. phos.*

CALAMBRES: *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*

CÁLCULOS BILIARES, espasmos producidos por los: *Magnes. phos.*
para impedir la nueva formación de los: *Calc. phos.*

CALOR EN LA PARTE INFERIOR DE LOS INTESTINOS: *Natr. sulph.*

CATARRO DUODENAL: *Kali mur.*

CINTURA, no pueden apretarse las ropas en la: *Natr. sulph.*

CÓLERA: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Kali sulph.*

CÓLERA INFANTIL: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*

CÓLICO acompañado con eructos: *Magnes. phos.*

á cada tentativa para comer: *Calc. phos.*

calambroide: *Magnes. phos.*

comenzando en la ingle derecha: *Natr. sulph.*

de plomo: *Natr. sulph.*

de los niños: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. phos.*

en el hipogastrio: *Kali phos.*

flatulento: *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. sulph.*

los dolores irradian desde el ombligo: *Magnes. phos.*

mejorado por la frotación y el calor moderado: *Magnes. phos.*

— encorvándose: *Kali phos.*

obligando al paciente á encogerse: *Magnes. phos.*

por vermes intestinales: *Natr. phos.*, *Silicea.*

que no se alivia eructando: *Magnes. phos.*

remitente: *Magnes. phos.*

COMEZÓN EN EL ANO agravada por la noche: *Natr. phos.*

CONGESTIÓN DEL HÍGADO: *Natr. sulph.*

CONSTIPACIÓN, alternada con diarrea: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*

con calor en la parte más inferior del intestino: *Ferr. phos.*

con afecciones de la médula: *Silicea.*

con debilidad del intestino: *Natr. mur.*

CONSTIPACIÓN con evacuaciones de color claro: *Kali mur.*
— — moreno-obscuro: *Kali phos.*
con excrementos duros en los viejos: *Calc. phos.*
— fiebre héctica: *Calc. sulph.*
habitual: *Kali sulph.*
hemorroidal: *Natr. mur.*
incapacidad para expulsar las heces: *Calc. fluor.*
inercia de los intestinos. *Natr. mur.*
infantil: *Magnes. phos.*
lengua saburral: *Kali mur.*
obstinada: *Kali sulph.*, *Natr. phos.*
por falta de humedad: *Natr. mur.*
produciendo fisuras: *Natr. mur.*
DEBILIDAD EN EL EPIGASTRIO: *Kali phos.*
DEPOSICIONES SIN DIGERIR: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
DESPUÉS DE EVACUAR, sensacion lacerante, hemorragia y escozor: *Natr. mur.*
la vacunación, diarrea: *Silicea*, *Kali mur.*
DIARREA, después de tomar árbol de ázucar: *Calc. sulph.*
alimento grasoso: *Kali mur.*
tiempo lluvioso: *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*
vacunación: *Silicea*, *Kali mur.*
agravada por la fruta: *Calc. phos.*
acuosa: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. sulph.*, *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*

DIARREA, alternando con constipación: *Natr. mur.*
amarillas, viscosas, acuosas, purulentas: *Kali sulph.*
biliosa: *Natr. sulph.*
causada por cambio de estación: *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*
— sustò: *Kali phos.*
— enfriamiento: *Fer. phos.*
— excesiva acidez: *Natr. phos.*
— relajación de las vellosidades intestinales: *Ferr. phos.*
como agua de arroz: *Kali phos.*
con calambres en las pantorrillas: *Magnes. phos.*
— agotamiento: *Kali phos.*, *Calc: phos.*
— depresión: *Kali phos.*
— icteria: *Natr. phos.*
deposiciones biliosas, obscuras: *Natr. sulph.*
— verdes: *Natr. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*
— viscosas: *Calc. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Kali sulph.*, *Calc. sulph.*
— blancas: *Natr. phos.*, *Kali mur.*
de olor ácido: *Natr. sulph.*
escoriantes: *Natr. mur.*
espumosa: *Natr. mur.*
fétida, flatulenta: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
infantil; *Silicea*, *Calc. phos.*, *Natr. phos.*
involuntaria: *Natr. mur.*

DIARREA, olor pútrido, horrible: *Kali phos.*, *Silicea.*
purulenta: *Calc. sulph.*, *Kali sulph.*
sin dolor: *Kali phos.*
sin digerir: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
urgente, acuosa: *Kali phos.*
DIARREA DE VERANO en la época de la dentición: *Calc. phos.*
DISENTERÍA, con tenesmo: *Kali mur.*
— retención espasmódica de orina: *Magnes. phos.*
deposiciones purulentas: *Calc. sulph.*
— de sangre pura: *Kali phos.*
— saniosas: *Calc. sulph.*
— viscosas: *Kali mur.*
— muy dolorosas: *Magnes. phos.*
período febril: *Ferr. phos.*
DOLOR ARDIENTE en el recto: *Natr. mur.*
DOLOR alrededor del ombligo que causa gritos: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
al través de la ingle derecha: *Natr. phos.*
en las circunvoluciones abdominales: *Natr. mur.*
en la parte inferior del sacro: *Calc. phos.*
en el hígado y el bazo: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
en los intestinos: *Natr. phos.*, *Magnes phos.*
EL ABDOMEN SE SIENTE ABULTADO EN LOS NIÑOS: *Silicea.*
blando: *Calc. phos*,
colgante: *Calc. fluor.*
frío al tacto: *Kali sulph.*

EL ABDOMEN SE SIENTE HINCHADO: *Kali phos.*, *Kali mur.*, *Magnes. phos.*.
hundido: *Calc. phos.*
sensible: *Kali mur.*
tenso y timpánico: *Kali sulph.*
ENTERALGIA, aliviada por, encorvarse: *Magnes. phos.*
el calor moderado: *Magnes. phos.*
ENTORPECIMIENTO, completo, del hígado: *Kali mur.*
ERUPCIONES COMO VERRUGAS en el ano: *Natr. sulph.*
ESCORIACIÓN DEL ANO: *Natr. phos.*
ESFUERZOS AL DEFECAR: *Natr. phos.*
ESTADO ATÓNICO DEL RECTO: *Kali phos.*
EVACUACIONES, acuosas: *Ferr. phos.*, *Natr. mur. Natr. sulph.*, *Calc. sulph.*, *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*, *Calc. phos.*
amarillas: *Kali suph.*
biliosas: *Natr. sulph.*
blancas: *Kali. mur.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
color de arcilla: *Kali mur.*
como agua de arroz: *Kali. phos.*
copiosas: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
cremosas: *Natr. phos.*
de alimento sin digerir: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*.
de caseina coagulada: *Natr. phos.*.
de color amarillo claro: *Kali mur.*
de olor pútrido: *Kali phos.*
de olor cadavérico: *Silicea.*
de olor agrio: *Natr. phos.*
desagradables: *Kali phos.*, *Calc. phos.*, *Silicea.*, *Kali sulph.*

EVACUACIONES, descoloridas: *Kali. mur.*
desmesuradas: *Natr. mur.*
dificultad para expulsarlas: *Natr. mur.*, *Natr. sulph* (pastosas).
— — retenerlas: *Natr. phos.*
dolorosas: *Ferr. phos.*
duras: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*
en masas gelatinosas: *Natr. phos.*
escasas: *Natr. phos.*
espumosas y pegajosas: *Natr. mur.*
estríadas con sangre: *Natr. sulph.*, *Calc. sulph.*
expulsadas con fuerza: *Magnes. phos.*
falta de vigor para expulsarlas: *Calc. fluor.*
fétidas y horribles: *Kali phos.*
floculentas: *Kali mur.*
frecuentes: *Natr. phos.*
involuntarias: *Natr. mur.*
mientras se come: *Kali phos.*
negras: *Kali sulph.*
nudosas: *Natr. sulph.*
obscuras: *Natr. sulph.*, *Kali phos.*
profusas: *Calc. phos.*
purulentas: *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*
que salpican: *Calc. phos.*
repentinas: *Ferr. phos.*, *Natr. phos.*
retroceden en parte cuando se expulsan: *Silicea.*
ruidosas: *Calc. phos.*
sanguinolentas: *Kali. mur.*, *Calc. sulph.*, *Kali phos.*, *Ferr. phos.*

EVACUACIONES, secas: *Natr. mur.*
sueltas, por la mañana: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
verdes: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*
violentas, que salpican: *Calc. phos.*
viscosas: *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Kali sulph.*, *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*
EXPULSIÓN VIOLENTA DE LA EVACUACIÓN: *Magnes. phos.*
FIEBRE ENTÉRICA: *Ferr. phos.*, *Kali. mur.*, *Calc. phos.*, *Kali sulph.*, *Kali phos.*
FÍSTULA EN EL ANO; *Silicea*, *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*
falta de dolor en la: *Calc. phos.*
FÍSURA EN EL ANO: *Silicea*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*, *Calc. fluor.*
FLATO ruidoso desagradable: *Kali phos.*, *Calc. phos.*
FLATULENCIA Y CÓLICO: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Magnes. phos.*
abdomen hinchado: *Kali. mur.*
angustia en el corazón. *Kali phos.*
cambio de sitio de la: *Silicea.*
con estrangulación: *Magnes. phos.*
dolor incisivo en el abdomen: *Natr. sulph.*
fétida: *Calc. phos.*
olor de azufre: *Kali sulph.*
ruidosa, desagradable: *Kali phos.*, *Calc. phos.*
GLÁNDULAS, inguinales, aumentadas de volumen: *Silicea.*
HEMORROIDES, ciegas: *Kali sulph.*, *Calc. fluor.*
crónicas: *Calc. phos.*

HEMORROIDES, dolor incisivo como relámpago en las: *Magnes. phos.*
escozor y picazón: *Natr. mur.*
externas: *Kali sulph.*
fluyendo suavemente: *Calc. phos.*
inflamadas: *Ferr. phos.*
intensamente dolorosas: *Silicea, Kali phos.*
internas: *Kali sulph., Calc. fluor.*
latidos en las: *Natr. mur.*
picaduras en las: *Natr. mur.*
pruritosas: *Kali phos.*
sangrantes: *Kali mur., Ferr. phos., Calc. fluor.*
HERNIA, abdominal: *Calc. phos.*
estrangulada é inflamada: *Ferr. phos.*
HERPES alrededor del ano: *Natr. mur.*
HÍGADO, acción perozosa del: *Kali mur.*
congestion del: *Natr. sulph*
dolencia al tacto del: *Natr. sulph.*
dolores punzantes, agudos, en el: *Natr. sulph.*
entorpecimiento completo del: *Kali mur.*
esclerosis del: *Natr. phos.*
irritable: *Natr. sulph.*
región del, dolorosa: *Calc. sulph.*
HUNDIMIENTO en el epigastrio y cerca del ombligo: *Calc. phos.*
ICTERIA después de una contrariedad: *Natr. sulph.*
causada por un enfriamiento: *Kali mur.*
— catarro gástrico: *Kali sulph.*
— catarro gastro-duodenal: *Kali mur., Natr. mur.*

INTESTINOS, considerable entorpecimiento de los:
capa membranosa de los, con prolapso: *Kali phos.*
dolor en los: *Natr. phos.*
olor sulfuroso de gas de los: *Kali sulph.*
soltura de los, en las ancianas: *Natr. sulph.*
INTESTINALES, úlceras: *Calc. sulph.*
LOS ERUCTOS NO PRODUCEN ALIVIO en el cólico: *Magnes. phos.*
LOS NIÑOS encogen las piernas en el cólico: *Magnes. phos.*
abdomen abultado en los: *Silicea.*
MARASMO en la dentición de los niños: *Calc. phos.*
NEURALGÍA DEL ANO: *Calc. phos.*
OMBLIGO, sensación de vacuidad alrededor del: *Calc. phos..*
PERITONITIS: *Ferr. phos., Kali mur., Kali sulph.*
PERITIFLITIS: *Kali mur., Ferr. phos.*
PROCTALGÍA: *Natr. mur.*
PROLAPSUS ANI: *Calc. sulph., Kali phos., Natr. mur., Ferr. phos.*
disposición para el: *Ferr. phos.*
PUNZADAS EN EL RECTO: *Natr. mur.*
RECTO, ardores en el: *Kali phos.*
dolor en el, con cada evacuación: *Magnes. phos., Natr. mur.*
prolapso del: *Calc. sulph., Kali phos., Natr. mur.*
punzadas en el: *Natr. mur.*
SACRO, dolor en el, después de defecar: *Calc. phos.*

SOLTURA HEREDITARIA en las mujeres ancianas: *Natr. sulph.*
SUFRIMIENTOS ESPLÉNICOS: *Kali phos.*
TABES MESENTÉRICA: *Calc. phos.*
TENESMO: *Kali phos.*
TIFLITIS: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*
TIFUS, con constipación: *Kali mur.*
TIMPANITIS: *Kali sulph.*, *Kali phos.*, *Magnes. phos.*
en la fiebre biliosa: *Natr. sulph.*
ULCERAS INTESTINALES: *Calc. sulph.*
URGENCIA INEFICAZ para evacuar: *Kali phos.*
VERMES intestinales: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
filiformes: *Natr. phos.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*
largos: *Natr. phos.*

SÍNTOMAS URINARIOS.

ARDOR DESPUÉS DE LA MICCIÓN: *Natr. mur.*
durante la micción: *Natr. sulph.*
ARENILLAS: *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*, *Magnes. phos.*, *Silicea.*
ATONÍA de la vejiga: *Natr. phos.*
CÁLCULOS FOSFÁTICOS en la orina: *Calc. phos.*
CISTITIS, casos agudos: *Ferr phos.*, *Kali mur.*
crónica: *Kali. mur.*
— supurativa: *Calc. sulph.*
con estado asténico: *Kali sulph.*, *Kali phos.*
DIABETES MELLITUS: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*

DOLOR INCISIVO después de orinar: *Natr. mur.*
dolores en la uretra y el cuello de la vejiga: *Calc. phos.*
ENFERMEDAD DE BRIGHT, para la albúmina: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
desorden febril: *Ferr. phos.*
ENURESIS, diurna: *Ferr. phos.*
en los niños: *Silicea*, *Calc phos.*
en los ancianos: *Calc. phos.*
nocturna: *Magnes. phos*, *Kali phos.*
ESTADOS PARÉTICOS: *Kali phos.*
FLUJO INTERMITENTE: *Natr. phos.*
FRECUENTE URGENCIA para orinar: *Ferr. phos.*, *Natr. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*
HEMATURIA: *Ferr. phos.*
por escorbuto: *Natr. mur.*
HEMORRAGIA DE LA URETRA: *Kali phos.*
INCISIVOS, dolores, en la uretra: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
en el cuello de la vejiga: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
INCONTINENCIA DE ORINA: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
por debilidad del esfínter: *Ferr. phos.*
— — nerviosa: *Kali phos.*
— — en los niños con acidez: *Natr. phos.*
mientras anda, tose, etc.: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
por parálisis del esfínter: *Kali phos.*
IRRITACIÓN EN EL CUELLO DE LA VEJIGA: *Ferr. phos.*
ISCURIA: *Ferr. phos.*

LOS NIÑOS se orinan en la cama: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*

MICCIÓN, escaldaduras á consecuencia de la: *Kali phos.*, *Natr. sulph.*

intermitente, necesidad de esfuerzo violento: *Natr. phos.*

urgencia dolorosa: *Magnes. phos.*

NEFRITIS escarlatinosa: *Calc. sulph.*, *Kali sulph.*

crónica: *Natr. sulph.*

NEURALGÍA VESICAL: *Magnes. phos.*

NOCTURNA, ENURESIS: *Magnes. phos.*, *Kali phos.*

ORINA AUMENTADA: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*

ORINA, exceso de, ácido úrico: *Kali mur.*, *Silicea.*

amarilla como azafrán: *Kali phos.*

arenillas en la: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. sulph.*, *Silicea.*

aumentada: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*

cálculos fosfáticos en la: *Calc. phos.*

cargada con bilis: *Natr. sulph.*

— — moco y pus: *Silicea.*

copiosa: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*

de color obscuro: *Kali mur.*, *Natr. phos.*

depósitos líticos en la: *Natr. sulph.*

depósito arenoso en la: *Natr. sulph.*

escasa: *Calc. fluor.*

incontinencia de la: *Natr. mur.*, *Kali. phos.*

involuntaria: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*

pus y moco, con la: *Natr. sulph.*

que exhala un olor picante: *Calc. fluor.*

ORINA, retenida espasmódicamente: *Magnes. phos.*
roja con fiebre héctica: *Calc. sulph.*
sale en chorro con cada acceso de tos: *Ferr. phos., Natr. mur.*
sanguinolenta: *Natr. mur.*
secreción excesiva: *Ferr. phos.; Natr. phos., Natr. sulph.*
sedimento como de ladrillo molido: *Natr. sulph, Silicea.*
sedimento floculento en la: *Calc. phos.*
— verde amarillento: *Natr. sulph.*
PIEDRA EN LA VEJIGA: *Calc. phos.*
POLIURIA, simple: *Natr. mur., Ferr. phos., Natr. sulph., Natr. phos., Calc. phos., Magnes. phos.*
con pirosis: *Natr. mur.*
RETENCIÓN DE ORINA: *Magnes. phos.*
espasmódica: *Magnes. phos., Natr. phos.*
RIÑONES, inflamación, efectos de la: *Kali mur.*
dolores en los: *Ferr. phos.*
supuración de los: *Silicea.*
SEDIMENTOS LÍTICOS en la orina: *Natr. sulph.*
SECRECIÓN DE ORINA, excesiva: *Ferr. phos., Natr. sulph. Natr. phos.*
SUPRESIÓN DE ORINA: *Ferr. phos.*
URETRA, hemorragia de la: *Kali phos*
dolores incisivos en la: *Kali phos.*
prurito en la: *Kali phos.*
URGENCIA FRECUENTE prra orinar: *Calc. phos, Natr. phos., Ferr. phos., Natr. sulph.*
micción: *Kali phos., Natr. phos.*

VEJIGA, catarro de la: *Natr. mur.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*
cuello de la, dolor incisivo en el: *Calc. phos*, *Kali. phos.*, *Ferr. phos.*
espasmo de la: *Magnes. phos.*
piedra en la: *Calc. phos.*

ÓRGANOS SEXUALES MASCULINOS

BALANITIS: *Kali sulph.*, *Kali. phos.*
BLENORRAGIA: *Natr. mur.*, *Kali sulph.*
complicada con eczema: *Kali. mur.*
BUBÓN: *Calc. sulph.*, *Kali. mur.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
CAÍDA de pelo en la región del pubis: *Natr. mur.*
CARIES, sifilíticas: *Silicea.*
CHANCRO, blando: *Kali mur.*
duro: *Calc fluor.*
fagedénico: *Kali phos.*
COITO, postración después del: *Kali. phos.*
CONDILOMA, sifilítico: *Natr. sulph.*
con dolor incisivo en la vejiga y la uretra: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
CORDÓN espermático dolorido: *Natr. mur.*
DESCARGA de líquido prostático: *Natr. mur.*
DESEO, sexual, extinguido: *Natr. phos.*
DOLOR tractivo en los testículos y cordones espermáticos: *Natr. phos.*
EDEMA, prepucial: *Natr. sulph.*
escrotal: *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*

EMISIONES, nocturnas: *Natr. phos.*, *Kali phos*, *Silicea.*
con calosfrío: *Natr. mur.*
sin ensueños: *Ferr. phos.*
EPIDIDIMITIS: *Ferr. phos.*
ERECCIONES: *Kali phos.*
ERECTISMO, sexual: *Silicea*, *Natr. phos.*
ESCROTAL, edema: *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*, *Calc. phos.*
ESCROTO, escozor del: *Silicea*, *Natr. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
sudor del: *Silicea.*
ESPERMATORREA: *Calc. sulph.*, *Natr. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
EXTINCIÓN del deseo sexual: *Natr. phos*, *Kali phos.*
aumento: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
FAGEDÉNICOS, chancros: *Kali. phos.*
GENITALES, prurito en los: *Natr. sulph.*
GONORREA, crónica: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*, *Calc. phos.*, *Silicea.*
con descarga acuosa: *Natr. mur.*
— — amarilla: *Kali. sulph.*
— anemia: *Calc. phos.*
— escaldadura en la: *Natr. mur.*
— escozor: *Calc. phos.*
— exudación intersticial en la: *Kali. mur.*
— exudación subcutánea: *Kalimur.*
— hinchazón: *Kali mur.*
— período inflamatorio: *Ferr. phos.*

GONORREA purulenta y saniosa: *Calc. sulph.*
sanguinolenta: *Kali phos.*, *Ferr. phos.*
suprimida: *Natr. sulph.*
transparente: *Natr. mur.*
verdiosa: *Kali sulph.*, *Natr sulph.*
viscosa: *Kali sulph*, *Natr. mur.*
después de inyecciones con el nitrato de plata: *Natr. mur.*
HIDROCELE: *Silicea*, *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*
IMPOTENCIA: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
INDURACIÓN de los testículos: *Calc. fluor.*
MASTURBACIÓN: *Calc. phos.*
NECROSIS, sifilítica: *Silicea.*
NODOS en la sífilis terciaria: *Silicea.*
ORQUÍTIS: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
por gonorrea suprimida: *Kali mur.*, *Kali sulph.*
PELO, pérdida del, en el pubis: *Natr. mur.*
PENSAMIENTOS sexuales persistentes: *Silicea.*
PICAZÓN del escroto: *Silicea*, *Calc. phos.*, *Natr. phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
en la uretra: *Kali phos.*
PREPUCIAL, edema: *Natr. sulph.*
PRÓSTATA, abscesos de la: *Calc. sulph.*
hipertrofiada: *Natr. sulph.*
inflamación, supurativa de la: *Silicea.*
PROSTATITIS supurativa: *Silicea.*
SEMEN delgado y acuoso: *Natr. phos.*
SEMINALES, emisiones, sin ensueños: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Silicea.*
con calosfrío: *Natr. mur.*

SENSACIÓN VOLUPTUOSA en los genitales: *Calc. phos.*
SEXUAL, eretismo: *Silicea*, *Calc. phos.*
SICOSIS: *Natr. sulph.*
SÍFILIS crónica: *Silicea*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*
agravaciones vespertinas en la: *Kali sulph.*
crónica: *Silicea*, *Kali mur.*, *Calc. fluor.*
nodos en la terciaria: *Silicea.*
período supurativo: *Calc. sulph.*
SUDOR en el escroto: *Silicea.*
TESTÍCULOS, dolor en los: *Natr. mur.*
indurados: *Calc. fluor.*
hinchazón de los: *Calc. phos.*, *Natr mur.*
URETRA dolorosa á la presión: *Natr. mur.*
dolor incisivo en la, después de orinar: *Natr. mur.*
VARICOCELE, dolor en los testículos: *Ferr. phos.*
VISIÓN DEBILITADA después del coito: *Kali phos.*

ÓRGANOS FEMENINOS.

AMENORREA: *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Calc. phos.*
ANTES DE LOS MENSTRUOS, dolores como de parto: *Calc. phos.*
dolor: *Magnes. phos.*, *Ferr. phos.*
hemorragia nasal: *Natr. sulph.*
tristeza: *Natr. mur.*
ARDOR EN EL ÚTERO: *Natr. mur.*
en la vagina, después de orinar: *Natr. mur.*
CLOROSIS: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*

CONGESTIÓN crónica del útero: *Kali mur.*, *Calc. fluor.*
excesiva, en los períodos: *Ferr. phos.*
CONSIDERABLE sequedad de la vagina. *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
DEBILIDAD en la región uterina: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*
DISLOCACIONES del útero: *Calc. fluor.*
con dolores reumáticos: *Calc. phos.*
uterinas con dolor reumático: *Natr. phos.*, *Calc. phos.*
DISMENORREA: *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
como un preservativo de la: *Ferr. phos.*
con vómitos de alimentos sin digerir: *Ferr. phos.*
con frialdad como de hielo: *Silicea.*
membranosa: *Magnes. phos.*
con urgencia frecuente para orinar: *Ferr. phos.*
DOLOR DE ESPALDA con padecimientos uterinos: *Calc. phos.*
incisivo en el útero: *Natr. mur.*
tractivo en la región uterina: *Calc. fluor.*
intenso, de una á otra parte del sacro: *Kali phos.*
obtuso y constante: *Ferr. phos.*
DURANTE LOS MENSTRUOS, cefalalgia: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
dolores como de parto: *Calc. phos.*
DUREZA de las mamas: *Calc. phos.*
ESTERILIDAD: *Silicea*, *Natr. phos.*

FLUJO excesivo: *Calc. fluor.*
FRIALDAD como de hielo al principio del flujo: *Silicea.*
GENITALES hinchados é inflamados: *Natr. sulph.*
HIPERTROFIA del útero: *Kali mur.*
HISTERIA: *Kali phos.*
HORMIGUEO en las partes externas: *Calc phos.*
con hinchazón: *Magnes. phos.*
LABIOS, abscesos de los grandes: *Silicea.*
LATIDOS en los genitales: *Calc. phos.*
LEUCORREA, ácida: *Natr. phos.*
acre: *Silicea, Kali phos., Natr. sulph.*
acuosa: *Natr. mur., Natr. phos., Kali sulph.*
amarilla: *Kali sulph., Kali phos.*
blanca: *Kali mur.*
color de miel: *Natr. phos.*
color de naranja *Kali phos.*
con comezón: *Silicea, Natr. mur.*
como clara de huevo: *Calc. phos.*
corrosiva: *Natr. mur., Natr. sulph.*
cremosa: *Natr. phos., Calc. phos.*
de olor agrio: *Natr. phos.*
escaldante: *Kali phos., Natr. mur.*
espesa: *Kali mur.*
irritante: *Natr. mur.*
moco albuminosa: *Calc. phos.*
moderada y lechosa: *Kali mur.*
mordicante: *Natr. mur.*
peor por las mañanas: *Calc. phos.*
profusa: *Silicea.*

LEUCORREA, verdiosa: *Kali sulph.*
viscosa: *Kali sulph.*

MAMAS, dureza de las: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*

MASTURBACIÓN en las niñas: *Calc. phos.*

MENSTRUACIÓN. (Véase Menstruos).

MENSTRUOS, acres: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*
acuosos: *Natr. mur.*
antes de los, dolor: *Magnes. phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
— dolores como de parto: *Calc. phos.*
— hemorragia nasal: *Natr. sulph.*
— tristeza: *Natr. mur.*
cada dos semanas: *Calc. phos.*
— tres semanas: *Ferr. phos.*
coagulados: *Kali. mur.*
con calofrío: *Natr. sulph.*
— acortamiento de los tendones de la rodilla: *Natr. phos.*
— agitación é insomnio: *Natr. phos.*
— cefalalgia: *Kali sulph.*, *Calc. sulph.*, *Kali phos.*
— congestión: *Ferr. phos.*
— cólico: *Magnes. phos.*, *Natr. sulph.*
— constipación: *Silicea*, *Natr. sulph.*
— debilidad considerable: *Kali sulph.*
— depresión mental: *Natr. mur.*
— diarrea matinal: *Natr. sulph.*
— dolor en el ovario: *Ferr. phos.*

MENSTRUOS, con dolores reumáticos: *Calc. phos.*
con excesiva tristeza: *Natr. mur.*
— frialdad como de hielo: *Silicea.*
— hinchazón de los labios: *Magnes. phos.*
— peso de saciedad en el abdomen: *Kali suph.*
— sacudimientos: *Calc. sulph.*, *Natr. mur.*
— sudor fétido en los pies: *Silicea.*
contenidos: *Kali mur.*
copiosos: *Natr. mur.*
corrosivos: *Natr. sulph.*
de larga duración: *Kali mur.*, *Calc. sulph.*
de olor desagradable: *Kali phos.*
de olor fuerte: *Kali phos.*
delgados: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
demasiado precoces: *Kali mur.*, *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Silicea*, *Calc. phos.*
demasiado escasos: *Kali phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
frecuentes: *Kali mur.*
de larga duración: *Kali mur.*, *Calc. sulph.*
profusos: *Kali phos.*, *Natr. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Calc. fluor.*, *Kali mur.*
tardíos: *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Kali sulph.*, *Calc. sulph.*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
descoloridos: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
cefalalgia, después de los: *Natr. mur.*
con deseo sexual intenso: *Kali phos.*
dolor como de parto durante los: *Calc. phos.*

MENSTRUOS, durante la cefalalgia: *Natr. mur.*
durante la sensación de presión dolorosa hacia abajo: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*
— el cólico: *Magnes. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. sulph.*, *Ferr. phos.*
— la lactancia: *Calc. phos.*, *Silicea.*
excesivos: *Kali mur.*, *Calc. fluor.*, *Natr. sulph.* *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
fibrosos: *Magnes. phos.*
filamentosos: *Magnes. phos.*
irregulares: *Kali phos.*
negros: *Kali mur.*
no coagulados: *Kali phos.*
obscuros: *Kali. mur.*, *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
precedidos por excitación sexual: *Calc. phos.*
prematuros: *Kali phos.*, *Calc. phos.*
retardados, con cefalalgia: *Natr. mur.*
retención de los: *Kali phos.*
rojo-obscuros: *Kali phos.*, *Calc. sulph*, *Kali sulph.*
rojo-negruzcos: *Kali phos.*
rojo-claros: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
secreción tenaz: *Kali. mur.*
suprimidos: *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Calc. phos.*

METRITIS: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*

METRORRAGIA: *Silicea*, *Kali sulph.*

NÁUSEA, durante y después de las caricias conyugales: *Silicea.*

NEURALGIA OVÁRICA, peor en el lado derecho: *Magnes. phos.*

NINFOMANÍA: *Silicea*, *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*

PECHOS, nudosidades duras en los: *Calc. fluor.*

PÉRDIDA DE PELO del pubis: *Natr. mur.*

PRESIÓN hacia los genitales en la mañana: *Natr. mur.*

PROLAPSUS UTERINO: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*

aliviado por sentarse: *Natr. mur.*

con sensaciones de hundimiento: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*

PRURITO DE LA VULVA: *Natr. mur.*, *Silicea.*

PRURITO VAGINAL en las mujeres ancianas: *Kali phos.*

PULSACIÓN DE LAS PARTES SEXUALES: *Calc. phos.*

QUISTES SEROSOS EN LA VAGINA: *Silicea.*

SENSACIÓN de presión dolorosa hacia abajo: *Calc. fluor.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*

de una bola que sube á la garganta: *Kali phos.*

SENSACIONES VOLUPTUOSAS: *Calc. phos.*

SEQUEDAD de la vagina: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*

ULCERACIÓN del cuello y del canal cervical: *Kali mur.*, *Silicea.*

ÚTERO, debilidad y molestia en el: *Natr. phos.*

VAGINA muy sensible: *Silicea*, *Ferr. phos.*

ardor y dolencia en la vagina después de orinar: *Natr. mur.*

inflamación de la: *Ferr. phos.*

VAGINA, seca y ardiente: *Ferr. phos.*
sensible: *Silicea, Ferr. phos.*
sequedad considerable: *Natr. mur.*
VAGINALES, quistes serosos: *Silicea.*
VAGINISMO: *Ferr. phos., Magnes. phos.*
VULVA, comezón de la: *Natr. mur., Silicea.*
imflamación vesicular de la: *Natr. sulph.*

EMBARAZO Y PARTO.

AMENAZA de aborto: *Kali phos., Magnes. phos.*
ARDOR en las mamas: *Calc. phos.*
CALAMBRES en las piernas: *Magnes. phos.*
CONSUNCIÓN después del parto: *Calc. phos.*
de la crianza prolongada: *Calc. phos.*
durante el embarazo: *Calc. phos.*
CONVULSIONES PUERPERALES: *Magnes. phos.*
DOLOR EN LOS PIES durante el embarazo: *Silicea.*
DOLORES, falsos, ineficaces y lentos: *Kali phos.*
débiles: *Kali phos.*
espasmódicos: *Magnes. phos.*
DOLORES DE SOBREPARTO: *Kali phos., Magnes. phos.*
débiles, debido á la lentitud de las contracciones: *Calc. fluor., Ferr. phos.*
ESCIRRO de las mamas: *Silicea.*
EXCESIVOS ESFUERZOS EXPULSIVOS: *Magnes. phos.*
FIEBRE PUERPERAL: *Kali phos., Kali mur.*
FLEGMASIA ALBA DOLENS: *Natr. sulph.*
LA LECHE DE LA MADRE es salada y azulosa: *Calc. fluor., Calc. phos.*

LAXITUD en todos los miembros durante el embarazo: *Calc. phos.*

LOS PEZONES se agrietan y ulceran fácilmente: *Silicea.*

MALPARTO INMINENTE: *Kali phos., Magnes. phos.*

MAMAS que se sienten aumentadas de volumen: *Calc. phos.*

masas duras en las: *Calc. fluor., Silicea.*

úlceras fistulosas en las: *Silicea.*

MANÍA, puerperal: *Kali phos.*

MASTITIS: *Silicea, Calc. sulph., Kali mur., Ferr. phos., Calc. fluor.*

secreción de pus moreno, desagradable: *Kali phos.*

NÁUSEAS MATINALES, vómito de alimentos sin digerir: *Ferr. phos.*

flema acuosa, espumosa: *Natr. mur.*

flema blanca: *Kali mur.*

vómito de masas agrias: *Natr. phos.*

NÓDULOS, duros, en las mamas: *Calc. fluor.*

PÉRDIDA DEL CABELLO durante el parto y la lactancia: *Natr. mur.*

PIES, dolencia y cojera de los: *Silicea.*

PUERPERAL, convulsiones: *Magnes. phos.*

fiebre: *Kali mur., Kali phos.*

manía: *Kali phos.*

ULCERAS DE LAS MAMAS, fistulosas: *Silicea.*

VÓMITOS con sabor amargo: *Natr. sulph.*

ÓRGANOS RESPIRATORIOS.

ABSCESOS de los pulmones: *Silicea.*
ANSIEDAD DOLOROSA, sobre el esternón: *Calc. phos.*
ASMA, agravada en la estación calurosa: *Kali sulph.*
bronquial: *Kali sulph.*, *Kali mur.*
despierta en la noche con ataque de: *Natr. sulph.*
por el más ligero alimento: *Kali phos.*
con desarreglos gástricos: *Kali mur.*, *Natr. sulph.*
— expectoración grumosa, amarilla: *Calc. fluor.*
— fiebre héctica: *Calc. sulph.*
— moco acuoso, profuso: *Natr. mur.*
— saltos espasmódicos: *Natr. mur.*
cuando es molesta la flatulencia: *Magnes. phos.*
de heno: *Kali phos.*
en los niños: *Natr. sulph.*
húmeda: *Natr. sulph.*
nerviosa: *Magnes. phos.*
peor cambiando al tiempo húmedo: *Natr. sulph.*
BRONQUITIS: *Ferr. phos.*, *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*
crónica: *Natr. mur.*, *Silicea.*
con expectoración amarilla: *Kali sulph.*
CALOR EN EL PECHO: *Ferr. phos.*
CONGESTIÓN de los pulmones: *Ferr. phos.*

CORTEDAD del aliento: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Kali sulph.*, *Calc. phos.*
subiendo escaleras: *Kali phos.*
CRUP: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*. *Calc. sulph.*, *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*, *Kali phos.*
DETENCIÓN EN LA RESPIRACIÓN: *Ferr. phos.*
DISPNEA: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*,, *Kali sulph.*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*
durante el tiempo húmedo: *Natr. sulph.*
DOLENCIA ARDIENTE en el pecho: *Ferr. phos.*
DOLENCIA DE PECHO, aliviada por la presión: *Natr. sulph.*
al tacto: *Calc. phos.*
músculos intercostales: *Natr. phos.*
pulmones: *Ferr. phos.*
DOLOR de los músculos intercostales: *Natr. phos.*
DOLORES EN EL PECHO, agravados por respirar: *Natr. phos.*
de una á otra parte: *Calc. sulph.*
lado izquierdo, penetrantes: *Natr. sulph.*
presivos: *Natr. phos.*
EDEMA DE LOS PULMONES: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
EL MOCO se desliza hacia atrás y es tragado: *Kali sulph.*
EMPIEMA: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
ESPASMO DE LA GLOTIS: *Calc. phos.*
ESTERTORES MUCOSOS, en el pecho: *Natr. sulph.*, *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*
ESTRECHEZ ESPASMÓDICA de la tráquea: *Magnes. phos.*
EXPECTORACIÓN acuosa: *Natr. mur.*, *Kali sulph.*

Expectoración amarillenta: *Calc. fluor., Kali sulph., Silicea, Calc. phos., Kali phos.*
arrojada con dificultad: *Natr. mur., Calc. phos., Kali mur.*
ausencia de la: *Ferr. phos., Magnes. phos.*
clara: *Natr. mur.*
copiosa: *Silicea, Kali sulph.*
desagradable: *Silicea.*
el esputo retrocede de nuevo: *Kali sulph.*
escasa, estríada con sangre: *Ferr. phos.*
espesa: *Natr. sulph., Silicea, Kali mur., Kali phos.*
espumosa: *Natr. mur., Kali phos.*
fétida: *Kali phos.*
floja: *Natr. mur., Kali sulph., Silicea.*
glutinosa y blanquizca: *Kali mur.*
granular: *Silicea.*
grumosa: *Calc. fluor.*
lechosa: *Kali mur.*
mucosa: *Calc. fluor., Calc. phos.*
pegajosa: *Natr. sulph.*
profusa: *Kali sulph., Silicea.*
purulenta: *Natr. sulph., Calc. sulph., Silicea.*
ruidosa: *Natr. mur., Silicea.*
salada: *Kali phos.*
saniosa: *Kali sulph.*
serosa: *Natr. mur., Kali phos.*
verdiosa: *Natr. sulph., Kali sulph., Silicea.*
viscosa: *Kali sulph.*

Extenuación, en la tisis: *Calc. phos.*

FIEBRE DE HENO: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
FIEBRE HÉCTICA: *Calc. sulph.*, *Silicea*, *Calc. phos.*
FÍSTULA EN EL ANO, con padecimientos del pecho: *Calc. phos.*, *Silicea.*
FRIALDAD DE LOS PIES con sufrimiento del pecho: *Calc. phos.*
GARGAJEO FRECUENTE: *Calc. phos.*
GARRASPERA: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Calc. sulph.*, *Silicea*, *Calc. fluor.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*
por el frío: *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*
GLOTIS, espasmo de la: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
HEMOPTISIS, después de caída ó conmoción: *Ferr. phos.*
LA ACCIÓN DE HABLAR es fatigosa: *Kali sulph.*
LA EPIGLOTIS se siente estrechada: *Calc. fluor.*
LARINGE, dolorida: *Ferr phos.*
irritada: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
ulcerada: *Ferr. phos.*
LARINGITIS: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*. *Natr. mur.*
MICCIÓN INVOLUNTARIA al toser: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*
OPRESIÓN de la respiración: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
PECHO, constricción del: *Magnes. phos.*
contracción del: *Calc. phos.*
debilidad en el: *Silicea.*
dolencia mejorada por la presión: *Natr. sulph.*
doloroso al tacto: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
dolores agravados por la profunda respiración: *Natr. phos.*
— por la presión: *Natr. phos.*

PECHO, dolores al través del: *Calc. sulph.*
dolores lancinantes: *Magnes. phos.*, *Natr. sulph.*
dolores profundamente situados: *Silicea.*
ruido de moco en el: *Kali sulph.*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*

PLEURESÍA: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*

PNEUMONÍA: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*, *Kali sulph.*, *Silicea*, *Natr. mur.*

PROFUSOS, sudores nocturnos: *Calc. phos.*, *Silicea.*

PULMONES, congestión de los: *Ferr. phos.*

PUNZADAS EN LOS COSTADOS: *Ferr. phos.*

RESFRIARSE CON FACILIDAD: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*

RESPIRACIÓN acelerada y oprimida: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
insuficiente: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Calc, phos.*, *Kali sulph.*, *Natr. mur.*

RESPIRACIÓN JADEANTE: *Kali mur.*

RONQUERA crupal: *Kali sulph.*
después de cantar ó declamar: *Ferr. phos.*

SENSACIÓN FATIGOSA en la faringe: *Kali sulph.*

SE SOSTIENE EL PECHO mientras tose: *Natr. sulph.*

SOFOCATIVA, tos, en los niños: *Calc. phos.*
sensación: *Kali sulph.*

SUDOR, nocturno: *Calc. phos.*, *Silicea.*
profuso, alrededor de la cabeza y del cuello: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*

SUDORES NOCTURNOS PROFUSOS: *Silicea*. *Calc. phos.*

SUSPIRAR, tendencia á: *Natr. phos.*, *Calc. phos.*

TISIS: *Calc. sulph.*, *Silicea*, *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Calc. phos.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*
florida: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*
TOS, acostándose: *Magnes. phos.*, *Calc. fluor.*, *Silicea.*
agravada en la noche: *Kali sulph.*
— mañana: *Natr. sulph.*
aguda: *Kali mur.*, *Ferr. phos.*
áspera: *Kali mur.*
breve: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*
causando cefalalgia: *Natr. mur.*
con titilación: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Calc. fluor.*
— cefalalgia como si la cabeza estallase: *Natr. mur.*
— emisión involuntaria de orina: *Ferr. phos.* *Natr. mur.*
— sensación de desfallecimiento en el pecho: *Natr. sulph.*
— sudores nocturnos: *Silicea.*
convulsiva: *Magnes. phos.*
coqueluche: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*, *Kali phos.*
con cosquilleo detras del esternón: *Natr. mur.*
— en la laringe: *Calc. fluor.*
— en la tráquea: *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
— en la fosa supraesternal: *Silicea.*
— en la garganta: *Calc. fluor.*
crónica, de los tísicos: *Calc. phos.*, *Silicea.*
crupal: *Kali mur.*
de ladrido: *Kali mur.*

Tos, dolorosa: *Ferr. phos.*
dura: *Ferr. phos.*, *Kali sulph.*
entrecortada: *Calc. fluor.*
espasmódica: *Magnes. phos.*, *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
estertor flojo: *Silicea.*
estrepitosa y tumultuosa: *Kali mur.*
floja, ruidosa: *Kali sulph.*, *Silicea*, *Natr. mur.*
irritante: *Silicea.*
mejorada acostándose: *Calc. phos.*
nerviosa: *Magnes. phos.*
paroxísmica: *Magnes. phos.*
periódica: *Natr. mur.*
por las bebidas frías: *Silicea.*
ronca: *Kali sulph.*
seca: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*
sofocativa en los niños, que se mejora acostándolos: *Calc. phos.*
Tos ferina: *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*, *Calc. phos.*, *Kali mur.*, *Kali phos.*
Tráquea, irritada y dolorida: *Kali phos.*
Traqueítis: *Ferr. phos.*
Voz, pérdida de la: *Ferr. phos.*, *Kali. mur.*
pérdida por parálisis de las cuerdas vocales: *Kali phos.*
aguda, repentina: *Magnes. phos.*
penetrante precipitada: *Magnes. phos.*

ACCIÓN INTERMITENTE del corazón: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
ANEURISMA: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
ANGINA PECTORIS: *Magnes. phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
ARTERITIS: *Ferr. phos.*
CARDITIS: *Ferr. phos.*
CIRCULACIÓN PEREZOSA: *Kali phos.*
CONDICIONES ANÉMICAS con trastornos del corazón: *Kali phos.*
CORAZÓN, agitación hacia el: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
constricción en el: *Natr. mur.*
dilatación del: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
dolor en la base del: *Natr. phos.*
— en el, durante la inspiración: *Calc. phos.*
hipertrofia del: *Natr. mur.*
DILATACIÓN de los vasos sanguíneos: *Calc. fluor.*
del corazón: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
DOLORES en la base del corazón: *Natr. phos.*
alrededor del, durante la inspiración: *Calc. phos.*
EMBOLISMO: *Kali mur.*
ENDOCARDITIS: *Ferr. phos.*
ENFERMEDAD crónica del corazón: *Silicea.*
EXTREMIDADES adormecidas: *Natr. mur.*
FLEBITIS: *Ferr. phos.*
FRIALDAD DE LAS MANOS: *Natr. mur.*
INTERMITENTE, acción, del corazón: *Kali phos.*, *Natr. mur.*

LANGUIDEZ ocasionada por susto ó fatiga: *Kali phos.*
LINFANGITIS: *Ferr. phos.*
NÆVIS: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
OBSTRUCCIÓN IMPERFECTA del agujero oval: *Calc. phos.*
PALPITACIÓN con ansiedad: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
después de fiebre reumática: *Kali phos.*
— de movimiento violento: *Silicea*, *Ferr. phos.*
con insomnio: *Kali phos.*
nerviosa y espasmódica: *Magnes. phos.*
por excesivo flujo de sangre: *Kali mur.*
— emoción mental ó subiendo escaleras: *Kali phos.*
se siente el pulso en diferentes partes del cuerpo: *Natr. phos.*
PERICARDITIS: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*
PULSO, apenas perceptible: *Kali sulph.*
intermitente: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
irregular: *Kali phos.*
lleno, acelerado, no filiforme: *Ferr. phos.*
rápido: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*, *Silicea.*
se siente en todo el cuerpo: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
vivo: *Kali sulph.*, *Ferr. phos.*
TELANGIECTASIS: *Ferr. phos.*
TEMBLOR en el corazón: *Natr. phos.*
TUMORES, vasculares: *Calc. fluor.*
VARICOSAS, ulceraciones: *Calc. fluor.*
venas: *Ferr. phos.*, *Calc. fluor.*
VASCULARES, tumores: *Calc. fluor.*

VASOS SANGUÍNEOS, dilatación de los: *Calc. fluor.*
VÉRTIGO por acción débil del corazón: *Kali phos.*

DORSO Y EXTREMIDADES.

ABSCESOS DEL PSOAS: *Silicea.*
AFECCIÓN ESPASMÓDICA en el dorso: *Ferr. phos., Calc. sulph.*
el cuello: *Natr. phos.*
AMBULANTES, dolores, en el dorso: *Kali sulph., Magnes. phos.*
AMPOLLAS ENCONADAS en los dedos *Natr. mur.*
ANEMIA, espinal: *Kali phos., Natr. phos.*
ANQUILOSIS de la rodilla: *Silicea.*
APÓFISIS hinchadas: *Calc. phos.*
ARDOR de las plantas de los pies: *Calc. sulph., Kali phos., Natr. mur.*
ARTICULACIONES de los dedos abultadas: *Calc. fluor.*
flictenas pruritosas sobre las: *Natr. mur.*
inflamadas: *Natr. phos., Ferr. phos.*
rígidas: *Calc. sulph., Natr. sulph.*
abultamiento gotoso de las: *Calc. fluor.*
crujidos en las: *Calc. fluor., Natr. mur., Natr. sulph.*
dolor violento en las: *Natr. phos.*
hinchazón alrededor: *Kali mur.*
inflamación fungoide de las: *Kali sulph.*
reumatismo crónico de las: *Natr. mur., Calc. phos.*
ARTICULACIONES CARPIANAS doloridas: *Natr. phos., Ferr. phos., Calc. phos.*

ARTRÍTICO, reumatismo: *Natr. phos.*
ARTRÍTICAS, hinchazones: *Natr. mur.*
ASENTADERAS dormidas: *Calc. phos.*
ATAXIA LOCOMOTRIZ: *Natr. sulph*, *Silicea.*
BOCIO: *Calc. fluor.*, *Natr. mur.*, *Calc. phos.*, *Natr. phos.*
CADERAS, dolores en las: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
lado izquierdo, punzadas en el: *Natr. sulph.*
CALAMBRES en las pantorrillas: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
en las manos mientras se escribe: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*
las extremidades: *Kali sulph.*
CÁPSULAS SINOVIALES: *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*
CARBUNCLOS sobre el dorso: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
CARIES de los huesos de las extremidades: *Silicea.*
CARNE FUNGOSA: *Kali mur.*, *Silicea.*
CERVICALES, glándulas, abultadas: *Kali mur.*, *Natr. phos.*
induradas: *Calc. fluor.*
CIÁTICA: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. sulph.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
COJERA, paralítica y reumática: *Kali phos.*
por el frío: *Ferr. phos.*
COMEZÓN de las piernas: *Kali mur.*, *Kali phos.*
como picaduras de insectos: *Natr. phos.*
de las palmas de las manos: *Kali phos.*
de las plantas de los pies: *Calc. sulph.*, *Kali phos.*
de los dedos del pie: *Natr. sulph.*

CONTRACCIÓN DE LOS EXTENSORES: *Natr. phos.*

COXIS ESTROPEADO, después de andar á caballo: *Silicea.*

COXALGÍA: *Natr. mur.*

CRUJIDOS de las articulaciones: *Calc. fluor.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*

de los tendones: *Kali mur.*, *Ferr. phos.*

CUELLO, enflaquecido, en los niños: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*

rígido por el frío: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. phos.*

DEBILIDAD MUSCULAR: *Kali phos.*

DEBILIDAD, general: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*

DECRECIMIENTO DE LAS UÑAS en los dedos del pie: *Silicea*, *Kali mur.*

DEDOS DE LOS PIES, comezón en los: *Natr. sulph.*

DEDOS, panadizos en los: *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Silicea*, *Natr. sulph.*

DOLENCIA entre los omóplatos: *Silicea.*

de los muslos: *Calc. phos.*

DOLOR de los miembros: *Calc. phos.*

de los hombros: *Calc. phos.*

entre las escápulas: *Kali phos.*

DOLOR DE ESPALDA, agravado en la noche: *Kali sulph.*

en la región lumbar en la mañana: *Calc. phos.*

— habitación caliente: *Kali sulph.*

mejorado por echarse sobre alguna cosa dura: *Natr. mur.*

DOLOR DE ESPALDA, mejorado al aire libre: *Kali sulph.*
con irritación espinal excitante: *Calc. flour.*
DOLORES ATORMENTADORES en las coyunturas: *Magnes. phos.*
DOLORES NEURÁLGICOS en los miembros: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*
DOLORES EN EL DORSO Ó EXTREMIDADES, continuos, entre los omóplatos: *Calc. phos.*
agudos: *Magnes. phos.*
agravados por el esfuerzo: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
— por la fatiga: *Kali phos.*
— por el movimiento: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
— por el calor de la cama: *Kali mur.*
— en la noche: *Kali sulph.*
— en la estación calurosa: *Kali sulph.*
— al levantarse: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
mejorados por el movimiento suave: *Kali phos.*
— al aire libre: *Kali sulph.*
ambulantes: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*
como relámpago: *Kali mur.*, *Magnes. phos.*
en la espinilla: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*
en el carpo: *Natr. phos.*
en el coxis: *Calc. phos.*, *Calc. sulph.*
en las plantas de los pies: *Kali phos.*, *Natr. phos.*

DOLORES EN EL DORSO Ó EXTREMIDADES, en la raíz de las uñas de los dedos: *Calc. phos.*
en las rodillas: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*
en la sincondrosis sacro-ilíaca: *Calc. phos.*
espasmódicos: *Magnes. phos.*
hacia la parte inferior de la espalda: *Calc. fluor.*
hasta los pies: *Silicea.*
lancinantes: *Magnes. phos.*
localizados en los hombros: *Silicea*, *Ferr. phos.*
neurálgicos: *Kali suph.*, *Magnes. phos.*
periódicos: *Kali sulph.*
que súbitamente van al corazón: *Natr. phos.*
reumáticos: *Kali sulph.*
taladrantes: *Magnes. phos.*
DORSO, calambre en el: *Ferr. phos.*, *Calc. sulph.*
carbunclos en el: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
dolencia en el: *Natr. sulph.*
dolor en el, que se extiende hacia abajo: *Calc. fluor.*
dolor en el, aliviado por el movimiento: *Kali phos.*
— entre las escápulas: *Calc. phos.*
dolor agudo taladrante en el: *Magnes. phos.*
dolor lancinante en el: *Magnes. phos.*
dolores neurálgicos en el: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*
dolores reumáticos: *Kali sulph.*
entumecido: *Calc. phos.*

DORSO, espasmos en el: *Natr. sulph.*
frío: *Natr. mur.*
sensación débil en el: *Natr. phos.*
EDEMA DE LOS PIES: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
EL MOVIMIENTO agrava los dolores: *Kali mur.*, *Ferr. phos.*
los mejora: *Kali sulph.*, *Kali phos.*
ENFERMEDAD de la articulación de la cadera: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*, *Silicea*, *Calc. phos.*
ENFLAQUECIMIENTO del cuello en los niños: *Natr. mur.*, *Calc. phos.*
ENTORPECIMIENTO de los miembros. *Calc. phos.*, *Kali phos.*.
ESPASMOS TÓNICOS de las manos, pies ó de sus dedos: *Silicea.*
ESPINA BÍFICA: *Calc. phos.*, *Ferr. phos*, *Calc. fluor.*, *Silicea.*
ventosa: *Calc. fluor.*
ESPINA sensible al tacto: *Magnes. phos.*. *Natr. mur.*
ESPINAL, anemia: *Kali phos.*, *Natr. phos.*., *Natr. mur.*
curvatura: *Calc. phos.*, *Silicea.*
exceso de sensibilidad: *Natr. mur.*, *Silicea.*
irritación: *Calc. phos.*, *Silicea.*
médula, reblandecimiento de la: *Kali phos.*
meningitis: *Natr. sulph.*
EXÓSTOSIS en los dedos: *Calc. fluor.*
EXTENSORES, contracción de los: *Natr. phos.*
EXTREMIDADES entumecidas: *Natr. mur.*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*

FALANGES fácilmente dislocadas: *Calc. fluor.*

FALTA DE CRECIMIENTO de las uñas de los dedos del pie: *Silicea, Kali mur.*

FRIALDAD en el dorso y extremidades: *Natr. mur.*
de los miembros: *Calc. phos.*

GANGLIONES en el dorso del carpo: *Calc. fluor.*

GLÁNDULAS CERVICALES aumentadas: *Kali mur.*
induradas: *Calc. fluor.*

GOTA, aguda: *Natr. sulph., Ferr. phos., Natr. phos.*
abultamiento de las articulaciones por la: *Calc. fluor.*
ataques periódicos de: *Natr. mur.*
crónica: *Natr. sulph., Natr. phos.*
dolores de la: *Kali mur., Natr. mur.. Calc. phos.*
reumática, agravada en la noche: *Calc. phos.*

HERIDAS SUPURANTES: *Calc. sulph., Silicea.*

HINCHAZÓN crónica de las piernas: *Kali mur.*
de la articulación del codo: *Calc. fluor.*
de las piernas, crónica: *Kali mur.*

INDURADAS, glándulas, cervicales: *Calc. fluor.*

INFLAMACIÓN fungoide de las coyunturas: *Kali sulph.*
de las articulaciones: *Ferr. phos., Kali sulph., Magnes. phos., Natr. phos., Kali mur.*
articulación de la rodilla: *Calc. fluor.*
fungoide: *Kali sulph.*

INVOLUNTARIOS, sacudimientos, durante el sueño: *Natr. mur.*
movimiento violento de las manos: *Magnes. phos.*

JUANETES: *Kali mur.*

LAS PIERNAS flaquean al andar: *Natr. phos.*
LAXITUD: *Natr. mur.*
LENTITUD para comenzar á andar: *Calc. phos.*
LOS MALEOLOS se sienten como si se dislocasen: *Calc. phos.*
débiles: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*
doloridos: *Natr. mur.*, *Silicea*, *Ferr. phos.*
LOS BRAZOS se sienten pesados: *Silicea.*
cansados: *Natr. phos.*
LUMBAGO por torcedura: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
MAGULLADURA, sensación general de: *Kali phos.*
dolor de, en el dorso: *Natr. sulph.*
MAL DE POTT: *Calc. phos.*
MANOS, agitación involuntaria de las: *Magnes. phos.*
dormidas: *Calc. phos.*
espasmos de las: *Silicea.*
frías: *Natr. mur.*
hinchadas y adoloridas: *Ferr. phos.*
palmas de las, calientes: *Ferr. phos.*
— ásperas y doloridas: *Natr. sulph.*
— piel de las, seca y rajada: *Natr. mur.*
se entiesan al escribir: *Calc. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. phos.*
se sienten pesadas: *Silicea.*
temblorosas: *Natr. sulph.*
verrugas en las palmas de las: *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*

MARCHA VACILANTE: *Natr. phos.*
MENINGITIS, espinal: *Natr. sulph.*
MIEMBROS, prurito en los: *Kali mur.*
dolores neurálgicos en los: *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*
dormidos: *Natr. mur.*
entorpecimiento y frialdad de los: *Calc. phos.*
sacudimiento de los: *Natr. mur.*
se sienten cansados los: *Silicea.*
temblor de los: *Calc. phos.*
MUSLOS, en la parte interior, encogidos: *Natr. phos.*
NUCA, dolores en la: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*
tirantez en la: *Natr. sulph.*
PADRASTROS: *Natr. mur.*
PALMAS de las manos calientes: *Ferr. phos.*
comezón: *Kali phos.*
escoriadas y doloridas: *Natr. sulph.*
PANADIZO: *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Silicea*, *Natr. sulph.*
PANTORRILLAS, calambres en las: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
debilidad en las: *Natr. mur.*
PARÁLISIS AGITANTE: *Magnes. phos.*
PARALÍTICA, cojera: *Kali phos.*, *Natr. phos.*
tendencia: *Kali phos.*
PERSPIRACIÓN FÉTIDA de los pies: *Silicea.*
PIERNAS ENCORVADAS en los niños: *Calc. phos.*
PIES, ardor de los: *Kali phos.*
comezón de las plantas de los: *Calc. sulph.*

PIES, delicados, cansados: *Silicea.*
dormidos: *Natr. mur.*
espasmos tónicos de los: *Silicea.*
flojedad y edema de los: *Natr. sulph.*
frfos por el día, calientes en la noche: *Natr. phos.*
hinchados: *Kali mur.*
sensibles: *Magnes. phos.*
PLANTAS DE LOS PIES ardientes: *Calc. sulph.*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*
comezón en las: *Calc. sluph.*, *Kali phos.*
dolores tractivos en las: *Kali phos.*, *Natr. phos.*
PUNZADAS en los codos: *Calc. phos.*
REBLANDECIMIENTO IDIOPÁTICO de la médula espinal: *Kali phos.*
REPTACIÓN Y HORMIGUEO en los miembros: *Calc. phos.*
RIGIDEZ DEL CUERPO: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
después del reposo: *Kali phos.*
después de un resfriado: *Ferr. phos.*
REUMÁTICA, cojera: *Kali phos.*
dolores gotosos: *Kali mur.*, *Natr. phos.*
fiebre: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
rigidez del cuello: *Calc. phos.*
REUMATISMO, agudo: *Calc. phos.*, *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Kali mur.*
agravados por el cambio de tiempo: *Calc. phos.*
— el esfuerzo: *Kali phos.*
— la fatiga: *Kali phos.*

REUMATISMO, agravado por el calor ó el frío: *Calc. phos.*
agravado por el movimiento: *Ferr phos.*
— la noche: *Calc. phos.*
— el calor de la cama: *Kali mur.*
— en la mañana: *Kali phos.*
articular: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Calc. phos.* *Natr.-phos.*
crónico: *Calc. phos.*, *Kali mur.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Kali sulph.*, *Silicea*, *Calc. sulph.*
de las coyunturas, dolores violentos: *Kali sulph.*, *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
mejorado por el movimiento suave: *Kali phos.*
— calor moderado: *Ferr. phos.*
muscular: *Ferr. phos.*
propagado alrededor: *Calc. phos.*, *Kali sulph.*
se siente durante el movimiento: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
subagudo: *Ferr. phos.*

RODILLAS, debilidad de las: *Natr. mur.*
doloridas: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
herpes en el pliegue de las: *Natr. mur.*
inflamadas: *Calc. fluor.*
sinovitis crónica de las: *Silicea.*

RODILLERAS DE LAS SIRVIENTES: *Calc. phos.*, *Silicea.*

SABAÑONES: *Kali mur.*, *Kali phos.*

SENSACIÓN de agitación en los pies: *Kali phos.*

SENSACIÓN DE HORMIGAS que andan por todas partes: *Calc. phos.*
de picaduras de insectos: *Natr. phos.*
SENSACIÓN DE CANSANCIO en la espalda: *Calc. fluor.*
SENSIBILIDAD EXCESIVA de la espina dorsal: *Natr. mur.*, *Silicea.*
SINCONDROSIS SACRO-ILÍACA, dolores en la: *Calc. phos.*
SINOVITIS, crónica: *Silicea*, *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*
SUDOR DESAGRADABLE de las axilas ó de los pies: *Silicea.*
TENALGÍA CREPITANTE: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. phos.*, *Calc. fluor.*
TENDONES DE LAS CORVAS, doloridos: *Natr. phos.*
contracción dolorosa de los: *Natr. mur.*
TORCEDURA DEL CUELLO por el frío: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
TORCEDURAS de los ligamentos ó tendones: *Ferr. phos.*
TRACCIÓN DOLOROSA en la espalda hacia abajo: *Calc. fluor.*
TROPIEZA con facilidad: *Kali phos.*
TUMORES ÓSEOS: *Calc. fluor.*
ULCERAS FISTULOSAS: *Silicea.*
alrededor de los pies: *Calc. phos.*
ULCERAS DE LAS EXTREMIDADES: *Kali mur.*
indolentes: *Silicea*, *Calc. phos.*
sifilíticas: *Calc. phos.*, *Silicea.*
UÑAS, estropeadas y quebradizas: *Silicea*, *Kali sulph.*
dolores en la raíz de las: *Calc. phos.*

URTICARIA alrededor de las coyunturas: *Natr. mur.*
VERRUGAS en las palmas de las manos: *Kali mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*

SÍNTOMAS NERVIOSOS.

AGOTAMIENTO, nervioso: *Kali phos. Magnes. phos.*
con cólico: *Natr. sulph.*
— eretismo: *Silicea.*
ALCOHOLISMO: *Magnes. phos.*
ANEMIA, espinal: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
ARRASTRA LOS PIES en la parálisis: *Kali phos.*
ATRÓFICA, parálisis: *Kali phos.*
BOLA, sensación de, en la garganta: *Kali phos.*
CALAMBRES, de los escribientes ó violinistas: *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*
CIÁTICA: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*, *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
CONGESTIVA, neuralgía: *Ferr. phos.*
CONTORSIONES de los miembros: *Magnes. phos.*
CONTRACCIONES TETÁNICAS: *Magnes. phos.*
CONVULSIONES durante el desarrollo: *Calc. phos.*
en la dentición de los niños: *Ferr. phos. Calc. phos.*
con rigidez: *Magnes. phos.*
COREA: *Natr. mur.*, *Magnes. phos.*, *Kali sulph.*
por lombrices: *Silicea.*
con evacuaciones retardadas: *Natr. sulph.*
DEBILIDAD después de enfermedades agudas: *Calc. phos.*

DEBILIDAD histérica: *Natr. mur.*
nerviosa: *Kali phos.*
DEBILIDAD: *Calc. sulph.*, *Calc. fluor.*, *Kali phos.*, *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
DEDOS Ó PUÑOS CERRADOS: *Magnes. phos.*
DEPRESIÓN, nerviosa: *Kali phos.*
DESFALLECIMIENTO: *Calc. sulph.*, *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*
DIENTES APRETADOS: *Magnes. phos.*
DOLORES COMO RELÁMPAGOS: *Magnes. phos.*
DOLORES VIVOS á lo largo de los nervios: *Natr. mur.*, *Magnes. phos.*
EPILEPSIA, con aflujo de sangre á la cabeza: *Ferr. phos.*
después de erupciones suprimidas: *Kali mur.*, *Calc. phos.*
por susto repentino: *Kali phos.*
por hábitos viciosos: *Magnes. phos.*
que ocurre por la noche: *Silicea.*
ESCRIBIENTES, calambres de los: *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. phos.*
ESPASMOS de la glotis: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
por la causa más leve: *Silicea.*
que se extienden desde el plexo solar: *Silicea.*
tetánicos: *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. mur.*
ESPINAL, anemia: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*
irritación: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Silicea.*

ESTADO TEMBLOROSO del cuerpo: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos*, *Kali phos.*
de los miembros: *Calc. phos.*, *Silicea.*
ESTRABISMO ocasionado por lombrices: *Natr. phos.*
ESTRECHEZ ESPASMÓDICA de los esfínteres: *Silicea.*
ESTREMECIMIENTO al más ligero ruido: *Kali mur.*, *Kali phos.*
FACIAL, parálisis: *Kali phos.*
FALTA DE FUERZA: *Kali phos.*
GLOBO HISTÉRICO: *Kali phos.*
HEMIPLEGIA: *Kali sulph.*
HIPO: *Natr. mur.*, *Magnes. phos.*
HISTERIA por emociones repentinas: *Kali phos.*
obstinada: *Silicea.*
con debilidad. *Natr. mur.*
INFANTIL, parálisis: *Kali phos.*
INFLAMATORIA neuralgia: *Ferr. phos.*
INQUIETUD, deseo de moverse: *Natr. sulph.*
LOS DEDOS están cerrados: *Magnes. phos.*
LATIDOS DOLOROSOS: *Calc. sulph.*, *Magnes. phos.*, *Natr. mur.*
de las manos durante el sueño: *Natr. sulph.*, *Magnes. phos.*
de los músculos faciales por las lombrices: *Natr. phos.*
MOVIMIENTOS involuntarios: *Magnes. phos.*
NERVIOSO, agotamiento: *Kali phos.*, *Natr. phos.*
por excesos sexuales: *Kali phos.*
NERVIOSIDAD en la noche: *Ferr. phos.*
NEURALGIA, congestiva: *Ferr. phos.*

NEURALGIA, como choques eléctricos: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
del ano: *Calc. phos.*
inflamatoria: *Ferr. phos.*
intercostal: *Magnes. phos.*
obstinada: *Silicea.*
que se presenta en la noche: *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
recurrente: *Natr. mur.*, *Calc. phos.*
que va de un lugár á otro: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*
peor por el cambio de tiempo: *Calc. phos.*
PARÁLISIS agitante: *Magnes. phos.*
atrófica: *Kali phos.*
de cualquiera parte del cuerpo: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
de la vejiga: *Kali phos.*
facial: *Kali phos.*
infantil: *Kali phos.*
locomotriz: *Kali phos.*
por tabes dorsal: *Silicea.*
que viene repentinamente: *Kali phos.*
que obliga á arrastrar los pies: *Kali phos.*
reumática: *Calc. phos.*, *Ferr. phos*, *Kali phos.*
PASO VACILANTE: como si estuviese paralizado: *Natr. phos.*
PÉRDIDA del poder motriz: *Kali phos.*
del sentido del tacto: *Kali phos.*
PULGARES encarcelados entre los dedos: *Magnes. phos.*

RIGIDEZ: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*

SE FATIGA con facilidad: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*

SENSACIÓN DE REPTACIÓN, como de hormigas: *Calc. phos.*

SENSACIÓN DE IMPACIENCIA: *Kali phos.*

SENSACIÓN DE BOLA en la garganta: *Kali phos.*
de reptación por todas partes: *Calc. phos.*
de entorpecimiento: *Natr. mur.*
temblorosa: *Kali phos.*

SENSACIÓN DE CANSANCIO: *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*

SENSACIÓN FATIGOSA: *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*, *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*

SENSIBILIDAD PARA LA LUZ y el ruido: *Kali phos.*, *Silicea.*
para el aire frío: *Silicea.*

SE SIENTEN DOLORES en todo el cuerpo, demasiado agudos: *Kali phos.*

SOLLOZOS CONVULSIVOS: *Magnes. phos.*

TABES DORSAL: *Kali mur.*, *Silicea.*

TARTAMUDEO, espasmódico: *Magnes. phos.*

TEMOR DE LADRONES: *Kali phos.*

TERRORES NOCTURNOS de los niños: *Kali phos.*

TIC DOLOROSO: *Ferr. phos.*, *Magnes. phos.*

TIEMRLAN LAS MANOS cuando escribe: *Natr. sulph Magnes. phos.*

TRISMUS: *Magnes. phos.*

VEJIGA, parálisis de la: *Kali phos.*

SUEÑO Y ENSUEÑO.

BOSTEZOS, espasmódicos: *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*
histéricos: *Kali phos.*
CANSANCIO EN LA MAÑANA al despertar: *Natr. mur.*
CONSTANTES bostezos y pandiculaciones: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
DESEO CONSTANTE DE DORMIR: *Natr. mur.*
en la mañana: *Kali phos.*
DESVELO después de una incomodidad: *Kali phos.*
— de una excitación: *Kali phos.*
por agotamiento: *Magnes. phos.*
— hiperemia: *Ferr. phos.*
— irritación nerviosa: *Natr. mur.*
— negocios enfadosos: *Kali phos.*
— orgasmo sanguíneo: *Silicea.*
— picazón: *Natr. phos.*
DIFICULTAD PARA DESPERTAR en la mañana: *Calc. phos.*
DURANTE EL SUEÑO, gritos de los niños: *Calc. phos.*
sacudimientos de los miembros: *Silicea*, *Magnes. phos.*
ENSUEÑOS, ansiosos: *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*
con sensación de peligro: *Calc. fluor.*, *Magnes. phos.*
con sensación de peligro inminente: *Calc. fluor.*
de convulsiones por un susto: *Calc. sulph.*
de caídas: *Kali phos.*

ENSUEÑOS, de escenas nuevas, lugares, etc., *Calc. fluor.*
de fantasmas: *Kali phos.*
de incendio: *Kali phos.*
de ladrones: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
lascivos: *Kali phos.*
penosos: *Natr. sulph.*
sexuales: *Natr. phos.*
vivos: *Kali sulph.*
ES DESPERTADO por dolores flatulentos: *Natr. sulph.*
ESPASMÓDICOS, bostezos: *Magnes. phos.*
ESTREMECIMIENTOS durante el sueño: *Natr. mur. Natr. sulph.*
EXCESO DE SUEÑO: *Natr. mur.*
INSOMNIO: *Natr. mur.*
por agotamiento: *Magnes. phos.*
LOS NIÑOS GRITAN durante el sueño: *Calc. phos.*
NO DUERMEN POR LA NOCHE: *Calc. sulph.*
PANDICULACIONES: *Kali phos.*, *Calc. phos.*
SACUDIDAS DE LOS MÚSCULOS al quedarse dormidos: *Kali phos.*
SACUDIMIENTO de los miembros durante el sueño: *Silicea*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
SE DESPIERTA GRITANDO: *Kali phos.*
SE DUERME MIENTRAS ESTÁ SENTADO: *Natr. phos.*
SE SIENTE CANSADO en la mañana: *Natr. mur.*
SOBRESALTOS al más ligero ruido: *Kali mur.*
SONAMBULISMO: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
SOMNOLENCIA: *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Magne phos.*

SOMNOLENCIA en la tarde: *Ferr. phos.*
en los ancianos: *Calc. phos.*
SOMNOLENCIA DURANTE EL DÍA, insomnio: *Calc. sulph.*
SUEÑO INQUIETO: *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*
SUEÑO, desasosegado: *Natr. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*
excesivo: *Natr. mur.*
no reparador: *Natr. mur.*
que no reanima: *Natr. mur.*

SÍNTOMAS FEBRILES.

AMARILLA, fiebre: *Natr. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
BILIOSAS, fiebres: *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*, *Natr. sulph.*
CALENTURA intermitente: *Natr. mur.*
CALOSFRÍO: *Silicea*, *Calc. phos.*, *Kali mur.*
después de la comida, á las 7 p. m.: *Magnes. phos.*
CAMPAMENTOS, fiebre de los: *Kali phos.*
CEREBRAL, fiebre: *Kali phos.*
CATARRAL, fiebre: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
EL CALOSFRÍO recorre la espalda: *Magnes. phos.*
EL FRÍO dura desde la mañana hasta el medio día: *Natr. mur.*
todos los días á la 1 p. m.: *Ferr. phos.*
ENTÉRICA, fiebre: *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*

ESCARLATINA, fiebre: *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Natr. sulph.*
como preservativo: *Kali mur.*
FIEBRE, amarilla: *Natr. sulph.*
biliosa: *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*
catarral: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
cerebral: *Kali phos.*
de los campamentos: *Kali phos.*
de heno: *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
entérica: *Kali sulph*, *Kali mur.*, *Ferr. phos*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
escarlata: *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
gástrica: *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
héctica: *Silicea*, *Calc. sulph.*
inflamatoria: *Ferr. phos.*
intermitente: *Magnes. phos.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Natr. phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*, *Kali sulph.*
maligna y pútrida: *Kali phos.*
nerviosa: *Kali phos.*
por envenenamiento de la sangre: *Kali sulph.*
puerperal: *Kali mur.*
remitente: *Natr. sulph.*
reumática: *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*
tifoidea: *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
FRÍO, sudor: *Kali sulph.*, *Calc. phos.*

INTERMITENTE, fiebre: (Véase indicación anterior).
con vómitos ácidos: *Natr. mur.*
con calambres: *Magnes. phos.*
crónica: *Calc. phos.*
después de la quinina: *Natr. mur.*
con transpiración debilitante: *Kali phos.*
capa amarilla viscosa en la lengua: *Kali sulph.*
vómitos de alimento: *Ferr. phos.*
LA TEMPERATURA SE ELEVA durante la noche: *Kali sulph.*
NOCTURNOS, sudores, profusos: *Natr. mur.*, *Calc. phos.*, *Silicea, Natr. sulph.*, *Calc. sulph.*, *Ferr. phos.*
PERSPIRACIÓN de la cabeza: *Silicea.*
agria y ácida: *Natr. phos.*
debilitante: *Kali phos.*
durante la comida: *Kali phos.*
fétida: *Kali phos.*
fría: *Kali sulph.*
profusa: *Kali phos.*
PETEQUIAS: *Kali phos.*
PIES FRÍOS COMO DE HIELO: *Natr. phos.*
ardientes por la noche: *Natr. phos.*, *Silicea.*
RIGIDEZ: *Ferr. phos.*
SENSIBILIDAD al aire frío: *Silicea.*
SUDOR DE LA CABEZA: *Silicea, Calc. phos.*
debilitante: *Kali phos.*
de olor agrio y con debilidad: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
durante la comida: *Kali phos.*

SUDOR DE LA CABEZA, en la noche, profuso: *Natr. mur.*, *Calc. phos.*, *Silicea*, *Calc. sulph.*
fétido: *Kali phos.*
frío: *Kali sulph.*, *Natr. sulph.*, *Ferr. phos.*
profuso: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*, *Calc. phos.*
sin sed: *Natr. sulph.*
TIFUS FEVER: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
VESÍCULAS, febriles, en los labios: *Natr. mur.*

PIEL.

ABSCESOS: *Kali mur.*, *Silicea*, *Calc. sulph.*, *Calc. fluor.* *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
fistulosos: *Silicea*, *Natr. sulph.*
ACNÉ: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Silicea.*
rosácea: *Calc. phos.*
ACUOSAS, secreciones: *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*
AFECCIONES HÚMEDAS DE LA PIEL: *Natr. sulph.*
ALOPECIA AREATA: *Kali phos.*
AMARILLAS, costras: *Calc. phos.*
escamas: *Natr. sulph.*
vesículas: *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*
AMPOLLAS en la piel: *Natr. sulph.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
ANÉMICAS, erupciones: *Calc. phos.*
ARRUGADA, piel: *Kali phos.*
BARROS EN LA PIEL: *Ferr phos.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*
BLANCAS, costras: *Calc. phos.*

BLANCAS, escamas sobre la piel del cráneo: *Natr. mur.*, *Kali mur.*
vesículas: *Calc. phos.*
CAÍDA DEL PELO DE LA BARBA: *Natr. mur.*
CAÍDA DEL CABELLO: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*
CÁNCER EPITELIAL: *Kali sulph.*
CASPA: *Natr. mur.*, *Kali sulph.*, *Kali mur.*
COMEZÓN POR AFEITARSE: *Magnes. phos.*
COMEZÓN al desnudarse: *Natr. sulph.*
con sensación de reptación: *Kali phos.*
de la piel: *Calc. phos.*, *Kali sulph.*, *Kali phos.*, *Silicea.*
de las plantas de los pies: *Calc. sulph.*, *Kali phos.*
después de un violento ejercicio: *Natr. mur.*
en las manos y en los pies: *Kali phos.*
senil: *Calc. phos.*
sobre todo el cuerpo: *Natr. phos.*, *Magnes. phos.*
violenta: *Natr. mur.*
CRUSTA LÁCTEA: *Natr. phos.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*, *Silicea.*
DESCAMACIÓN, para promover la: *Kali sulph.*
DIVIESOS: *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*
ECZEMA con escamas finas: *Natr. mur.*
con exceso de sensibilidad: *Kali phos.*
con secreciones amarillo-verdiosas: *Kali sulph.*
— de vesículas acuosas: *Natr. sulph.*
— de costras blancas: *Calc. phos.*

ECZEMA con síntomas de acidez: *Natr. phos.*
con vesículas, blanquizcas: *Kali mur.*
de las cejas: *Natr. mur.*
después de la vacuna: *Kali mur.*
detrás de las orejas: *Natr. mur.*
en el doblez de las articulaciones: *Natr. mur.*
escamoso: *Silicea.*
por comer mucha sal. *Natr. mur.*
suprimido repentinamente: *Kali sulph.*
EFECTOS PRODUCIDOS POR EL VENENO DE LA HIEDRA: *Kali sulph.*
EL FROTAMIENTO es agradable: *Kali phos.*
ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LA PIEL: *Natr. mur.*
ERISIPELA, flictenular: *Kali mur.*
flegmonosa: *Silicea.*
lisa, roja y brillante: *Natr. sulph.*, *Ferr. phos.*
propensión á la: *Calc. flour.*
que invade profundamente los tejidos: *Silicea.*
vesiculosa: *Kali sulph.*
ERITEMA: *Natr. phos.*, *Kali mur.*
ERUPCIONES, anémicas y gotosas: *Calc. phos.*
ardientes y pruritosas: *Kali suph.*, *Kali phos.*
herpéticas: *Calc. sulph.*
miliares: *Natr. mur.*
ERUPCIONES con afecciones menstruales y del estómago: *Kali mur.*
en la superficie de los flexores: *Natr. mur.*
escamosas: *Kali sulph.*
escrofulosas: *Calc. phos.*, *Silicea.*
súbitamente suprimidas: *Kali sulph.*

ESCALDADURAS DE LA PIEL: *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Kali sulph.*
por el rozamiento: *Kali phos.*, *Natr. mur.*

ESCARLATINA: *Ferr. phos.*, *Kali sulph.*, *Kali mur.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*

ESCORIACIONES: *Calc. phos.*

ESCROFULOSAS, erupciones: *Calc. phos.*, *Silicea.*
ulceraciones: *Calc. phos.*

EXCRECENCIAS, sicóticas: *Natr. sulph.*

EXUDACIONES. (Véase afecciones de las Tejidos).

FALTA DE CRECIMIENTO en las uñas de los dedos de los pies: *Kali mur.*, *Silicea.*

FISURAS del ano: *Calc. fluor.*
de la piel: *Calc. fluor.*, *Silicea.*

FUNGUS HEMATOIDES: *Natr. mur.*

GRIETAS en la piel: *Calc. fluor.*
entre los dedos de los pies: *Natr. mur.*

HENDEDURAS DE LA PIEL: *Calc. fluor.*

HERPES, agudo: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*, *Calc. sulph.*
circinatus: *Natr. mur.*
crónico: *Calc. phos.*
en el pliegue de las rodillas: *Natr. mur.*
en los codos: *Natr. mur.*
en las palmas de las manos: *Kali sulph*,
zoster: *Natr. mur.*, *Kali mur.*, *Silicea.*

HINCHAZÓN DE LA PIEL: *Natr. sulph.*

HORMIGUEO DE LA PIEL: *Kali sulph.*

INFLAMACIÓN DE LA PIEL: *Ferr. phos.*

INFLAMACIONES EDEMATOSAS: *Natr. sulph.*

INTERTRIGO: *Natr. mur.*, *Kali sulph.*
JUANETES: *Kali mur.*
LEPRA: *Silicea.*
LUPUS: *Calc. phos.*, *Kali mur.*
MANCHAS COBRIZAS: *Silicea.*
MILIARES, erupciones: *Natr. mur.*
NŒVI: *Ferr. phos.*
NUDOSIDADES: *Silicea.*
PADRASTROS: *Natr. mur.*
PALMAS DE LAS MANOS CON FISURAS: *Calc. fluor.*
empeine escamoso en las: *Kali sulph.*
escoriadas y doloridas: *Natr. sulph.*
PANADIZO: *Calc. fluor.*, *Silicea*, *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*
PECAS: *Calc. phos.*
PÉNFIGO: *Natr. mur.*, *Silicea*, *Natr. sulph.*
maligno: *Kali phos.*
PICADURAS DE INSECTOS: *Natr. mur.*
como sarpullido cerca de las rodillas y tobillos: *Magnes. phos.*
PIEL ICTÉRICA: *Natr. sulph.*, *Kali mur.*
PIEL, ardiente: *Silicea.*
arrugada: *Kali phos.*, *Calc. phos.*
áspera: *Kali sulph.*
barros en la: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*, *Natr. sulph.*, *Calc. phos.*
con grietas: *Calc. fluor.*
costras de un amarillo brillante en la: *Natr phos.*
costras en la: *Calc. phos.*, *Kali phos.*

PIEL, desollada: *Kali sulph.*
dolorida: *Natr. mur.*
escaldada: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Kali sulph.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*
escamas en la: *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*, *Kali sulph.*
flácida, adormedida: *Natr. mur.*
flictenas en la: *Kali phos.*, *Natr. mur.*
granos: *Natr. sulph.*, *Natr. mur.*
grasosa: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
hendeduras en la: *Calc. fluor.*
inflamada: *Ferr. phos.*
manchada: *Natr. mur.*
pápulas en la: *Silicea.*
pruritosa: *Calc. phos.*, *Natr. sulph*, *Kali phos.*, *Silicea.*
que sangra al rascarse: *Calc. sulph.*
que sana con dificultad: *Silicea.*
seca: *Kali sulph*, *Calc. phos*
sensible: *Silicea.*
tubérculos en la: *Calc. phos.*
vejigas sobre la: *Natr. sulph.*, *Kali phos.*, *Natr. mur.*
vesículas en la: *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*
vesículas acuosas: *Natr. mur.*
PRÚRIGO: *Calc. phos.*
PRURITO: *Calc. phos.*
vaginal: *Calc. phos.*
PÚSTULAS: *Calc. sulph.*, *Silicea.*

PÚSTULAS malignas: *Kali phos.*, *Silicea.*
QUEMANURAS: *Kali mur.*, *Calc. sulph.*
RÁGADES: *Calc. fluor.*, *Silicea.*
ROBLE VENENOSO, efectos producidos por el: *Kali sulph.*
RONCHAS, COMO PRODUCIDAS POR LA ORTIGA: *Kali sulph.*
ROSEOLA: *Natr. phos.*
RUPIA: *Natr. mur.*
SABAÑONES: *Kali phos.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*, *Silicea.*
SARAMPIÓN: *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Kali sulph.*, *Silicea.*
SARPULLIDO: *Natr. mur.*, *Kali mur.*
SECRECIONES IRRITANTES: *Kali phos.*
SENSACIÓN DE REPTACIÓN en la piel: *Kali phos.*
SICOSIS: *Natr. mur.*, *Kali mur.*
excrecencias en la: *Natr. sulph.*
SUPRESIÓN DE ERUPCIONES: *Kali sulph.*
TINEA CAPITIS: *Kali sulph.*
TUBÉRCULOS en la piel: *Calc. phos.*
TUMORES: *Magnes. phos.*, *Calc. sulph.*, *Silicea*, *Ferr. phos.*, *Kali mur.*
tendencia á los: *Silicea.*
ULCERACIONES, escrofulosas: *Calc. phos.*
fistulosas: *Calc. fluor.*, *Silicea.*
fungosas: *Silicea*, *Kali mur.*
indolentes: *Calc. fluor.*
inflamadas: *Ferr. phos.*
purulentas: *Calc. sulph.*, *Silicea.*

UÑAS, crecimiento interrumpido de las: *Kali sulph.*
enfermas: *Kali sulph.*, *Silicea.*
estropeadas y quebradizas: *Kali sulph.*, *Silicea.*

UÑEROS: *Calc. fluor.*, *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Silicea.*

URTICARIA: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*

VAGINAL, prurito: *Calc. phos.*, *Kali phos.*, *Natr. sulph.*

VARIOLOIDE: *Ferr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Kali mur.*, *Silicea.*

VERRUGAS en las palmas de las manos: *Natr. mur.*, *Kali mur.*, *Natr. sulph.*

VESÍCULAS sobre la piel: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Kali mur.*

VIRUELA: *Kali phos.*, *Ferr. phos.*, *Kali mur.*, *Calc. sulph.*, *Kali sulph.*, *Silicea.*

VIRUELAS LOCAS: *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*

TEJIDOS.

ABSCESOS, cerca del ano: *Calc. sulph.*
con aberturas fistulosas: *Silicea.*
con síntomas adinámicos: *Kali phos.*
de las encías: *Calc. fluor.*, *Silicea*, *Calc. sulph.*
hinchados: *Kali mur.*
inflamatorios: *Ferr. phos.*
pélvicos: *Calc. fluor.*
para acortar la supuración: *Calc. sulph.*

AFECCIONES PANCREÁTICAS: *Calc. phos.*
AGOTAMIENTO: *Kali phos.*
ANASARCA: *Natr. mur.*
ANEMIA: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*, *Natr. mur.*, *Kali phos.*, *Kali mur.*
en los niños pequeños: *Silicea.*
ANEMIA, espinal: *Natr. phos.*
ATROFIA: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
BOCIO: *Calc. phos.*, *Natr. mur.*, *Calc. fluor.*, *Natr. phos.*
BOLSAS SINOVIALES: *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*, *Silicea.*
BRONCOCELE: *Calc. phos.*
CÁNCER: *Kali phos.*, *Calc. phos.*, *Kali sulph.*
CAQUEXIA, por abuso de la Quinina en las intermitentes: *Natr. mur.*
CARBUNCLOS: *Silicea*, *Calc. sulph.*, *Kali mur.*, *Ferr. phos.*, *Kali phos.*
CÓNDILOS HINCHADOS: *Calc. phos.*
CONDICIONES GANGRENOSAS: *Kali phos.*
CONSTITUCIÓN HIDROGENOIDE: *Natr. sulph.*
CONTUSIONES: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*
CRUPOSAS, exudaciones: *Kali mur.*
DEBILIDAD: *Kali phos.*
DESCARGAS. (Véase Exudaciones).
DIÁTESIS, fosfática: *Calc. phos.*
escrofulosa: *Silicea*, *Calc. phos.*
DIÁTESIS ESTRUMOSA: *Kali mur.*
DISCRACIA CLORÓTICA: *Natr. mur.*, *Calc. phos.*
EDEMA: *Natr. sulph.*
ENCONDROMA: *Silicea.*

ENFERMEDAD DE ADDISON: *Natr. mur.*
ENFERMEDAD DE BASEDOW: *Natr. mur.*
ENFERMEDADES DEBILITANTES: *Kali phos.*, *Calc. phos.*
ENQUISTADOS, tumores: *Calc. fluor.*
EPISTAXIS en los niños: *Ferr. phos.*
EPITELIOMA: *Kali sulph.*
EQUIMOSIS: *Kali mur.*
ESCALDADURAS: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*
ESCORBUTO: *Kali mur.*, *Kali phos.*
ESCROFULOSIS: *Natr. phos.*, *Silicea*, *Calc. phos.*
ESPINA BÍFIDA: *Calc. phos.*, *Calc. fluor.*
ESTADOS ADINÁMICOS: *Natr. mur.*, *Kali phos.*
ESTADOS DE PUTRIDEZ: *Kali phos.*
EXTENUACIÓN: *Calc. phos.*, *Kali phos.*
no obstante la buena vida: *Natr. mur.*
EXUDACIONES, acuosas: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
albuminosas: *Calc. phos.*
amarillas: *Natr. sulph.*, *Natr. phos.*, *Kali sulph.*
como color de miel: *Natr. phos.*
cremosas: *Natr. phos.*
endurecidas: *Calc. fluor.*
escoriantes, que causan dolencia: *Natr. phos.*, *Natr. mur.*
fétidas: *Silicea*, *Kali phos.*
fibrinosas: *Kali mur.*
irritantes: *Kali phos.*
linfáticas: *Kali mur.*
purulentas: *Kali sulph.*, *Calc. sulph.*

EXUDACIONES, saniosas: *Calc. sulph.*
serosas: *Kali sulph.*, *Natr. mur.*, *Calc. phos.*
FÉTIDAS, secreciones: *Silicea*, *Kali phos.*
FIBRAS ELÁSTICAS relajadas: *Calc. fluor.*
FOLICULARES, infiltraciones: *Kali mur.*
FOSFÁTICA, diátesis: *Calc. phos.*
FUNGOSIDADES: *Kali mur.*, *Silicea*, *Calc. sulph.*
FUNGUS, sangrando fácilmente: *Silicea.*
GANGLIOS: *Calc. fluor.*, *Calc. phos.*
GLÁNDULAS duras como una piedra: *Calc. fluor.*
endurecidas: *Calc. fluor.*
hinchazón de las: *Kali mur.*, *Natr. phos.*, *Silicea.*
infiltración escrofulosa de las: *Kali mur.*
inflamadas: *Ferr. phos.*
sebáceas supuradas: *Silicea.*
supurando: *Calc. sulph.*, *Silicea.*
ulceración de las: *Ferr. phos.*, *Calc. sulph.*
GOLPES, efectos de los: *Kali mur.*, *Ferr. phos.*
GOTA: *Natr. mur.*, *Natr. phos.*, *Natr. sulph.*
GRANULACIONES EXCESIVAS: *Calc. sulph.*
HEMORRAGIAS, sangre coagulada: *Kali mur.*, *Ferr. phos.*
negra: *Kali mur.*
obscura: *Kali mur.*
roja-brillante: *Ferr. phos.*
séptica y delgada: *Kali phos.*
sin coagular: *Kali phos.*
HERIDAS EN SUPURACIÓN: *Calc. sulph.*
HIDROPESÍA: *Silicea*, *Natr. mur.*, *Calc. phos.*

HIDROPESÍA, por afección del corazón: *Calc. fluor.*, *Kali mur.*
por obstrucción de los conductos biliares: *Kali mur.*
por pérdida de sangre: *Ferr. phos.*, *Calc. phos.*
por debilidad del corazón: *Kali mur.*
simple: *Natr. sulph.*

HUESOS, ásperos, nudosos: *Calc. fluor.*
contusiones en los: *Calc. fluor.*
exóstosis en los: *Calc. phos.*
favorece el depósito de cal en los: *Natr. phos.*, *Calc. phos.*
fractura de los: *Calc. phos.*, *Ferr. phos.*
frágiles y delgados: *Calc. phos.*
inflamación de las partes blandas que los rodean: *Ferr. phos.*
necrosis de los: *Silicea.*
osteofitos: *Ferr. phos.*
supuración de los: *Calc. fluor.*, *Calc. sulph.*, *Silicea.*
ulceración de los: *Silicea*, *Calc. fluor.*

INDURACIONES: *Calc. fluor.*

INFLAMACIONES, primer período: *Ferr. phos.*
segundo período: *Kali mur.*
con exudaciones sero-purulentas: *Kali sulph.*
gangrenosas: *Silicea.*
malignas: *Silicea.*
período exudativo: *Kali mur.*

LEUCOEMIA: *Natr. phos.*, *Calc. phos.*, *Natr. sulph.*, *Kali phos.*, *Ferr. phos.*
LEUCOSICOSIS: *Natr. phos.*
MAMAS, nudosidades en las: *Calc. fluor.*
cavidades fistulosas en las: *Calc. fluor.*
tumores en las: *Calc. fluor.*
MARASMO: *Calc. phos.*, *Natr. phos.*
MORTIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS: *Kali phos.*
NECROSIS de los huesos: *Silicea.*
NUDOSIDADES en la piel: *Calc. fluor.*
NUTRICIÓN DEFECTUOSA: *Calc. phos.*
ÓSEAS, vegetaciones: *Calc. fluor.*
OSTEITIS: *Ferr. phos.*
PIOHEMIA: *Natr. sulph.*
PÓLIPOS: *Calc. phos.*
blandos: *Kali sulph.*
PÚSTULAS MALIGNAS: *Silicea, Kali phos.*
QUEMADURAS: *Calc. sulph.*, *Kali mur.*
QUISTES: *Calc. phos.*, *Calc. sulph.*
RÁNULA: *Natr. mur.*
RAQUITIS: *Silicea, Calc. phos.*, *Kali phos.*
SECRECIONES, acuosas: *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
albuminosas: *Calc. phos.*
amarillas: *Kali sulph.*
de color de miel: *Natr. phos.*
fétidas: *Kali phos.*
fibrinosas: *Kali mur.*
irritantes: *Kali phos.*, *Natr. mur.*, *Natr. sulph.*
purulentas: *Kali sulph.*, *Calc. sulph.*

SECRECIONES, saniosas: *Calc. sulph.*
serosas: *Natr. mur.*
verdiosas: *Kali sulph.*
SEROSAS, hinchazones de las: *Calc. sulph.*
SICOSIS: *Natr. sulph.*
SÍFILIS: *Kali mur.*
SUPURACIÓN CELULAR: *Silicea, Calc. sulph.*
SUPURACIONES, fétidas, sucias: *Kali phos.*
de los huesos: *Calc. fluor.*
de las glándulas: *Silicea.*
en general: *Calc. sulph., Silicea.*
con bordes callosos: *Calc. fluor.*
TEJIDOS DE MAL ASPECTO: *Calc. sulph.*
TORCEDURAS: *Ferr. phos.*
TRAUMATISMOS, mecánicos: *Ferr. phos.*
casos descuidados de los: *Calc. sulph.*
TUMORES: *Silicea, Calc. sulph. Kali mur., Ferr. phos.*
tendencia á los: *Silicea.*
TUMORES Y NUDOSIDADES en las mamas: *Calc. fluor.*
TUMORES, blancos: *Silicea, Calc. phos.*
císticos: *Calc. fluor., Calc. sulph.*
de las mamas: *Calc. fluor.*
sanguíneos: *Calc. fluor.*
ULCERACIÓN, con fungosidades: *Silicea, Calc. sulph., Kali mur.*
de los huesos: *Silicea.*
fistulosa: *Silicea, Calc. fluor.*
indolente: *Calc. fluor.*
purulenta: *Silicea.*

UÑEROS: *Calc. sulph., Ferr. phos., Silicea, Natr. sulph., Calc. fluor., Kali phos.*

VACUNACIÓN, malos resultados de la: *Kali mur., Silicea.*

VARICES: *Calc. fluor., Natr. mur.*

VEGETACIONES, óseas: *Calc. fluor.*

VENAS VARICOSAS en las personas jóvenes: *Ferr. phos.*

MODALIDADES.

AGRAVACIÓN, después de la quietud: *Kali phos.*
después de bañarse y trabajar en el agua: *Calc. sulph., Natr. sulph.*
en la noche: *Silicea.*
por el ejercicio continuado: *Kali phos.*
— el esfuerzo: *Kali phos.*
— levantarse al estar sentado: *Kali phos.*
— el movimiento: *Kali mur., Ferr. phos., Calc. phos.*
— el ruido: *Kali phos.*
durante el plenilunio: *Silicea.*
— una tormenta: *Natr. phos.*
por acostarse sobre el lado izquierdo: *Natr. sulph.*
— el agua: *Natr. sulph.*
— el cambio de tiempo: *Calc. phos.*
— comer alimentos grasosos: *Kali mur.*
— — alimentos substanciosos: *Kali mur.*
— — frutas (diarrea): *Calc. phos.*

AGRAVACIÓN, por comer pescados: *Natr. sulph.*
por comer plantas impregnadas de sal: *Natr. sulph.*
— el enfriamiento de los pies: *Silicea.*
— el frío: *Silicea*, *Calc. phos.*, *Magnes. phos.*
— — del aire: *Kali phos.*, *Magnes. phos.*
— humedecerse: *Calc. phos.*
— la pastelería: *Kali mur.*
— picaduras de insectos: *Natr. mur.*
— la quinina: *Natr. mur.*
— la supresión del sudor de los pies: *Silicea.*
— el tacto: *Magnes. phos.*
— trabajar en el agua y bañarse: *Calc. sulph.*, *Natr. sulph.*
— el uso del nitrato de plata: *Natr. mur.*
— vivir en la orilla del mar: *Natr. mur.*
en el aire libre: *Silicea.*
en un cuarto caliente: *Kali sulph.*
en la mañana: *Natr. mur.*
en la noche: *Kali sulph.*, *Natr. phos.*
en la tarde (durante la menstruación): *Natr. phos.*
en el tiempo frío: *Natr. mur.*
en el tiempo húmedo: *Calc. fluor.*, *Natr. sulph.*
con la soledad: *Kali sulph.*, *Kali phos.*
de los dolores y la comezón, de las 2 á las 5 p. m.: *Kali phos.*
del lado derecho: *Magnes. phos.*
periódica: *Natr. mur.*
MEJORÍA, por acostarse: *Calc. phos.*

MEJORÍA, por el calor: *Silicea, Magnes. phos.*
por el calor húmedo: *Silicea.*
— el calor moderado: *Silicea, Magnes. phos.*
— el cambio de tiempo: *Natr. sulph.*
— comer: *Kali phos.*
— la compañía: *Kali phos.*
— las emociones: *Kali phos.*
— encorvarse: *Magnes. phos.*
— envolver la cabeza: *Silicea.*
— la fricción: *Magnes. phos.*
— las friegas: *Calc. flour.*
— el frío: *Ferr. phos*, *Calc. fluor.*
— las fomentaciones: *Calc. fluor.*
— el movimiento suave: *Kali phos.*
— la presión: *Magnes. phos.*
sobre alguna cosa dura: *Natr. mur.*
en el frío, al aire libre: *Kali sulph.*
en el calor, tiempo seco: *Natr. sulph.*
en un cuarto caliente: *Silicea.*

FIN.

UNIV. OF MICHIGAN,

512

INDICE.

Págs.

Aborto (Mujeres, enfermedad de las) 384
Abscesos 203
Addison, enfermedad de 208
Afonía 209
Aftas (boca. Enfermedades de la) 223
Albuminuria (Afecciones de los riñones) 467
Amenorrea (Menstruación) 209
Anemia 210
Aneurisma 214
Angina pectoris 215
Apetito, pérdida del (Desarreglos gástricos) 332
Aplicación terapéutica de los doce Remedios de los Tejidos ... 203
Apoplegía (hemorragia) 352
Artritis 215
Asma 217
Atrofia.—Marasmo 221
Boca (Enfermedades de la) 223
Bocio exoftálmico 225
Bocio (glándulas. Afecciones de las) 343
Bronquitis 226
Cadera, enfermedad de la 227
Calambres de los escribientes 228
Calcarea fluorica 35
Calcarea phosphorica 45
Calcarea sulphurica 61

Págs.

Cálculos biliares..... 229
Cáncer (tumores)..... 497
Carbunclo (abscesos)..... 203
Casos clínicos:
Abscesos..... 206
Amenorrea..... 210
Anemia..... 213
Artritis..... 217
Asma..... 219
Atrofia..... 222
Boca, enfermedades de la..... 225
Bocio exoftálmico..... 225
Bronquitis..... 227
Catarrales, padecimientos..... 232
Cefalalgia..... 240
Cerebro..... 242
Cerebro, cansancio del..... 243
Ciática..... 248
Cólera..... 250
Cólico..... 252
Constipación..... 255
Corea..... 258
Crup..... 261
Delirio..... 262
Dentición..... 264
Diabetes..... 268
Diarrea..... 272
Difteria..... 276
Disentería..... 280
Dismenorrea..... 282
Dolor de muelas..... 288
Epilepsia..... 294
Erisipela..... 296
Escarlatina..... 298
Espasmos..... 306
Espina, enfermedades de la..... 311

Págs.

Casos clínicos:

Estados mentales..... 317
Fiebre simple..... 322
„ intermitente..... 325
„ puerperal..... 326
„ tifoidea..... 327
Garganta, mal de la..... 332
Gástricos, desarreglos..... 338
Glándulas, afecciones de las..... 344
Gonorrea..... 351
Hemorragia..... 353
Hemorroides..... 357
Hidrocele..... 358
Hidrópicas, afecciones..... 359
Hígado, afecciones del..... 362
Hipo..... 362
Histeria..... 363
Huesos, enfermedades de los..... 367
Leucorrea..... 375
Meningitis..... 376
Menstruación..... 381
Mujeres, enfermedades de las..... 390
Neumonía..... 394
Neuralgia..... 398
Oídos, enfermedades de los..... 417
Ojos, enfermedades de los..... 432
Parálisis..... 441
Parotitis..... 442
Parto..... 291
Piel, enfermedades de la..... 449
Pleuresía..... 452
Quemaduras..... 453
Raquitis..... 455
Reumatismo..... 459
Riñones, afección de los..... 468
Sarampión..... 470

Págs.

Casos clínicos.
Sífilis..... 471
Sueño, perturbaciones del..... 474
Tiflitis..... 476
Tisis..... 481
Tonsilitis..... 484
Tos..... 489
Tos ferina (Coqueluche)..... 490
Traumatismos..... 494
Tumores..... 498
Ulceraciones..... 504
Urinarios, desórdenes..... 508
Venas, enfermedades de las..... 511
Vermes (lombrices)..... 512
Vértigo..... 513
Vómitos..... 515
Catarata (ojos. Enfermedades de los)..... 425
Catarrales, padecimientos..... 229
Catarro bronquial..... 226
Catalisis..... 30
Cefalalgia..... 234
Cerebro..... 241
Cerebro, cansancio del..... 243
Ciática..... 247
Clorosis (Anemia)..... 210
Cólera..... 249
Cólico..... 250
Conmoción del cerebro..... 253
Constipación..... 253
Constituyentes del organismo humano..... 4
Constituyentes inorgánicos de las celdillas..... 7
Construcción de los tejidos..... 5
Corazón, afecciones del..... 256
Corea..... 258
Coriza (catarrales. Padecimientos)..... 229
Crup..... 260

Págs.

Delirio 262
Dentición 263
Desvanecimiento 264
Diabetes mellitus 265
„ Nota á la 266
Diarrea 269
Difteria 274
Disentería 279
Dismenorrea 281
Dispepsia (gástricos. Desarreglos) 332
Dolores de espalda 285
Dolor de muelas 287
Dosis 13
Eczema (piel. Enfermedades de la) 443
Edema de los pulmones 289
Embarazo, parto, etc 289
Encondroma (huesos. Enfermedades de los) 365
Endocarditis (corazón. Enfermedades del) 256
Enfermedades de Reynaud 466
Enfermedades de Bright (riñones. Afecciones de los) 467
Enuresis (urinarios. Desórdenes) 292
Epilepsia 292
Epistaxis (hemorragia) 352
Erisipela 295
Escarlatina 297
Escrófula y Tuberculosis 299
Espasmos, convulsiones, etc 305
Espermatorrea 309
Espina, enfermedades de la 310
Espinal, irritación 312
Estados mentales 314
Estomatitis (boca. Enfermedades de la) 223
Faringitis (garganta. Mal de la) 330
Ferrum phosphoricum 69
Fiebre, simple 321
„ intermitente 322

Págs.
Fiebre, puerperal. 325
,, tifoidea 326
,, amarilla (Vómito). 329
Fístula anal. 329
Flatulencia (gástricos. Desarreglos). 332
Formación de las celdillas de los Tejidós 8
Frecuencia de las dosis. 23
Garganta, mal de la 330
Gástricos, desarreglos. 332
Glándulas, afecciones de las. 343
Gota (Artritis). 215
Gonorrea 347
Hemorragia. 352
Hemorroides 355
Hepatitis (Hígado, afecciones del). 360
Hidrocéfalo. 357
Hidrocele. 358
Hidrópicas, afecciones 358
Hígado, afecciones del. 360
Hipo. 362
Histeria 363
Historia de los remedios de los tejidos. 1
Huesos, enfermedades de los. 365
Ictéria (Hígado, afecciones del). 360
Indigestión (gástricos. Desarreglos) 332
Inflamaciones en general 370
Influenza.—La Grippe (catarrales. Padecimientos). 371
Insolación. 371
Insomnio. (Sueño, perturbaciones del). 472
Kali muriaticum. 87
Kali phosphoricum. 100
Kali sulphuricum. 117
La Grippe (Catarrales. Padecimientos) 229, 371
Lengua. 371
Leucorrea. 373
Lombrices 375

Pág.
Lumbago (Dolor de espalda) 285
Magnesia phosphorica 127
Magnesia phos., en la neuralgia 406
Mal de San Vito (Corea) 258
Marasmo.—Atrofia 375
Materia Médica 35
Membranas mucosas 375
Meningitis 376
Meningitis espinal 377
Menstruación 377
Metritis (Mujeres. Enfermedades de las) 384
Morfina, uso de la 382
Mujeres, enfermedades de las 384
Natrum muriaticum 140
Natrum phosphoricum 161
Natrum sulphuricum 174
Náuseas matinales (Parto, embarazo, etc.) 289
Nefralgia (Riñones, afecciones de los) 467
Nefritis (Riñones, afecciones de los) 467
Neumonía 393
Neuralgia 395
Neurastenia (véase Cerebro, cansancio del) 243
Oftalmía (ojos. Enfermedades de los) 425
Oídos, enfermedades de los 408
Ojos, enfermedades de los 425
Orquitis 440
Otalgia (oídos. Enfermedades de los) 408
Otitis (oídos. Enfermedades de los) 408
Ozena (Catarrales, padecimientos) 229
Palpitación (Corazón, afecciones del) 256
Panadizo (Abscesos) 203
Parálisis 440
Parotitis 442
Parto, embarazo, etc. 289
Phytolacca, análisis de la 30
Picaduras de insectos 442

Págs.

Piel, enfermedades de la..... 443
Pleuresía..... 451
Prefacio..... I
Primera Edición..... I
Segunda Edición..... V
Tercera Edición..... VII
Cuarta Edición..... IX
Preparación y dosis..... 21
Procedimiento especial de Schüssler..... 22
Prosopalgia (Neuralgía)..... 395
Pruritis (piel. Enfermedades de la)..... 443
Quemaduras..... 453
Raquitis..... 453
Relaciones de la Bio-química al Tratamiento Homeopático... 24
Repertorio..... 516
Abdomen y deposiciones..... 592
Boca..... 568
Cabeza, sensorio y cuero cabelludo..... 525
Cara..... 562
Dientes y encías..... 576
Dorso y extremidades..... 628
Embarazo y parto..... 617
Estados y afecciones mentales..... 519
Garganta..... 580
Lengua y gusto..... 572
Modalidades..... 664
Nariz..... 555
Oídos..... 546
Ojos..... 537
Organos circulatorios..... 626
Organos respiratorios..... 619
Organos sexuales femeninos..... 610
Organos sexuales masculinos..... 607
Piel..... 650
Síntomas febriles..... 647
Síntomas gástricos..... 585

Págs.

Repertorio.
Síntomas nerviosos 640
Síntomas urinarios 603
Sueño y ensueños 645
Tejidos 657
Retinitis (ojos. Enfermedades de los) 425
Reumatismo 455
Riñones, afecciones de los 467
Ronquera 468
Salud y enfermedad 10
Sarampión 469
Septicemia 470
Sífilis 470
Silicea 188
Sueño, perturbaciones del 472
Tabla, remedios 27, 30
Tabla de materias XI
Teoría general 2
Teoría del método de Schüssler 4
Testículos, enfermedades de los 475
Tiflitis 475
Tifo 478
Tisis pulmonar 478
Tonsilitis 483
Tos 487
Tos ferina (Coqueluche) 490
Traumatismos 492
Tuberculosis y Escrófula 299
Tumores 497
Ulceras y ulceraciones 503
Urinarios, desórdenes 505
Vacunación 510
Varicela 510
Vejiga (Urinarios, desórdenes) 505
Venas, enfermedades de las 510
Vermes 511

Pág

Vértigo 51

Verrugas (piel. Enfermedades de la)..... 44

Viruelas..... 51

Vómitos..... 51

Zumbido en los oídos (oídos. Enfermedades de los)..... .. 40

Page
...513
..463
...514
...514
..468